

C 17696

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

INFORMATION REPORT

This Document contains information affecting the National Defense of the United States, within the meaning of Title 18, Sections 793 and 794, of the U.S. Code, as amended. Its transmission or revelation of its contents to or receipt by an unauthorized person is prohibited by law. The reproduction of this form is prohibited.

SECRET/CONTROL - U.S. OFFICIALS ONLY
SECURITY INFORMATION

50X1-HUM

COUNTRY	East Germany	REPORT	
SUBJECT	Catalog of Pharmaceutical Products	DATE DISTR.	15 Apr 11 1953
DATE OF INFO.		NO. OF PAGES	1
PLACE ACQUIRED		REQUIREMENT NO.	RD
		REFERENCES	50X1-HUM

THE SOURCE EVALUATIONS IN THIS REPORT ARE DEFINITIVE.
THE APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

50X1-HUM

catalog of pharmaceutical products issued by VVB der Pharmazeutischen Industrie, Halle/Saale

50X1-HUM

FEB 15 2 52 PM '54
OSI/IC

IR
54


SECRET/CONTROL - U.S. OFFICIALS ONLY

AIR	FBI	AEC	CCD	x
-----	-----	-----	-----	---

"X", Field Distribution By "#": Form No. 51-61, January 1953

50X1-HUM

Page Denied



SECRET

AUSGABE 1952



REGIERUNG
DER DEUTSCHEN DEMOKRatischen REPUBLIK
STAATSSSEKRETARIAT CHEMIE, STEINE UND ERDEN
**VERWALTUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE
DER PHARMAZEUTISCHEN INDUSTRIE**
HALLE/SAALE · MÜHLWEG 10 · FERNRUF: 245 08 · 248 15

*Mit gesunden Menschen
zu noch größeren Leistungen
für den Aufbau des
Sozialismus!*

Arzneimittel aus volkseigenen Betrieben

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Indikationsverzeichnis	
Innere Krankheiten	5
Haut- und Geschlechtskrankheiten (Dermatologie)	21
Neurologie und Psychiatrie	27
Gynaekologie	29
Chirurgie	33
Urologie	35
Pädiatrie	37
Hals-, Nasen-, Ohren-Erkrankungen	39
Ophthalmologie	40
B. Alphabetisches Arzneimittelverzeichnis	41
Anhang: Medizin. Tees, Thüringer Hausmittel, Sonstiges	215
C. Herstellerverzeichnis	
VEB Aetherea Leipzig	227
VEB Arzneimittelwerk Dresden Radebeul/Dresden	227/9
VEB Chemidropa-Werk Chemnitz	229
VEB Chem. Fabrik Dörlau Greiz-Dörlau	230
VEB Chem. Fabrik Grünau Berlin-Grünau	230
VEB Chem. Fabrik von Heyden Radebeul/Dresden	230
VEB Dentalchemie Leipzig	231
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben Rodleben	231
VEB Eumarhal-Werk Bernburg	231
VEB Fahlberg-List Magdeburg	232
VEB Farbenfabrik Wolfen Wolfen Kr. Bitterfeld	232
VEB Gärungschemie Dessau Dessau	232
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe Leipzig	233
VEB Imbal-Werk Chemnitz	234
VEB Jenapharm Jena	234
VEB Kali-Chemie „Rhenania“ Berlin-Niederschöneweide	234
VEB Laborchemie Apolda Apolda	235
VEB Lactacida Niederstrießig/Sa.	235
VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach Meuselbach/Tür.	235
VEB Pharm. Werk Johannisthal Berlin-Johannisthal	236
VEB Pharm. Werk Oranienburg Oranienburg/Mark	236
VEB Pharm. Werk Pankow Berlin-Pankow	236
VEB Promassol-Werk Erfurt	237
VEB Serum-Werk Dessau Dessau	237
VEB Serum-Werk Weißensee Berlin-Weißensee	238
VEB Schering Adlershof Berlin-Adlershof	238
VEB Vasenol-Werk Leipzig	239
Gödecke & Co. in Verwaltung Teltow b. Berlin	239
Hans C. Wirz in Verwaltung Gotha	239

- A = nicht rezeptpflichtige Arzneimittel
- ARp = rezeptpflichtige Arzneimittel
- AB = Arzneimittel, die dem Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln unterliegen
- ABV = Arzneimittel, die dem Opiumgesetz und der Verordnung über das Verschreiben Betäubungsmittel enthaltender Arzneien und ihrer Abgabe in den Apotheken unterliegen.

Die in vorliegendem Verzeichnis vermerkten Preise sind die Apothekenverkaufspreise m. U.

Indikationsverzeichnis

Innere Krankheiten

Achylie

Carvomin
Gastrosecrin „Sauer“

Pepsacid

Addinson'sche Krankheit

Cortiron

Allergie

Acirufan
Calcium chlorat.
Calcium gluconic.

Calciumthiosulfat-Amp.
„Schering“
Thiantan

Anaemia perniciosa

Hepartonyl forte

Pernaemyl forte

Anaemie, sekundäre

Arsen-Triferrol
Biofungin
Bio-Nektarin
Ferrofungin

Ferrostabil
Haematogen „Sicco“
Tonikum

Angina pectoris

s. Coronarinsuffizienz

Angiospasmen

Euphyllin

Nitro-Tabletten „Schering“

Arrhythmia absol.

Adonalis
Crataegutt
Cynosid

Digitoxin
Liquitalis

Arteriosklerose

Alluval forte
Anti-Arteriocalcin
Euphyllin
Euphyllin-Jod-Calcium
Guttajod
Jobrometten

Jorondellen
Picurin
Viscophyll
Vispur-Mistelsaft
Vitacardol

Arthritis

Atophan
Atophanyl
Caseosan
Cupidium
Cortiron
Lerminol
Jodisal-Salbe
Karwendol
Methysal

Rheumatox
Sufrogel
Thyreoidea sicc.
Thyreoidin
Uraton
Vipracutan
Viprasid
Wildunger Salz

Arthropathie	
Karwendol	Vipracutan
Oestrasid	Viprasid
Plenosol	
Arthrosis deformans	
Karwendol	Testoviron
Plenosol	Vipracutan
Sufrogel	Viprasid
Sulfur Collo	
Ascaris	
Santonin	
Asthma bronchiale	
Adrenasid	Jecoffin
Antasthmatica-Tabl.	Jenacain
Asthma-Tabl. I und II	Jobrometten
Bellatotal	Pentedin
Calcium-Resorpta-Sirup	Pentephen
Calciumthiosulfat-Amp.	Pervitin
„Scherling“	Pro-Expit
Camphedrin	Sanaestin
Cupridium	Sanopin
Ephedrin „Fahlberg“	Santa Flora
Ephedrin-Tabl.	Siran-Tropfen
Ephedrin-Lösung	Siran-Pastillen
Ephedrin-Dragees f. Kinder	Tryasol-Hustensaft m. Codein
Euphyllin-Calcium	Tussedrin
Formidium	Viprasid
Guajektol	
Asthma cardiale	
Antasthmatica-Tabl.	außerdem siehe „Herz-
Euphyllin-Calcium	insuffizienz“
Leandin	
Avitaminose	
Ascorvit	Vitamin A + D
Betasid	Vitamin A
Dekristol	Vitamin B ₁ , forte u. fortiss.
Blutersatz	
Dextran	Isotonal
Homoseran	
Blutungen (aus Lunge, Magen und Darm)	
Falistrypt	Styptan
Haemostypt	Thrombin
Brachialgia nocturna paraesth.	
Ascorvit	Oestrasid
Betasid	Viprasid

Bronchitis

Anginos
Anthaesin-Dragees
Calcium-Resorpta-Sirup
Epecton-Hustensaft
mit Ephedrin
Epecton-Hustentropfen
Epecton „C“
Extussin
Falimint
Fenchel-Sirup mit reinem
Bienenhonig
Guajektol
Hatussin
Hustentropfen-Destillat
Jodisal-Salbe

Menthym
Probronchin
Pro-Expit
Pulmogeran-Salbe
Sanopin
Santa Flora
Siran
Siran Tropfen und -pastillen
Tryasol
„ c. Codein
Tussedrin
Tussifluid
Tussistin
Tussylvan

Cholangitis

Agobilin
Biliton
Cholopant
Cortiron

Curcumen
Dehydrochol-Tabl.
Falichol
Pancurmen

Cholecystopathie, Cholelithiasis, Cholecystitis

Agobilin
Biliton
Cholopant
Curcumen

Dehydrochol-Tabl.
Gastrosecrin „Sauer“
Glissitol

Colitis

Antagon C
Methylthiouracil
Nikotinsäureamid

Targesin
Targesin-Tabl.

Commotio cerebri

Alluval
Camphedrin
Kalypton

Melven
Philodorm

Coronarinsuffizienz

Angioton
Crataegutt
Euphydigital
Euphyllin
Leandin

Mafera
Melven
Nitro-Tabl. „Schering“
g-Strophanthin

Dämmerschlaf

Scomodrin

Darm-Atonie

Betasiid
Hypostin

Hypostin forte
Oxyphysin

Darmtoxicose

Adsorgan
Mezym
Oroseran

Pancurmen
Milax
Sulfaguanidin

Diabetes insipidus

Hypostin
Hypostin forte

Oxyphysin

Diabetes mellitus

Insulin

Depot-Insulin

Diphtherie

Cortiron
Di-Scarlatoxid
Diphtherie-Toxoid

Silargetten
Tritoxoid

Diurese

Cynosid
Diugutt
Diursan
Euphyllin

Tonasid
weitere siehe „Herz-
insuffizienz“

Durchblutungsstörung, periph.

Dehydasa
Nitro-Tabletten
Oestrasid

Sanaestin
Testoviron

Dysbakterie

Daucaron
Intestolysin

Ulcoterran
Vitamin K

Dysenterie

Adsorgan
Albucid
Cortiron

Sulfaguanidin
Targesin-Tabl.
Tonasid

Dyspepsie

Balsam Nr. 35
Dyspepsol Granulat.
Pulver und liquid.
Gastrosecrin „Sauer“
Kohletabletten „Fahlberg“
Mezym
Millefolan

Oroseran
Pancurmen
Pepsacid
Rutanol 20
Ulcoterran
Uplex
Wiener Balsam

Dystonie

siehe „Vegetative Dystonie“

Dystrophie

s. Eiweißmangelschaden

Dystrophia adiposo-genitalis	
Hypophysis pars ant.	Testoviron
Dysurie	
Cystiplant	Oestrasid
Eiweißmangelschaden	
Cystin	Glykosal
Globinal	Tonasid
Ejaculatio praecox	
Testoviron	
Emesis	
Bellatotal	Glykofrukton
Brosedan	Melival
Calorose	Peremesin
Cortiron	
Endocarditis	
Oramid	Penicillin
Enteritis	
Adsorgan	Nicotinsäureamid
Durchfalltropfen	„Jenapharm“
Gastrase	Pancurmen
Gastrosecrin „Sauer“	Pepsacid
Glykofrukton	Rutanol 20
Intestolysin	Sulfaguanidin
Kohletabletten „Fahlberg“	Targesin-Tabl.
	Ulcoterran
Enuresis nocturna	
Bellatotal	Hypophysis pars ant.
Enuroplant	Pervitin
Ephedrin „Fahlberg“	Placentol
Ephedrin-Dragees f. Kinder	Testoviron
Homoseran	
Epicondylitis humeri	
Karwendolan 20%	Viprasid
Plenosol	
Ernährungsstörung	
Daucarpon	Kindernährzucker
Dextromalt	
Erregungszustand	
Alluval	Plantival
Brosedan	Scomodrin
Melival	Secatropin
Nervinum	
Philodorm	

Erschöpfungszustand, phys.

Arsen-Triferrol	Haematogen „Sicco“
Arsen-Helpin	Helpin
Biofungin	Hypophysis pars ant.
Bionektarin	Lecilade „Bernburg“
Dextromalt	Melival
Drei-Nerv-Dragees	Testes siccati Dragees
Ferrofungin	Tonasid
Globinal	Tonikum
Glykosal	

Fettresorptionsstörung

Vitamin K „Pharma“

Fettsucht

Karlsbader Salz	Thyreoidin
Thyreoidea sicc.	

Flatulenz

siehe Meteorismus

Fleckfieber

Cortiron

Fissur, anal

Anthaesin-Haemo-Balsam	Fissurin-Salbe
Anthaesin-Haemo-Zäpfchen	Hamamelis-Salbe
Anaesthesin-Salbe „Wolfen“	Karwendol-Suppos.
Apседon	Rektafalicaïn
Ephiten-Salbe	Traumaflid-Salbe

Ganglienblockade

Jenacain

Gastritis

Carvomin	Neutralon
Gastrase	Neutralon c. Belladonna
Gastro-Sil	Rutanol 20
Gastro-Sil „B“	Targesin
Gelonida stomachica	Ulcoterran
Magenpulver	Wecustan
Magenpulver m. Belladonna	

Gastroenteritis

Allicepan	Sulfaguanidin
Curcumen	Uplex
Gastrase	weitere siehe „Enteritis“
Mezym	

Gicht

Atophan
Atophanyl
Balsam Acht
Formidium
Lerminol

Opetol
Rheumatox
Uraton
Vipracutan
Viprasid

Grippaler Infekt

Acesal
Anginos
Antineuralgica-Tabletten
Combiphenan
Dolosin
Fibrex
Flaviform
Gelonida antineuralgica

Guajektol
Influvit
Kephalosan
Lopirin
Nisülen
Oramid
Silargetten
Tonsiotren

Haemorrhagische Diathese

Ascorvit
Haemostypt

Rutabion
Vitamin K „Pharma“

Haemorrhoiden

Anaesthesin-Salbe „Wolfen“
Anthaesin-Haemo-Salbe
Apsedon und Apsedon-Salbe
Devaricin
Fissurin-Salbe
Hamamelis-Stuhlzäpfchen
Hametum-Extrakt
Hametum-Salbe

Karwendol-Suppos.
Rektafalicaïn
Sanal-Haemo-Salbe
Sanal-Haemo-Zäpfchen
Traumafliid
Unguentum hamamelidis
Varicocid

Heilflebertherapie

Oleum Terebinth.
Pyrasid

Sufrogel

Hepatitis

Billiton
Calorose
Cholin-Kapseln
Cortiron
Cystin

Globalin
Glycofructon
Melven
Vitamin K „Pharma“

Hepatopathie

Billiton
Calorose
Cystin

Falichol
Glykofrukton
Melven

Herzinsuffizienz, Vitium cordis

Adonalis	Euphyllin
Aureaticum	Glykofrukton
Angioton	Kyaugutt
Aurocard	Lanat
Calorose	Leandin
Camphedrin	Liquitalis
Convallan	Melven
Crataegutt	Oleum camphorat.
Cynosid	Panlanat
Diacard	Purostrophan
Digiblettten	g-Strophanthin
Digicordin	k-Strophanthin
Digitoxin	Strophantose
Essentia aurea	Traubenzuckerlösung
Euphydigital	

Herzneurose

Alluval	Dreierleitropfen
Alluval forte	Kyaugutt
Angioton	Melival
Brosedan	Vitacardoi

Herpes zoster

Viprasid	Karwendol-Puder 5%
Anaesthesin-Salbe „Wolfen“	

Heufieber

Calcium-Resorpta-Sirup	Ephedrin „Fahlberg“
Calciumthiosulfat-Amp.	Pervitin
„Schering“	Thiantan
Cupridium	

Hidrosadenitis

Pyolysin	Staphysol
Staphylotropin	

Hühnerauge, Hornhaut

W-Tropfen

Hyperacidität

Bellatotal	Neutralon
Gastro-Sil	Neutralon c. Belladonna
Gastro-Sil „B“	Rutanol 20
Gelonida stomachica	Uplex
Magenpulver	Ulcoterran
Magenpulver m. Belladonna	

Hyperemesis gravidarum

Peremesin

Hyperhidrosis (pedum) Bellatotal Vasenol Fußpuder	Wofasept „Spezial“
Hypersekretion siehe „Hyperacidität“	
Hyperthyreose Alluval Alluval forte Dijodtyrosin Jorondellen	Methylthiouracil Reducto Secatropin
Hypertonie Alluval forte Crataegutt Dehydasal Euphyllin-Jod-Calcium Guttajod	Jorondellen Melven Nitro-Tabl. „Schering“ Viscophyll
Hypothyreose Guttajod Thyreoidea sicc.	Thyreoidin
Hypotonie Calorose Corvitol Ephedrin „Fahlberg“ Melven	Neospiran Pentadrin Pervitin
Ileus paralyt. Oxyphysin	
Impotenz Testes sicc.	Testoviron
Inappetenz Carvomin Betamid Pepsacid	Tonasid Vitamin A und D
Infantilismus Hypophysis pars ant. Oestrasid	Testoviron Thyreoidea sicc.
Infektionskrankheit, allgem. Albucid Ascorvit Jenacillin A und O Prontosil	Rutabion Sulfanilamid Sulfaguanidin

Intoxikation

Adsorgan	Glykofrukton
Calciumthiosulfat-Amp. „Schering“	Hepartonyl forte
Calorose	Kohletabl. „Fahlberg“
Cortiron	Melven
Dithioglycerin	Pernaemyl forte
Dyspepsol Granulat. u. Liquid.	Pervitin
Gastrase	Tonasid
	Traubenzuckerlösung

Ischias

Atophan	Methysal
Atophanyl	Rheumatox
Balsam Acht	Salva nos
Bryorheum	Sufrogel
Cupridium	Sulfur Colloo
Formidium	Vipracutan
Jenacain	Viprasid
Lerminol	

Kachexie, Simmond'sche

Hypophysis pars ant.	Globinal
----------------------	----------

Kapillarbrüchigkeit

Rutabion

Katarrh der oberen Luftwege

siehe „Bronchitis“

Klimakterium virile

Testes sicc.	Testoviron
--------------	------------

Kollapszustand, kreislaufbedingter

siehe „Kreislaufinsuffizienz“

Kopfschmerz

Antineuralgica-Tabl.	Kephalosan
Dolosin	Oramid
Fibrex	Spalt-Tabletten
Gelonida antineuralgica	Titretta analgica

Kreislaufinsuffizienz

Adrenasid	Melissengeist
Calorose	Melven
Camphedrin	Neospiran
Corvitol	Oleum camphoratum
Ephedrin „Fahlberg“	Pentedrin
Euphydigital	Strychnin. nitric.
Euphyllin	Vitacardol
Glykofrukton	(s. auch „Hypotonie“)
Hoffmannstropfen	

Kretinismus Thyreoidea sicc.	Thyreoidin
Kryptorchismus Hypophysis pars ant.	Testoviron
Lebercirrhose Cortiron Cystin	Euphyllin-Calcium
Leukämie Aethylurethan Dimitan	Trimitan
Lokalanaesthesie Jenacain	
Lumbago siehe unter „Rheuma“	
Lungengangrän Albucid Neo-Arsoluin	Penicillin † Sulfanilamid
Lungenödem siehe „Asthma cardiale“ und „Herzinsuffizienz“	
Lymphadenitis Arsen-Helpin Echinacin Helpin	Karwendol Pyolysin
Lymphogranulomatose Dimitan	Trimitan
Lymphosarkom Dimitan	Trimitan
Magersucht Arsen-Helpin Cortiron Dijodtyrosin	Helpin Hypophysis pars ant. Vitamin A und D
Meteorismus Adsorgan Allicepan Antagon C Carvomin Gastrosecrin „Sauer“	Mezym Pancurmen Rutanol 20 Sulfagnanidin
Migräne Epileptasid Jecoffin Migranden	Proluton Sanaestin

Morbus Basedow	
Cortiron	Methylthiouracil
Dijodtyrosin	
Morbus Bechterew	
Plenosol	Viprasid
Sufrogel	
Muskeldystrophie	
Glykokoll „Fahlberg“	Glykokoll „Chemidropa“
Myalgie	
Fibrex	Opetol
Formidium	Redskin
Gelonida antineuralg.	Sulfur-Colloo
Jecoffin	Titretta analgica
Lerminol	Vipracutan
Methysal	
Myasthenie	
Glykokoll „Fahlberg“	Glykokoll „Chemidropa“
Myelose, funiculäre	
Arsen Helpin	Helpin
Betasid	siehe auch „Anaemia
Glykosal	perniciosa“
Myotonia congenita	
Glykokoll „Fahlberg“	Glykokoll „Chemidropa“
Myxödem	
Thyreoidea sicc.	Thyreoidin
Nausea	
Colsil	Peremesin
Hingfong-Essenz	
Nephritis	
Cynosid	Euphyllin-Calcium
Diugutt	
Neuralgie	
Anti-Neuralgica-Tabl.	Lerminol
Balsam Acht	Melissengeist
Betasid	Methysal
Cupidium	Opetol
Dolosin	Oramid
Eseneçal Tinktur	Plenosol
Fibrex	Redskin
Formidium	Rheumafliud
Gelonida antineuraig.	Titretta analgica
Jecoffin	Vipracutan
Jenacain	Viprasid
Kephalosan	

Obstipation

Antagon C
Apsedon
Dragees Neunzehn
Euglissin
Gecolax
Haarlemer Öl
Karlsbader Salz

Mergentheimer Salz
Milax
Nikotinsäureamid
Normacol
Promassolax
Regulaxier Tabl.

Osteomalazie

Calcium-Resorpta-Sirup
Sulfonamid
Calmasan

Tecosal
Vitamin A + D
Vitaplasgen

Osteomyelitis

Penicillin
Pyolysin
Siliphen

Staphylotropin
Staphysol

Osteoporose

Calciumthiosulfat-
Amp. „Schering“
Calcium-Resorpta-Sirup

Calmasan
Dekristol
Vitaplasgen

Oxyuriasis

Allicepan
Gelonida Aluminium subacetici
Gentiaeverm

Karwendol-Suppos.
Viocid

Pankreasinsuffizienz

Mezym

Pancurmen

Paratyphus

Adsorgan
Chloromycetin

Intestolysin

Pellagra

Nikotinsäureamid

Corvitol

Pertussis

siehe unter „Pädiatrie“

Pleuritis

Aminosin-Spiritus
Calcium-Resorpta-Sirup
Jodisal-Salbe

Opetol
Redskin
Vipracutan

Pneumonie

Albucid
Camphedrin

Oleum camphor.
Penicillin

Prostata-Erkrankungen

siehe „Urologie“

Pruritus ani

siehe „Dermatologie“

Rachitis

Calciumthiosulfat-Amp. „Schering“	Dekristol
Calcium-Resorpta-Sirup	Vitamin A und D
Calmasan	Vitaplasgen

Rhagaden

Anaesthesin-Salbe „Wolfen“	Glykolan
Anthaesin-Haemo-Balsam und Zäpfchen	Glykopud
Ephiten-Salbe	Rektafalicain
Fissurin-Salbe	Unguentum Hamamelidis
	Traumafliid-Salbe

Rheuma (Gelenk)

Aminosin-Spiritus	Formidium
Antineuralgica-Tabl.	Gelonida antineuralgica
Atophan	Lopirin
Atophanyl	Oleum Terebinth.
Combiphenan	Oramid
Cortiron	Rheumatox
Cupridium	Sufrogel
Dolosin	Sulfur-Collo
Esmarolan	Viprasid
Fibrex	

Rheuma (Muskel)

Aminosin-Spiritus	Lopirin
Balsam Acht	Methysal
Bryorheum	Opetol
Esenecal-Tinktur	Redskin
Esmarolan	Rheumafluid
Fichtennadel-Franzbranntwein	Rheumatox
Franzbranntwein	Salva nos
Jecoffin	Viperolan Salbe
Kampferspiritus	Vipracutan
Lerminol	

Röntgenkater

Colsil	Peremesin
--------	-----------

Röntgenkontrastmittel

Bilitrast	Uroselectan B
Lactobaryt	

Ruhr

siehe „Dysenterie“

Sklerose, multiple

Aminosin-Salbe	Helpin
Dithioglycerin	Vasenum mercuriale

Scorbut

Ascorvit

Spasmus, allgemein

Bellatotal
Bellatotal comp.
Dehydasaal
Jecoffin

Melival
Morphinum hydrochlor.
c. Atropin. sulfuric.

Sprue

Globinal
Hepartonyl forte

Pernaemyl forte

Subacidität

Carvomin
Gastrosecrin „Neutral“
Neutralon

Neutralon c. Bellad.
Pepsacid

Scharlach

Cortiron
Di-Scarlatoxid
Penicillin

Scarlatoxid
Silargetten

Schlaflosigkeit

Alluval
Alluval forte
Brojunival
Brojunival verstärkt
Broседan
Calcium bromatum
Gecobrol

Kalypnon
Melival
Nervinum
Passodorm
Philodorm
Plantival

Sterilität

Oestrasid

Testoviron

Struma

Jorondellen
Thyreoidea sicc.

Thyreoidin
Vitamin A

Tetanie, latente

Calciumthiosulfat-Amp.
„Schering“

Tachystin
Vitamin A u. D

Thrombophlebitis

Echinacin

Provenoplex

Thyreotoxikose

siehe „Hyperthyreose“

Tuberkulose

„PAS“ Wolfen
Tebethion

Vitamin A und D

Tussis

siehe „Bronchitis“

Typhus (Paratyphus siehe unter „P“)

Adsorgan
Cortiron
Intestolysin
Targesin-Tabl.

Ulcus ventriculi et duodeni

Bellatotal
Gastrase
Gastrosil und Gastrosil B
Gelonida stomachica
Homoseran
Jecoffin
Jenacain
Magenpulver m. Belladonna
Neutralon
Neutralon c. Belladonna
Oestrasid
Rutanol 20
Sanaestin
Targesin
Ulcoterran
Uplex
Wecustan

Umstimmungstherapie

Acirufan
Arsen-Helpin
Caseosan
Cupridium
Formidium
Helpin
Homoseran

Unverträglichkeitserscheinung, medikamentöse

Adrenasid
Thiantan

Urticaria

Adrenasid
Calcium gluconic. 10%
Calcium-Resorpta-Sirup
Calciumthiosulfat-Amp.
„Schering“
Formidium
Teer-Sulfoderm-Puder
Thiantan
Vasenol-Schwefel-Puder
Karwendol-Puder

Varicen

Devaricin
Hametum-Extrakt und Salbe
Provenoplex
Unguentum Hamamelidis
Varico-Calorose
Varicocid

Vitium cordis

siehe „Herzinsuffizienz“

Vegetative Dystonie

Alluval
Alluval forte
Epileptasid
Nervinum
Secatropin

Haut- und Geschlechtskrankheiten (Dermatologie)

Akne vulgaris

Collosulfan-Puder
Cortiron
Homoseran
Oestrasid-Salbe
Oestrasid-Tabl.
Ovo-Transannon

Staphylotropin
Staphysol
Sulfoderm-Puder
Sulfur-Colloo
Vasenol-Schwefel-Puder

Balanitis

Actol
Bisuderm

Tonil
Vasenol-Fußpuder

Decubitus

Anaesthesin-Salbe „Wolfen“
Echinacin ext.
Fissurin-Salbe
Glykolan
Glykopud
Hametum-Puder
Lactalbin-Salbe
PA-Puder

Pyolysin
Siliphen
Teer-Sulfoderm-Puder
Tonil
Uscabin liquid.
Vaopin-Salbe
Vaopin-Wundstreupulver
Vasenol-Leberöl-Paste 25%/o

Ekzeme

Acirufan
Antipyoderm-Salbe
Calciumthiosulfat-Amp.
„Schering“
Calcium-Resorpta-Sirup
Calmasan
Collosulfan-Bad u. -Puder
Echinacin intern
Ephiten-Salbe
Fissurin-Salbe
Formidium
Glykolan
Glykopud

Karwendol-Puder
Karwendolan
Lactalbin-Salbe
Melven
Oestrasid-Salbe
PA-Puder
Pastaderm
Pyolysin-Salbe
Teer-Sulfoderm-Puder
Thyreoidea sicc.
Tonil
Vasenol-Paste
Wecusta-Balsam

Epidermophythen

Actol
Actol-Puder
Falipsoryl
Karwendol-Puder

Pastaderm
Uscabin
Valvanol-Tinktur

Epididymitis

siehe unter „Urologie“

Erysipel	
Albucid	Prontosil
Karwendolan	
Favus	
Thianthrol-Salbe	
Folliculitis	
Myko liquid	Staphylotropin
Penicillin-Salbe	Sulfoderm-Puder
Pyolysin flüssig	Sulfur Colloo
Pyolysin-Salbe	Vasenol-Schwefel-Puder
Staphysol	
Frostschaden	
Epithen-Salbe	I. O.-Syn
Fissurin-Salbe	Oestrasid-Salbe
Frigidin-Salbe	Vaopin-Salbe
Furunkulose	
Albucid	Penicillin
Caseosan	Pyolysin-Salbe
Collosulfan-Puder	Staphylotropin
Echinacin intern	Staphysol
Epithen-Salbe	Sulfur Colloo
Homoseran	Vaopin-Wundstreupulver
I. O.-Syn	Lebertran-Salbe 30%
Karwendolan	
Gonorrhoe	
Penicilin	Targesin
Hautallergie	
Acirufan	Nicotinsäureamid
Calcium bromatum	„Jenapharm“
Calciumthiosulfat-Amp.	Sanaestin
„Schering“	Thiantan
Hautdesinfektion	
Pervalen	Valvanol-Tinktur
Hautschutz	
Fissurin-Salbe	Vasenol-Hautschutzsalbe
PA-Salbe	Typ FS und Typ W
Promassol-Hautschutzsalbe	Wecusta-Balsam
Impetigo	
Collosulfan-Puder	Pyolysin-Salbe
Glykolan	Staphysol
Glykopud	Staphylotropin
Karwendolan	Sulfoderm-Puder
Penicillin	

Intertrigo

Anaesthesin-Salbe „Wolfen“	Glykopud
Fissurin-Salbe	Lactalbin-Salbe
Collosulfan-Puder	Sulfoderm-Puder
Glykolan	Wund- und Heilsalbe

Karbunkel

siehe unter „Furunkulose“

Komedomen

Collosulfan-Puder	Vasenol-Schwefel-Puder
Sulfoderm-Puder	

Kondylom

Vasenol-Fußpuder

Lichen ruber planus

Neo-Arsoluin

Lues

Liulan 101	Penicillin
Liulan forte	Pyrasid
Neo-Arsoluin	Vasenol. mercuriale
Neobigrol	Wismusan oleosum

Lupus erythematodes

Liulan forte	Wismusan oleosum
Neobigrol	

Lupus vulgaris

Dekristol forte

Lymphangitis

Echinacin	Vitamin A
Karwendolan	Vitamin B 1

Mykosis

Actol	Actol-Puder
-------	-------------

Narben

Aminosin

Nekrosis

Glykolarr	Siliphen
Glykopud	

Neurodermitis

Echinacin	Pastaderm
Falipsoryl	Transannon
Ovo-Transannon	

Panaritium

Karwendolan	Penicillin
Myko liquid	

Ulcus cruris

Anaesthesin-Salbe „Wolfen“	Pyolysin-Salbe
Echinacin	Siliphen
Epithen-Salbe	Targesin-Salbe
Glykolan	Tonil
Glykopud	Traumafliid-Lösung
Lactalbin-Salbe	Vaopin-Salbe
PA-Puder	Vaopin-Wundstreupulver
Penicillin	Vasenol-Leberöl-Paste 25%
Pyolysin flüssig	

Urticaria

Acirufan	Karwendol-Puder
Adrenasid	Teer-Sulfoderm-Puder
Calcium-Resorpta-Sirup	Thiantan
Cupridium	Vasenol-Schwefel-Puder
Formidium	

Verwachsungen

siehe unter „Narben“

Wundinfektion

Hamamelis-Salbe	Penicillin-Puder „Jenapharm“
Hametum-Salbe	Pyolysin
Myko liquid	Tonil
Penicillin-Salbe „Jenapharm“	

Neurologie und Psychiatrie

Brachialgia nocturna paresth.	
Ascorvit	Viprasid
Oestrasid	
Chorea minor	
Epileptasid	Lepitoin
Depression	
Pervitin	Testes sicc.
Dystonie, vegetative	
Alluval forte	Nervinum
Epileptasid	Secatropin
Epilepsie	
Calcium bromatum	Lepitoin
Epileptasid	Kalyphon
Erregungszustände	
Alluval	Melival
Alluval forte	Nervinum
Brojunival verstärkt	Philodorm
Brojunival	Plantival
Gecobrol	Secatropin
Kalyphon	Scomodrin
Krampfzustände, cerebrale	
Lepitoin	
Neuralgie	
Aminosin	Kephalosan
Balsam Acht	Lerminol
Dolosin	Methysal
Esenecal-Tinktur	Oramid
Esmarolan	Rheumafluid
Fibrex	Sanaestin
Gelonida antineuralg.	Titretta analg.
Jecoffin	Vipracutan
Jenacain	Viprasid
Neuritis	
Jecoffin	Sanaestin
Jenacain	Sulfur. Colloo
Opetol	Titretta analg.
Redskin	Vipracutan
Rheumatox	Viprasid

Parese

Strychnin. nitr.

Pyknolepsie

Lepitoin

Reaktion, psychogene

Alluval
Alluval forte
Brojunival
Brojunival verstärkt
Calcium bromatum

Dreinerly-Dragees
Gecobrol
Melival,
Plantival
Secatropin

Schizophrenie

Cortiron

Schock

Adrenasid
Camphedrin

Neospiran
Pentedin

Trigeminusneuralgie

Chlorylen
Jenacain
Jecoffin

Lepitoin
Titretta analg.
Viprasid

Gynaekologie

Abortus

Proluton

Adnexitis

Aminosin
Caseosan
Cupridium
Echinacin

Karwendol-Globuli
Karwendol-Suppos.
Ol. Terebinth.

Amenorrhoe (prim. u. sek.)

Hypophysis pars ant.
Oestrasid

Proluton
Ovo-Transannon

Amenorrhoe (hyperhormonale)

Proluton

Antikonzeption

Speton

Atonia uteri

Hypostin
Hypostin forte

Oxyphysin

Blutungen p. p. et p. a.

Falistrypt
Haemostypt
Styptan

Styptigutt
Thrombin

Desinfektion

Chloramin „Fahlberg“
Valvanol

Wofasept „spezial“

Dysmenorrhoe

Bellatotal
Eufemyl
Gelonida antineuralgica
Melival
Menostaticum
Oestrasid

Oramid
Proluton
Spalt-Tabl.
Testoviron
Titretta analgica
Thyreoidea sicc.

Endometritis

Falistrypt
Oestrasid

Styptan
Styptigutt

Fluor	
Aminosin-Globuli	Pevaletten
Antavagin	Tonil
Calcium-Resorpta-Sirup	Traumafliid-Lösung
Echinacin	Vagitral
Karwendol-Globuli	Neo-Vagitral
Karwendol-Suppos.	
Frigidität	
Oestrasid	Testoviron
Geburtseinleitung	
Hypostin	Oxyphysin
Gynäkomastie	
Hypophysis pars ant.	Testoviron
Oestrasid	Testes sicc.
Hypermenorrhoe	
Eufemyl	Testoviron
Oestrasid	
Hypoplasie, genit.	
Hypophysis pars ant.	Oestrasid
Klimakt. Beschwerden	
Euphyllin-Jod-Calcium	Ovo-Transannon
Klimaktoplant	Transannon
Menostaticum	Vispur-Mistelsaft
Oestrasid	Viscophyll
Kolpitis	
Karwendol-Globuli	Pevaletten
Karwendol-Suppos.	Tonil
Oestrasid-Salbe	Vagitral
PA-Puder	Neo-Vagitral
Laktations-Verhinderung	
Oestrasid	Testoviron
Mastalgia menstrualis	
Proluton	Testoviron
Mastitis	
Anaesthesin-Salbe „Wolfen“	Pyolysin-Salbe
Karwendolan	Tonil
Myko liquid	Traumafliid-Lösung
Penicillin	Vaopin-Salbe
Pyolysin	

Metrorrhagie	Eufemyl Menostaticum Oestrasid	Proluton Styptigutt Testoviron
Oligomenorrhoe	Hypophysis pars ant. Oestrasid	Proluton Thyreoidea sicc.
Ovulationsblutung	Proluton	
Parametritis	Aminosin-Globuli Karwendol-Globuli	Karwendol-Suppos.
Placentarretention	Hypostin	Oxyphysin
Polymenorrhoe	Oestrasid Proluton	Testoviron
Portio-Erosion	Echinacin Fissurin-Salbe Karwendol	Oestrasid-Salbe siehe auch „Kolpitis“
Pruritus vulvae	Acirufan Anaesthesin-Salbe „Wolfen“ Cupridium Formidium	Hametum-Extrakt Karwendol-Puder Oestrasid-Salbe OVO-Transannon
Puerpuralsepsis	Echinacin	Penicillin
Schwangerschaftsdermatose	PA-Puder	
Schwangerschaftstoxikose	Glykofrukton Hepartonyl forte Melven	Pernaemyl forte Proluton
Sterilität	Oestrasid	Proluton
Tamponade	Vasenol-Tamponadestreifen	

Uterus myomatosus

Testoviron

Vaginitis

PA-Puder

Verwachsungen

Aminosin

Aminovagin

Vulvitis

Oestrasid-Salbe

Pyolysin

Wehenschwäche

Hypostin

Oxyphysin

Chirurgie

Bandscheibenprolaps

Jenacain z. Therapie

Blasenerkrankung

siehe „Urologie“

Blutung, parenchymatös

Falistrypt

Haemostrypt

Styptan

Thrombin

Cholecystektomie

Vitamin K „Pharma“

Decubitus

Anaesthesin-Salbe „Wolfen“

Echinacin

Glykolan

Glykopud

Hametum-Puder

Lactalbin-Salbe

Pyolysin

Siliphen

Teer-Sulfoderm-Puder

Tonil

Uscabin liquid.

Vaopin-Salbe

Vaopin-Wundstreupulver

Vasenol-Leberöl-Paste 25%

Desinfektion

Chloramin „Fahlberg“

Jodana-Tinktur

Valvanol-Tinktur

Wofasept

Epididymitis

siehe „Urologie“

Furunkel, Karbunkel

Albucid

Caseosan

Echinacin

Epithen-Salbe

I. O.-Syn

Lebertransalbe 30%

Karwendolan

Myko liquid

Penicillin

Pyolysin-Salbe

Staphylotropin

Staphysol

Tonil

Vaopin-Wundstreupulver

Sulfur Collo

Kollaps, post operationem

Adrenasid

Corvitol

Ephedrin „Fahlberg“

Neospiran

Ol. camphorat.

Pentedin

Pervitin

Strychnin. nitr.

g-Strophanthin

k-Strophanthin

Lokalanaesthesie

Jenacain

Lymphadenitis

Arsen Helpin

Echinacin

Helpin

Pyolysin

Lymphosarkom	
Dimitan	Trimitan
Narben	
Aminosin	
Narkosevorbereitung	
Morphin. hydrochlor. c. Scopol. hydrobrom.	Scomodrin
Panaritium	
Echinacin Karwendolan	Myko liquid Penicillin
Paraproktitis	
Penicillin	
Phlegmone	
Echinacin Karwendolan Lebertransalbe 30 %	Myko liquid Penicillin Pyolysin
Prostata Erkrankung	
siehe „Urologie“	
Sympaticus-Blockade	
Jenacain z. Therapie	
Strumektomie	
Dijodtyrosin	Thyreoidea sicc.
Tamponade	
Vasenol-Tamponadestreifen P u. S	
Tendovaginitis	
Jodisal-Salbe Karwendolan	Vipracutan
Ulcus cruris	
Anaesthesin-Salbe „Wolfen“ Echinacin Epithen-Salbe Glykolan Glykopud Lactalbin-Salbe PA-Puder Provenoplex Pyolysin flüssig	Pyolysin-Salbe Siliphen Targesin-Salbe Tonil Traumafliid-Lösung Vaopin-Salbe Vaopin-Wundstreupulver Vasenol-Leberöl-Paste 25%
Wundbehandlung	
Bisuderm Jodana-Tinktur Lactalbin-Salbe Lebertransalbe 30 % Myko liquid Penicillin-Wundpuder „Jenapharm“	Penicillin-Salbe „Jenapharm“ Pyolysin flüssig Pyolysin-Salbe Tonil Traumafliid-Lösung Vaopin-Salbe Vaopin-Wugdstreupulver

Pyelonephritis

Albucid
Euvernil

Hexamethylentetramin-Tabl.
Penicillin

Röntgenkontrastmittel (Harnorgane)

Uroselectan B

Ureterkolik

Bellatotal
Bellatotal comp.

Morphium hydrochlor. c.
Atropin. sulfuric.

Urethritis

Echinacin

Pyolysin

Pädiatrie

Bronchitis

Anaesthesin-Dragees	Fenchel-Hustensaft
Eupatal	Guajektol
Fenchelsirup mit reinem Bienenhonig	Probonchin
	Tussistin-Sirup

Chorea minor

Calcium bromatum	Epileptasid
------------------	-------------

Dyspepsie

Carvomin	Kohletabl. „Fahlberg“
Dyspepsol „Fahlberg“ Granulat.	Mezym
Dyspepsol „Fahlberg“ liquid.	Oroseran
Dyspepsol „Fahlberg“ Pulver	Pancurmen
Gastrosecrin „Sauer“	Pepsacid
	Rutanol 20
	Sulfaguanidin

Enuresis nocturna

Bellatotal	Hypophysis pars ant.
Enuroplant	Placentol
Ephedrin „Fahlberg“	Testoviron

Ernährungsstörung

Daucaron	Oroseran
Dextromalt	Kindernährzucker

Intertrigo

Anaesthesin-Salbe „Wolfen“	Sacutil-Kindercreme
Fissurin-Salbe	Vasenol-Paste
Hametum-Puder	Vasenol-Wund- u. Kinderpuder
Sulfoderm-Puder	Wecusta-Balsam
Sacutil-Kinderpuder	

Milchschorf

Lactalbin-Salbe	Thiantrolsalbe
-----------------	----------------

Möller-Barlow'sche Krankheit

Ascorvit forte	
----------------	--

Nabelpflege

PA-Puder	Bisuderm
Vaopin-Wundstreupulver	

Pemphigus

Neo-Arsoluin	
--------------	--

Pertussis

Calcium bromatum	Pulmogeran-Salbe
Epecton	Tri-Toxoid
Epecton-Tropfen	Tussedrin
Extussin	Tussifluid
Guajektol	Tussistin-Tabl.
Hatussin	Tussitropin forte
Menthymín	Tussylvan
Probronchin	Viropect

Polyomyelitis

Glykosal

Pyknolepsie

Lepitoin

Rachitis

Calmasan	Calciumthiosulfat-Amp.
Calcium-Resorpta-Sirup	„Schering“
Dekristol	Vitamin A und D
	Vitaplasgen

Säuglingspflege

Hametum-Puder	Vasenol-Paste
Hametum-Salbe	Vasenol-Öl
Vasenol-Kindercreme	Wecusta-Balsam
Vasenol-Wund- und Kinder-Puder	

Scrofulose

Calcium-Resorpta-Sirup	Vitamin A
Dekristol	Vitamin A und D
Dekristol forte	Vitaplasgen
Liulan	

Spasmophile

Calcium bromatum	Calciumthiosulfat-Amp.
Calcium gluconic. 10%	„Schering“

Tracheitis

Santa Flora	Tussistin-Sirup
-------------	-----------------

Wachstumsstörung

Vitamin A und D	Hypophysis p. a.
-----------------	------------------

Hals-, Nasen-, Ohren-Erkrankungen

Angina

Albucid	Neobigrol
Anaesthesin-Menthol-Dragees	Penicilletten
Anginos	Penicillin
Calcium-Resorpta-Sirup	Prontosil
Echinacin	Pyolysin
Flaviform	Reducto
Jorondellen	Silargetten
Lacuprin	Sulfur-Collo
Liulan 101	Targesin
Menthol-Eucalyptus-Dragees	Targophagin
Mucidan	Tonsiotren

Blutungen aus Mund, Nase und Ohr

Falistrypt-Puder	Styptan
Haemostypt	Thrombin

Gingivitis

Anaesthesin-Dragees mit Anis	Flaviform
Anaesthesin-Menthol-Dragees	Mucidan-Tinktur
Ascorvit	Penicilletten
Densana	Silargetten
Echinacin	Targophagin

Glossitis

Nicotinsäureamid „Jenapharm“	Targophagin
------------------------------	-------------

Halsdrüsenfistel

Glykolan	Glykopud
----------	----------

Heuschnupfen

Bellatotal	Pentdrin
Cupridium	Pervitin
Exrhinin	Thiantan
Exrhinisol	

Laryngitis

Anaesthesin-Dragees mit Anis	Sanopin
Anaesthesin-Menthol-Dragees	Silargetten
Anginos	Targophagin
Penicilletten	Targesin

Ohrschmerzen, neuralgische

Algolyt	Titretta analgica
---------	-------------------

Otitis externa

Pyolysin-Salbe	Karwendol
----------------	-----------

Otitis interna

Albucid	Mucidan
Algolyt	

Pharyngitis

Anaesthesin-Dragees mit Anis	Mucidan-Tinktur
Anaesthesin-Menthol-Dragees	Penicilletten
Anginos	Silargetten
Densana	Targophagin
Emser Salz	Tonsiotren
Eugarrol	Traumafflid-Lösung
Exrhinisol	

Plaut-Vincent'sche Angina

Liulan 101	Neobigrol
Neo-Arsoluin	Wismusan oleosum

Rhinitis

Boromenthol	Myko liquid
Calcium-Resorpta-Sirup	Rhinitin-Emulsion
Exrhinisol	Rhinolyt
Guttajod	Targesin-Salbe
Jorondellen	Traumafflid-Lösung

Sinusitis Mucidan

Stomatitis

Densana	Nicotinsäureamid
Eugarrol	„Jenapharm“
Flaviform	Penicilletten
Lacuprin	Pyolysin
Mucidan-Tinktur	Silargetten
	Targophagin

Tamponade

Vasenol-Tamponadestreifen P und S

Tracheitis

Promassol-Dragees	Silargetten
-------------------	-------------

Tuberkatarrh

Mucidan	Otoseden	Rhinolyt
---------	----------	----------

Ophthalmologie

Blepharo-Conjunctivitis

Albucid-Augentropfen
Dioptrix-Augensalbe
Myko liquid
Noviform-Salbe
Targesin-Salbe

Glaucom

Miotisal-Augentropfen

Hemeralopie

Vitamin A
Targesin

Hornhautanaesthesie

Ophthalicain

Hornhautgeschwüre

Caseosan

Miosis

Miotisal-Augentropfen

Tamponade

Vasenol-Tamponadestreifen

Trachom

Albucid-Augentropfen

Ulceration

Albucid-Augentropfen
Noviform-Salbe

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/03/28 : CIA-RDP80S01540R001000010005-0

Alphabetisches Heilmittelverzeichnis

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/03/28 : CIA-RDP80S01540R001000010005-0

(43 41 90 00)	ARp VVP 02	AB-Serum
Agglutinfreies menschl. Serum als Diagnosticum in Verbindung mit dem Anti-Rho-Serum für die Rh-Faktor-Bestimmung. Staatl. geprüft.		Bestandteile
Fläschchen mit 1 ccm DM 2,95		Handelsform und Preise
VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		Hersteller
(43 21 35 00)	A VVP 04/213	Acesal
Acidum acetylosalicylicum		Bestandteile
Bei fieberhaften Erkrankungen und Schmerzzuständen		Indikation
3-4 mal täglich 1-2 Tabletten		Dosierung
Packg. mit 20 Tabl. zu 0,5 g DM 0,61		Handelsform und Preise
VEB Pharm. Werk Oranienburg		Hersteller
(43 29 12 00)	A VVP 10/211	Acirulan ad Injektionem
Acidum formic. 0,001 ‰, Aurum Natr. mur. 0,001 ‰ in physiol. Kochsalzlösung.		Bestandteile
Bei Asthma bronchiale, Neuralgien, allergischen Ekzemen, Psoriasis.		Indikation
In chronischen Fällen 1 mal wöchentlich 1 ccm i. m., in akuten Fällen an 3-4 aufeinanderfolgenden Tagen je 1ccm.		Dosierung
Packg. mit 6 Amp. zu 1,1 ccm DM 1,45		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden		Hersteller
(43 24 19 00)	A VVA 01/229	Actol
10 ‰ige Lösung von Bromsalicylsäureisopropylamid in reinstem Triäthylenglykol.		Bestandteile
Bei bakteriellen und mykotischen Hauterkrankungen.		Indikation
Actol mit Verbandmull in dünner Schicht auf die erkrankten Hautpartien streichen und eintrocknen lassen.		Dosierung
Flasche mit 10 g DM 1,50		Handelsform und Preise
Flasche mit 100 g für Private DM 11,— für Kliniken DM 9,20		
VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		Hersteller

Actol-Puder		(43 24 19 00)	A VVA 01/232
Bestandteile	5 % Bromsalicylsäureisopropylamid in Talkum.		
Indikation	Zur Unterstützung des Actol liquidum bei der Prophylaxe und Therapie bakterieller und mykotischer Hautkrankheiten.		
Handelsform und Preise	Puderdose mit 20 g DM 1,20		
Hersteller	VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		
Adonalis		(43 25 43 00)	A VVP 07/245
Bestandteile	Titriertes Präparat aus Adonis vernalis. 1 ccm (30 Tropfen) = 200 F. D.		
Indikation	Cardiotonicum, nicht kumulativ wirkend.		
Dosierung	Dosierung durchschnittlich 3 mal täglich 20-30 Tropfen.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 20 ccm DM 1,70		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden		
Adrenalin. bitartaricum-Lösung 1:1000		(43 25 46 00)	ARp VVP 07/339/340
Bestandteile	(berechnet auf Base) entsprechend der offizinellen Hydrochlorid-Lösung.		
Indikation	Lokales Haemostyptikum, z. Verstärkung lokaler Anaesthesie. Als Injektion bei Herz- und Kreislaufschwäche, Kollaps, Asthma bronchiale und anderen anaphylaktischen Erscheinungen.		
Dosierung	Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 15 ccm DM 1,80 Flasche mit 50 ccm DM 3,90 Karton mit 10 Amp. zu je 1,1 ccm DM 1,65		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden		
Adrenasid		(43 25 45 00)	ARp VVP 01/212
Bestandteile	Injektionsfertige Lösung 1:600 raz. Adrenalin, entsprechend der offizinellen I-Adrenalin-Lösung 1:1000, konserviert, 0,166 % razem. Adrenalin. hydrochloric., 0,075 % Natrium - m - bisulfid, 0,8 % Natriumchlorid, 0,2 % Kons.-Mittel.		
Indikation	Zur Exzitation der Herz- u. Kreislauffähigkeit, bei Kollaps u. Schock, Urticaria, Asthma bronchiale, als Zusatz zu anaesthesierenden Lösungen sowie örtlich zur Erzeugung von Ischaemie.		
Dosierung	Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Karton mit 5 Amp. zu 1 ccm DM 1,95		
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau		

(43 26 55 00)	A VVA 01/217	Adsorgan
40 % Chlorsilber-Kieselsäure-Gel (Silargel-Heyden) + 10 % Silberkohle.		Bestandteile
Gastro-intestinale Erkrankungen auf infektiöser und chemischer Grundlage: Diarrhöen, Ruhr, Typhus, Paratyphus usw., Fleisch- und Fischvergiftungen, Intoxikationen und Autointoxikationen. Zur aetiologischen Behandlung endogener Hautaffektionen.		Indikation
Mehrmals täglich 1-2 Teelöffel. Bei frischen Erkrankungen im Anfang größere Dosis. Nicht über die Dauer von zwei Monaten hinaus anwenden!		Dosierung
Schachtel mit 25 g	DM 0,90	Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 250 g	DM 5,10	
VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		Hersteller
(43 28 41 00)	ARP VVP 13/343	Aether pro narcosi
Flasche mit 50 g	DM 0,85	Handelsform und Preise
Flasche mit 100 g	DM 1,30	
Ampi-Amp. mit 100 g	DM 2,15	
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller
(43 21 20 00)	ARp VVP 09/795	Aethylurethan Jenapharm
Carbaminsäureaethylester.		Bestandteile
Leukämien, besonders chronische, und hier in erster Linie myeloische Leukämien, weniger lymphatische Leukämien.		Indikation
Für Erwachsene bis zu 5,0 g täglich oral oder rectal in wässriger Lösung, insgesamt etwa 50 g für einen Behandlungsabschnitt.		Dosierung
Glas mit 50 g	DM 1,60	Handelsform und Preise
VEB Jenapharm, Jena		Hersteller

Agobilin (43 26 81 00) A VVP 07/213	
Bestandteile	Stront. salicyl. 0,034, Stront. cholic. 0,119, Phenolphthaleindi- acetat 0,014 pro Dragee.
Indikation	Entzündliche Krankheiten der Leber- und Gallenwege.
Dosierung	3 mal täglich 2 Dragees.
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Dragees DM 1,15 Röhrchen mit 40 Dragees DM 1,90 Klinikpackung mit 500 Dragees DM 14,65
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden
Albucid (43 25 29 00) ARp VVP 13/210/211	
Bestandteile	p-Aminobenzolsulfonacetylamid.
Indikation	Angina, Furunkulose, Cystitis, Pyelitis, Meningitis, Otitis, Dy- senterie.
Dosierung	Die Dosis beträgt für: akute Infektionen zunächst 4 Tabl., dann alle 3-4 Stunden je 2 Tabl. Die Kombinationsbehand- lung mit intravenöser Gabe der 30%igen Lösung ist anzu- raten, vor allem bei schweren Fällen. Chronische Infektionen über 6-7 Tage Stoßtherapie, danach vor dem nächsten Albucidstoß 3-5 Tage Pause. Man führt diese Behandlung im allgemeinen so lange durch, bis Keim- freiheit des Urins erreicht ist. Infolge seiner ausgezeichneten Verträglichkeit kann ALBUCID auch bei postoperativen Infektionen der Harnwege (nach Prostata-, Steinoperationen usw.) gegeben werden. Die zusätzliche Belastung des schon hoch beanspruchten Stoffwechsels durch das verabreichte ALBUCID ist außer- ordentlich gering. Anginöse Tonsillen-Erkrankungen und Oti- tiden sind gut durch ALBUCID zu beeinflussen. Die Dosis beträgt im allgemeinen 6-8 g täglich, wobei als Dosierungs- schema folgender Anhalt gegeben sei: Anfangsgabe 2 g (4 Tabl.) dann alle 3-4 Stunden je 1 g (2 Tabl.) Zur i. v. Albucidtherapie gibt man im allgemeinen 2 mal täglich eine Amp. zu 10 ccm der 30 %igen Lösung. Es ist erforderlich, diese Therapie Tag und Nacht durchzu- führen.
Handelsform und Preise	Röhrchen m. 20 Tabl. zu je 0,5 g DM 2,10 Glas mit 60 Tabl. zu je 0,5 g DM 4,90 Klinikpackung mit 500 Tabl. zu je 0,5 g DM 37,75 Karton mit 5 Amp. zu je 10 ccm 30 %ige Lösung (als Natriumsalz) DM 5,— Klinikpackung mit 50 Amp. zu je 10 ccm 30 %ige Lösung (als Natriumsalz) DM 41,30
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof

(43 25 29 00)	ARp VVP 13/200	Albucid-Augentropfen
p-Aminobenzolsulfonacetylamid-Natrium, 20 %ige Lösung.		Bestandteile
Katarrhe und Ulcerationen der Hornhaut und der Bindehaut, Prophylaxe zur Verhinderung von Infektionen nach perforierenden Verletzungen.		Indikation
Voraussetzung für einen Erfolg der Behandlung ist die Aufrechterhaltung eines möglichst gleichmäßigen Albucid-Spiegels in der Conjunctival-Flüssigkeit für etwa 2-3 Tage. Man gibt daher alle Stunden, mindestens aber in Abständen von 2 Stunden, je 2-3 Albucid-Augentropfen in den Conjunctivalsack.		Dosierung
Flasche mit 10 ccm (20 %ige Lösung) DM 2,10		Handelsform und Preise
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller
(43 23 71 00)	A VVP 02/235	Algolyt
Chlorierte Phenole und 4-Butylaminobenzoyl-Dimethylamino-äthanol in reinstem wasserfreiem Glycerin.		Bestandteile
Akute, nicht perforierte Mittelohrentzündung, neuralgische Ohrschmerzen und Trommelfellentzündung.		Indikation
Tropfflasche mit ca. 6 g DM 1,—		Handelsform und Preise
VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/200	Allicepan-Dragees
Spezialauszüge Panstabil conc. von: Allium Ceba 8,0, Allium ursinum 10,0, Raphanus niger 45,0, Extract. Frangulae 12,0, Oleum Menthae piperitae 1,0, Sacch. alb. 3,0, Talc. ad 100,0		Bestandteile
Gastrointestinale Störungen, Flatulenz, Dyskinesien der Leber und Gallenblase. Adjuvans bei klimakterischen Stoffwechselstörungen und intestinal bedingten Hauterkrankungen. Oxyuriasis.		Indikation
Abends 2-3 Dragees unzerkaut schlucken.		Dosierung
Packung mit ca. 70 Dragees DM 1,05		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller

Allicepan liquidum (43 29 12 00) AS 10/201	
Bestandteile	Spezialauszüge Panstabil von: Allium Cepa 15,0, Allium ursinum 15,0, Raphanus niger 8,0, Extract. Frangulae 20,0, Oleum Menthae piperitae 0,2, Saccharum 42,0
Indikation	Indikation wie vorstehend.
Dosierung	Abends 1-2 Teelöffel voll zu nehmen. Bei Oxyuren je nach dem Alter 1-2 Teelöffel voll abends; gleichzeitig täglicher Einlauf von 1-2 Teelöffel Allicepan auf ein achtel bis ein viertel Liter warm. Wasser mit 1 Eßlöffel Essig bzw. Essigsaure Tonerde oder 1 Teelöffel Kochsalz.
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 125 g DM 1,35 Flasche mit ca. 300 g DM 2,75
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig
Alluval (43 21 22 00) A VVP 13/208	
Bestandteile	α -Bromisovalerylcarbamid.
Indikation	Sedativum und Hypnoticum, Neurasthenie, Herzneurosen, arteriosklerotische Beschwerden. Bei Erregungszuständen und als Tagesberuhigungsmittel: Mehrmals (meist 3 mal) täglich 1-2 Tabl. in Wasser.
Dosierung	Bei Schlaflosigkeit: 3-4 Tabl. auf einmal etwa $\frac{1}{2}$ Stunde vor dem Schlafengehen, möglichst in etwas Flüssigkeit. Die Dosierung bei Kindern beträgt je nach Alter $\frac{1}{2}$ -1 Tabl. 3 mal täglich oder abends 1-2 Tabl. auf einmal.
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 10 Tabl. zu je 0,3 g DM 0,60 Klinikpackung mit 250 Tabl. zu je 0,3 g DM 11,70
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof
Alluval forte (43 21 13 00) ARp VVP 13/209	
Bestandteile	α -Bromisovalerylcarbamid 0,3, Natrium diaethylbarbituric. 0,3.
Indikation	Sedativum und Hypnoticum, Neurosen, Thyreotoxikosen, Hypertonien, Neurovegetative Dystonien.
Dosierung	3 mal täglich 1-2 Tabl. in etwas Flüssigkeit. Bei Schlaflosigkeit nehme man 3 Tabl. auf einmal etwa $\frac{1}{2}$ Stunde vor dem Schlafengehen möglichst in warmer Flüssigkeit.
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 10 Tabl. zu je 0,33 g DM 0,85 Klinikpackung m. 250 Tabl. zu je 0,33 g DM 12,80
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof

(43 29 90 00)	A VVP 05/209	Aminosin-Amp. 4 %
Allylthiocarbamid 4,0 Aqua bidest. 96,0		Bestandteile
Schmerzhafte Verwachsungen und Narben, besonders auch nach Brandwunden, bei Keloid, zur Behandlung von multipler Sklerose, Sklerodermie, Kontrakturen, Strikturen und ähnlichen Indikationen.		Indikation
Wöchentlich 2-4 Injektionen, in schweren Fällen evtl. täglich 1 Injektion subcutan, intracutan oder intramusculär. Die Einspritzungen werden am besten neben den zu behandelnden erkrankten Stellen vorgenommen.		Dosierung
Verfahrensschema: 2-3 mal wöchentlich werden 2 ccm Aminosin 4 % injiziert. Intracutan werden am ersten Behandlungstage 4 Quaddeln, am zweiten 6 und am dritten 8 Quaddeln gesetzt. Die Verträglichkeit ist besonders zu beobachten. Evtl. ist eine Mischspritze aus 2 ccm Aminosin 4 %, 2 ccm Jenacain 2 % und 5-10 ccm physiologischer Kochsalzlösung zu bereiten.		
Packung mit 5 Amp. zu 2,2 ccm . . . DM 2,05 Klinikpackung mit 50. Amp. zu 2,2 ccm DM 10,—		Handelsform und Preise
VEB Chemidropho-Werk, Chemnitz		Hersteller

(43 29 90 00)	A VVP 05/210	Aminosin-Globuli
Allylthiocarbamid 0,1, Natr. salicylic. 0,15, Suppobasin 5,25 je Glob.		Bestandteile
Zur ambulanten Behandlung schmerzhafter gynäkologischer Verwachsungen und Narben im vaginalen Bereich.		Indikation
Wöchentlich werden gemäß ärztlicher Anweisung 2-3 Globuli möglichst tief in die Scheide eingeführt, bei ambulanter Behandlung am besten abends vor dem Schlafengehen.		Dosierung
Packung mit 6 Vaginalkugeln zu 5,5 g DM 1,41 Klinikpckg. m. 50 Vaginalkugeln zu 5,5 g DM 8,58		Handelsform und Preise
VEB Chemidropho-Werk, Chemnitz		Hersteller

Aminosin-Salbe (43 29 90 00) A VVP 05/201	
Bestandteile	Allylthiocarbamid 2,0, Natr. salicylic. 3,0, Ungt. Lanettl 95,0
Indikation	Zur percutanen Behandlung schmerzhafter Verwachsungen und Narben (z. B. alte Operationsnarben, Narben nach Verletzung.), bei Kontrakturen, multipler Sklerose, Sklerodermie, Keloiden, Folgen der Spondylarthrosis und ähnlichen Indikationen.
Dosierung	Die Salbe wird an den schmerzenden, vernarbten oder sonstigen zu behandelnden Stellen eingerieben. In besonderen Fällen kann auch die zu behandelnde Körperstelle mit einer stärkeren Schicht der Salbe belegt u. durch einen gutsitzenden Verband verschlossen werden. Die Einwirkungsdauer soll in diesem Fall 24 Std. betragen. Am nächsten Tag wird die Behandlung erneuert und fortgesetzt, bis die beabsichtigte Wirkung eingetreten ist. Falls sich durch Rötung der Haut eine Reizung anzeigt, setzt man mit der Behandlung einige Tage aus.
Handelsform und Preise	Tube mit ca. 20 g DM 1,30 Klinikpackung mit ca. 500 g DM 10,50
Hersteller	VEB Chemidropha-Werk Chemnitz
Aminosin-Spiritus (43 29 90 00) A VVP 05/227	
Bestandteile	Allylthiocarbamid 2,0, Methyl. salicylic. 5,0, Sapo kalinus 12,0, Spiritus (60%) 81,0
Indikation	Zur percutanen Applikation bei der Behandlung schmerzhafter Verwachsungen und Narben, Keloiden, Kontrakturen, Schwartenbildung nach Pleuritis, rheumatischen Erkrankungen, insbesondere chronischen Gelenkerkrankungen.
Dosierung	Das Präparat wird mehrmals am Tage und besonders vor dem Schlafengehen an den schmerzenden Stellen kräftig in die Haut einmassiert. Die behandelten Körperteile werden dann warm eingehüllt.
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 100 ccm DM 2,65 Klinikpackung mit ca. 1000 ccm DM 19,30
Hersteller	VEB Chemidropha-Werk, Chemnitz

(43 29 90 00)	A VVP 05/211	Aminosin-Zäpfchen
<p>Allylthiocarbamid 0,1, Natr. salicylic. 0,15, Suppobasin 2,05 je Zäpfchen.</p> <p>Zur rectalen Behandlung schmerzhafter Verwachsungen und Narben im Magen-Darm-Traktus sowie gynäkologischer Erkrankungen im jungfräulichen Stadium.</p> <p>Wöchentlich 2-3 mal abends ein Zäpfchen einführen.</p> <p>Packung mit 5 Zäpfchen zu je 2,3 g . DM 1,— Klinikpackg. mit 50 Zäpfchen zu je 2,3 g DM 5,38</p> <p>VEB Chemidropa-Werk, Chemnitz</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 29 90 00)	A VVP 05/212	Aminovagin
<p>Allylthiocarbamid 5,0, Natr. salicylic. 7,0, Sacch. lactis 70,0, Talcum 18,0</p> <p>Zur Pulverbehandlung gynäkologischer Erkrankungen mit schmerzhaften Verwachsungen im vaginalen Bereich. Bereitung von Klysmen als rektale Behandlungsform.</p> <p>Das Pulver wird am besten vermittels Nassauer- oder Anketta-Pulverbläser in die Vagina gebracht. Wöchentlich werden 1-2 Einstäubungen vorgenommen (je Einstäubung etwa 1 Kaffeelöffel Aminovagin). Die Pulverbehandlung wird durch Massagen und Sitzbäder (38-43 Grad, 20 Minuten) unterstützt.</p> <p>Zu Klysmen werden 1-2 Kaffeelöffel Aminovagin auf 1/2 Ltr. Wasser von 50-60 Grad C angerührt und die Flüssigkeit klar abgegossen. Nach Abkühlen auf 38-40 Grad wird ein hoher Einlauf (mit tiefgelagertem Oberkörper) gegeben.</p> <p>Schraubglas mit ca. 50 g Pulver . . . DM 1,90 Klinikpackung mit ca. 300 g Pulver . . . DM 9,05</p> <p>VEB Chemidropa-Werk, Chemnitz</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 28 39 00)	A F 01/200	Anaesthesin-Dragees
<p>1 % Anaesthesin DAB 6; 0,05 % Anisöl DAB 6; 74,45 % Zucker; 24,5 % Stärkesirup.</p> <p>Bei katarrhalischen Reizzuständen der Mund- und Rachenhöhle mehrmals am Tage 1 Dragee langsam im Munde zergehen lassen.</p> <p>Schachtel mit 30 g=30 Dragees . . . DM 1,10 Schachtel mit 50 g=50 Dragees . . . DM 1,70</p> <p>VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>

Anaesthesin-Salbe „Wolfen“		(43 28 39 00)	A F 01/209
Bestandteile	10 % Anaesthesin DAB 6 in reizloser Salbengrundlage mit 4 % Wollfett DAB 6.		
Indikation	Schmerz- und juckreizstillende Wund- und Heilsalbe, Hämorrhoidalbeschwerden, Rhagaden der Brustwarzen. Messerrückendicke Salbenverbände.		
Handelsform und Preise	Dose mit 20 g Inhalt	DM 1,05	
	Dose mit 50 g Inhalt	DM 2,05	
Hersteller	VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld		
Anaesthesin-Menthol-Dragees		(43 23 52 00)	A VVP 07/214
Bestandteile	Aethyl. p-aminobenzoic. 0,0036, Menthol 0,0018, Ol. Menth. pip. 0,0029, Natr. biborac. 0,005 pro Dragee.		
Indikation	Gegen Katarrhe der oberen Atmungsorgane.		
Dosierung	Bei Bedarf 1 Dragee langsam im Munde zergehen lassen.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit ca. 30 Stück	DM 0,80	
	Klinikpackung mit ca. 200 Stück	DM 3,60	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Andolor		(43 21 35 00)	A VVT 02/219
Bestandteile	Acid. acetylosalicylic., Phenacetin aa 45,5 %, Coffein pur. 1,5 %, Bindemittel 7,5 %		
Indikation	Anti-Schmerz- und Fiebermittel.		
Dosierung	2-3 mal täglich 1-2 Tabl.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 15 Tabl. a 0,6 g	DM 0,85	
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		
Anginos		(43 23 51 00)	VVP 14/210
Bestandteile	Paraformaldehyd 1,2 %, Adipinsäure 1,6 %, Saccharum 95,5 %		
Indikation	Bei Infektionskrankheiten wie Angina, Bronchitiden, Grippe, katarrhalischen Erkrankungen des Larynx und Pharynx, auch als Prophylacticum.		
Dosierung	Man lasse alle 2 Stunden 1 Tabl. im Munde langsam zergehen, Kinder alle 3 Stunden 1 Tabl. (nicht zerkaue).		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Tabl.	DM 0,52	
Hersteller	VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		

(43 29 12 00)	A S 10/270	Angioton liquidum
Spezialauszüge Panstabil von: Cact. (75 FD/ccm) 3,0, Crataegus (10 FD/ccm) 60,0, Convallaria (350 FD/ccm) 3,0, Valeriana c. Aeth. 11,0, Lobelia D 3 6,0, Corrigenis 0,1, Spiritus (ca. 95 %) ad 100.		Bestandteile
Herzmuskelschwäche leichteren bis mittleren Grades. Funktionelle Herzstörungen, Herzneurose.		Indikation
3 mal täglich ca. 10 Tropfen in etwas Wasser vor der Mahlzeit. (Kinder und besonders vasolabile Patienten etwa die Hälfte.)		Dosierung
Flasche mit ca. 10 ccm DM 0,85 Flasche mit ca. 30 ccm DM 2,05		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/202	Angioton-Tabletten
Spezialauszüge Panstabil von: Crataegus (10 FD/ccm) 60,0, Cactus (75 FD/ccm) 3,0, Convallaria (350 FD/ccm) 3,0, Valer. c. Aeth. 11,0, Lobelia D 3 6,0, Corrigenis 2,0, Sacch. lact. ad 100,0		Bestandteile
Herzmuskelschwäche leichteren bis mittleren Grades. Funktionelle Herzstörungen. Herzneurose.		Indikation
3 mal täglich 1-2 Tabl. vor den Mahlzeiten.		Dosierung
Glas mit ca. 40 Tabl. zu 0,25 g DM 1,—		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 45 90 00)	VVP 01	Antagon C
Lyophil getrocknete biol. hochwert., antagonistisch wirkende, fermentative Coli-Stämme.		Bestandteile
Substitutionstherapie zur Regeneration einer entarteten Darmflora, zur Neubeimpfung des Darmes n. vorangegang. chemotherapeut. Behdlg. und nach speziellen bakteriellen Darmerkrankungen.		Indikation
Pro Dosis 10 Milliarden Keime pro os.		Dosierung
In Vorbereitung		Hersteller
VEB Serum-Werk Dessau		Hersteller
(43 23 27 00)	A VVP 11/203	Antasthmatica-Tabl.
Phenacetin 0,05, Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon 0,05, Phenyglycolsäurebenzylester 0,1, Coffein. 0,025, Phenyldimethylpyrazolon 0,1, Ephedrin. hydrochlor. 0,025.		Bestandteile
Antasthmaticum bei Asthma cardiale sowie bronchiale.		Indikation
1-2 mal täglich 1-2 Tabl. in etwas Wasser.		Dosierung
Röhrchen mit 20 Tabl. á 0,5 g DM 1,95		Handelsform und Preise
VEB Pharm. Werk Pankow, Berlin-Pankow		Hersteller

Antavagin		(43 45 90 00)	VVP 01
Bestandteile	Lyophil getrocknete antagonistisch wirksame Lactobakterien mit Zusätzen von Eiweiß, Kohlehydraten und Spuren von Vitamin B ₂		
Indikation	Fluor vaginalis, Vulvovaginitis, Colpitis und Endometritis.		
Dosierung	Täglich oder jeden 2. Tag post mensem für 8-10 Tage Vaginalinstillation der Trockenkultur.		
	In Vorbereitung		
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau		
Anthaesin- Brustwarzen-Salsam		(43 28 16 00)	A VVP 07/212
Bestandteile	Aethyl-p-aminobenzoic. 5,0, Extr. Chamomill. fld. 5,0, Alumin. acet. 5,0, Salbengrundlage ad 100,0.		
Indikation	Bei Entzündungen und Epithelschäden der Brustwarzen.		
Handelsform und Preise	Tube mit 20 g DM 1,15 Klinikpackung in Kruken mit 500 g DM 20,75		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Anthaesin- Haemo-Balsam		(43 26 71 00)	A VVP 07/214
Bestandteile	Extr. chamomill. fld. 2,0, Bism. subg. 2,5, Aethyl. p-aminobenzoic. 5,0, Salbengrundlage 90,5.		
Indikation	Bei Haemorrhoiden, Fissuren, Rhagaden.		
Handelsform und Preise	Tube mit 20 g DM 1,30 Klinikpackung mit 500 g DM 24,10		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Anthaesin- Haemo-Suppositorien		(43 27 72 00)	A VVP 07/257
Bestandteile	Aethyl. p-aminobenz. 0,1, Bism. subgall. 0,04, Zinc. oxyd. 0,04, Menthol. 0,04 pro Zäpfchen		
Indikation	Gegen Haemorrhoiden, Fissuren, Rhagaden		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 6 Stück DM 1,30 Schachtel mit 12 Stück DM 2,05 Klinikpackung mit 60 Stück DM 7,70		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		

(43 28 39 00)	A VVP 07/210	Anthraerin-Salbe 10 %
<p>Aethyl. p-aminobenzoic. 10,0, Salbengrundlage ad 100,0. Juckreiz (pruritus ani et vulvae), Schunden, Fissuren, Verbrennungen, Geschwüre (Ulcus cruris), Gürtelrose u. dergl. Tube mit 20 g DM 1,40 Klinikpackung in Kruken mit 500 g DM 26,15 VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul</p>		<p>Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller</p>
(43 29 12 00)	A VVP 10/203	Anti-Arterio-Calcin
<p>Bursa past. Ø, Frct. Crataegi oxyac. plv. aa 0,2, Silicea, Thio-sinamin, Hydrast. canad. Ø, Radium bromat. D 6, Kalium jodat., Intima aortae D 2 aa 0,01, Berberis Ø 0,1, Flor. Arnicae plv. 2,5, Sacch. et Massa ad 100,0. Bei Arteriosklerose. 3 mal täglich 1 Teelöffel. Packung mit 65 g Pulver DM 1,50 VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul</p>		<p>Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller</p>
(43 21 35 00)	A VVP 11/204	Antineuralgica-Pharma-Tabletten
<p>Magnes. acetylosalicylicum 0,2, Acid. acetylosalicylicum 0,2, Phenylglykolsäurebenzylester 0,05, Coffein pur. 0,05, Ephedrin 0,003. Antineuralgicum und Analgeticum bei neuralgischen Schmerzen, Kopfschmerzen. 2-3 mal täglich 1-2 Tabl. Röhrchen mit 10 Tabl. DM 0,80 VEB Pharm. Werk Pankow, Berlin-Pankow</p>		<p>Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller</p>
(43 24 19 00)	ARp VVSx 03/223	Antipyoderm-Salbe
<p>Desinfizierende Salbe auf Sulfonamidbasis. Infektiöse Dermatosen. Antipyoderm-Salbe wird entweder direkt auf die erkrankte Stelle gebracht oder auf eine Mullunterlage gestrichen, mit der die erkrankte Hautpartie bedeckt wird. Nach 1-2 Tagen können die aufgeweichten krustenartigen Hautveränderungen leicht und gut entfernt werden. Die weitere Behandlung mit Antipyoderm-Salbe erzielt eine rasche und endgültige Heilung. Packung mit ca. 20 g DM 1,20 Packung mit ca. 50 g DM 1,90 Klinikpackung m. ca. 850 g DM 17,89 für Private DM 15,90 für Kliniken VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben</p>		<p>Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller</p>

Anti-A-Serum		(43 41 90 00)	ARp VVP 02
Bestandteile	Immuserum vom Kaninchen. Staatl. geprüft.		
Indikation	Zur A-Untergruppenbestimmung.		
Handelsform und Preise	Packung mit je 1 Flasche Rohserum und Absorptionsflüssigkeit á 1 ccm DM 8,85		
Hersteller	VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		
Anti-M-Rohserum		(43 41 90 00)	ARp VVP 02
Anti-N-Rohserum			
Bestandteile	Immuserum vom Kaninchen. Staatl. geprüft.		
Indikation	Zur Bestimmung der Blutfaktoren M bzw. N.		
Handelsform und Preise	Packung mit 1 Flasche zu 1 ccm DM 16,50		
Hersteller	VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		
Anti-Rho-Serum		(43 41 90 00)	ARp VVP 02
Bestandteile	Immuserum vom Menschen. Staatl. geprüft.		
Indikation	Zur Bestimmung des Rhesusfaktors, sowie zur Aufklärung von Transfusionszwischenfällen u. bei der Erythroblastose.		
Handelsform und Preise	Fläschchen mit 1 ccm DM 19,35 Fläschchen mit 3 ccm DM 55,—		
Hersteller	VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		
Apredon-Dragees		(43 29 12 00)	A S 10/203
Bestandteile	Drageekern enthält: Phenolphthalein 0,05 g, Extract. Frangulae 0,125 g, Extract. Rhei 0,05 g		
Indikation	Bei allen Formen der Obstipation.		
Dosierung	1-2 Drag. morgens nüchtern od. abends vor d. Schlafengeh.		
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 24 Dragees zu 0,5 g DM 0,55		
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Aqua bidestillata sterilisata Ampullen		(43 28 19 00)	A VVP 07/355
Indikation	Zur Herstellung von Lösungen für Injektionen bzw. Infusionen		
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Amp. zu 10,5 ccm DM 2,40 Klinikpackung mit 50 Amp. zu 10,5 ccm DM 8,95 Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10,5 ccm DM 16,35		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		

(43 29 12 00)	A S 10/204	Arniflor-Salbe
Arniflor-Tinktur 10,0, Salbengrundlage 90,0 Quetschungen, Verstauchungen, Muskelschmerzen, z. Wund- behandlung. Salbe bei nicht offenen Verletzungen mit leichtem Druck in die Haut einreiben; zur Wundbehandlung messerrückendick auftragen.		Bestandteile Indikation Dosierung
Kruke mit ca. 25 g DM 0,80 Kruke mit ca. 50 g DM 1,25		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/205	Arniflor-Tinktur
Spezialauszug Panstabil von: Flores et folia Arnicae mit ca. 1,5 % Extraktgehalt, ca. 18,5 % Wassergehalt und ca. 80 % Al- koholgehalt. Außerlich bei Quetschungen, Verstauchungen und Hämato- men. 1/2-1 Eßlöffel voll auf 1/4 Ltr. Wasser zu Umschlägen.		Bestandteile Indikation Dosierung
Flasche mit ca. 30 ccm DM 1,65 Flasche mit ca. 50 ccm DM 2,30 Flasche mit ca. 100 ccm DM 3,80		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 27 59 00)	ARp VVP 06/207	Arsen-Helpin
Sterile Lipoid-Emulsion mit 0,025 g Monomethyl-dinatr.-Arsinat p. Amp. Anaemie, Rekonvaleszenz, Arsen-Therapie. 1-2 Ampullen intramusculär täglich oder übertäglich.		Bestandteile Indikation Dosierung
Packung mit 10 Amp. zu 1,5 ccm . . . DM 2,75 Klinikpackung mit 100 Amp. zu 1,5 ccm DM 19,34		Handelsform und Preise
VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau		Hersteller
(43 27 25 00)	ARp VVP 07/215	Arsen-Triferrol
Albumose-Eisen (1,5% Fe) 25,0, Natr. monomethyl-arsenicic. 0,0133, Sacchar., Corrig. et Aqua dest. ad 100,0 Blutbildendes Tonicum bei Anämien, Chlorose, Schwäche- zuständen und Tuberkulose. 3 mal täglich 1 Eßlöffel.		Bestandteile Indikation Dosierung
Flasche mit 250 ccm DM 2,15		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Ascorvit (Vitamin C)		(43 27 64 00, 43 27 65 00)	A VVP 09/828/825
Bestandteile	1 Tabl. enthält 0,05 g l-Ascorbinsäure 1 Amp. enthält 0,1 g l-Ascorbinsäure		
Indikation	Vitamin-C-Mangelzustände: Skorbut, skorbutähnliche Erkrankungen, MÖLLER-BARLOWsche Krankheit d. Kinder, Schwangerschaft und Laktation, Infektionskrankheiten, Fieberzustände, Blutungsbereitschaft.		
Dosierung	3 mal täglich 2-3 Tabl. 1-2 Amp. täglich Intramuskulär.		
Handelsform und Preise	Tabl.: Röhrchen mit 20 Stück DM 0,75 Klinikpackung mit 200 Stück DM 5,20 Klinikpackung mit 1000 Stück DM 21,45 Amp.: Packung mit 6 Amp. zu 2 ccm DM 1,80 Klinikpackung mit 100 Amp. zu 2 ccm DM 18,40		
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena		
Ascorvit „forte“		(43 27 65 00)	A VVP 09/826
Bestandteile	1 Amp enthält 0,5 g l-Ascorbinsäure		
Indikation	Indikationen wie vorstehend.		
Dosierung	Bei starkem Vitamin-C-Defizit täglich 1 Amp. Ascorvit „forte“ bei gleichzeitiger Verabreichung von Ascorvit-Tabl., die längere Zeit fortzuführen ist.		
Handelsform und Preise	Packung mit 3 Amp. zu 5 ccm DM 1,80 Klinikpackung mit 15 Amp. zu 5 ccm DM 8,05		
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena		
Asthma-Tabletten I		(43 23 27 00)	ARp VVP 07/208
Bestandteile	Camph. 0,02, Bellatotal 0,00025, Calc. lactic. 0,2, Ephedrin 0,02, Gland. hypoph. sicc. 0,06 mg (0,003 VE), Fol. digit. pulv. 0,03 pro Tabl.		
Indikation	Antiasthmaticum, besonders bei akutem Anfall.		
Dosierung	3 mal täglich 1-2 Tabl. mit Wasser nach d. Essen zu nehmen		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 14 Tabl. DM 1,15		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Asthma-Tabletten II		(43 29 12 00)	A VVP 10/202
Bestandteile	Fol. Bellad. Teep 0,013, Arsen. alb. 0,01, Natr. jodat. 0,05, Ipecac. \emptyset 0,001 mg p. Tabl.		
Indikation	Bei Asthma bronchiale, besonders als Prophylacticum.		
Dosierung	3 mal täglich 1-2 Tabl. mit Wasser nach d. Essen zu nehmen		
Handelsform und Preise	Packung mit 40 Tabl. DM 1,35		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		

(43 21 51 00)	ARp VVP 13/236	Atophan
Phenylchinolincarbonsäure		Bestandteile
Gelenk- und Muskelrheuma, Gicht, Neuritiden, Neuralgie		Indikation
Akuter Gichtanfall: 2-4 Tabl. täglich.		Dosierung
Akuter Gelenkrheumatismus: Täglich 3-4 Tabl. innerhalb 6 Stunden 4-5 Tage lang. Wiederholung nach einer Pause von 3-4 Tagen.		
Chronische Formen von Gicht, Gelenk- und Muskelrheumatismus, Neuritiden, Neuralgien: 2-4 Tabl. tägl. 4 Tage lang, dann eine Woche Pause und Wiederholung der 4-tägigen Behandlung mit der gleichen Dosierung. Anschl. 4 Tage Pause usf. je nach Verlauf der Erkrankung.		
Röhrchen mit 20 Tabl. zu je 0,5 g DM 1,30		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 500 Tabl. zu je 0,5 g		
für Kliniken DM 22,30		
für Private DM 25,10		
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller
(43 21 53 00)	ARp VVP 13/237	Atophanyl
Phenylchinolinsaures Natrium, Natriumsalicylat.		Bestandteile
Gelenk- und Muskelrheuma, Neuritiden, Ischias, Neuralgie, sympathische Ophthalmie, Pleuritis sicca.		Indikation
Täglich 1 Injektion. Nach 4-5 Behandlungstagen gleichlange Pause.		Dosierung
Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm DM 3,75		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 50 Amp. zu 10 ccm		
für Kliniken DM 26,60		
für Private DM 29,95		
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller
(43 26 31 00)	ARp VVP 07/361/362	Atropin. sulfuric. 0,0005 u. 0,001 Ampullen
Subkutan als Spasmolyticum, Antemetikum, Antacidum.		Indikation
Nur nach ärztlicher Verordnung.		Dosierung
Schachtel mit 10 Amp. zu 1,1 ccm DM 1,05		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 50 Amp. zu 1,1 ccm DM 3,70		
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 1,1 ccm DM 6,55		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Atropin. sulfuric.			
0,005 Tabletten		(43 26 31 00)	ARp VVP 07/364
Indikation	Spasmolyticum, Antemetikum, zur Bekämpfung hypersekretorischer Prozesse, z. B. Hyperacidität, Ulcus ventriculi et duodeni.		
Dosierung	Nur nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 10 Tabl.	DM 0,40	
	Klinikpackung mit 1000 Tabl.	DM 9,90	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Aureaticum		(43 29 12 00)	A S 10/206
Bestandteile	Spezialauszüge Panstabil von: Avena 4,0, Lycopus 1,5, Crataegus (10 FD/ccm) 10,0, Aurum muriaticum D 3 1,0, Convall. D 2 5,0, Scilla D 2 1,5, Camphora D 2 2,0, Veratrum album D 2 1,5, Corrigens 25,0, Sirup. simplex 20,0		
Indikation	Schwächezustände des Herzens, Kreislaufstörungen.		
Dosierung	3 mal täglich 1-2 Teelöffel voll.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 100 ccm	DM 1,45	
	Flasche mit ca. 250 ccm	DM 2,75	
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Aurocard-Herzgold		(43 29 12 00)	A VVP 10/201
Bestandteile	Strophanthus Ø, Digitalis Ø, Salvia Ø, Lycop. europ. Ø aa 0,1, Ignatia Ø, Nux vomica Ø aa 0,05, Cactus grandifl. Ø, Scilla Ø aa 0,03, Camph. synth. D 1 0,14, Aur. natr. chlorat. D 3 0,001, Spir. vini et Corr. ad 100,0		
Indikation	Dysfunktionen des Kreislaufs, besonders bei Insuffizienz infolge akuter fieberhafter oder infektiöser Erkrankungen.		
Dosierung	3 mal täglich 1 Kaffeelöffel voll.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 100 ccm	DM 1,40	
	Flasche mit 200 ccm	DM 2,20	
	Flasche mit 500 ccm	DM 4,20	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Balsam Acht		(43 21 63 00)	A VVP 11/202
Bestandteile	Methyl. salicyl. 1,2, Bornyl. salicyl. 0,4, Amyl. salicylic. 0,4, Ol. camphor. 0,66, Ol. Terebinthinae 10,3, Ol. Sinapis 0,04, Paraffin. liq. 17,0		
Indikation	Antirheumaticum bei Gicht, Reißen, Neuralgie, Ischias.		
Dosierung	2-3 mal täglich einige Tropfen mit dem Handballen in die Haut einreiben.		
Handelsform und Preise	Spezialflasche mit 30 g	DM 1,45	
Hersteller	VEB Pharm. Werk Pankow, Berlin-Pankow		

(43 45 10 00)	VVP 09	BCG-Impfstoff
Zur Tuberkulose-Schutzimpfung.		Indikation
Die Injektion des Impfstoffes erfolgt in Mengen von 0,1 ccm streng intrakutan nach entsprechender Hautdesinfektion. Als Injektionsstelle ist zweckmäßig die Außenseite des Oberschenkels oder des Oberarmes zu wählen.		Dosierung
Packung mit 10 Majolen DM 25,—		Handelsform und Preise
VEB Jenapharm, Jena		Hersteller
(43 26 32 00)	ARp VVP 07/209/210	Bellatotal
Gesamtalkaloide der Atropa Belladonna in reiner Form.		Bestandteile
Spasmolyticum mit betonter I-Hyoscyamin-Wirkung.		Indikation
3 mal täglich 1-2 Tabl. bzw. täglich 2 mal 1 Zäpfchen.		Dosierung
Tabl.: Röhrchen mit 20 Stück zu 0,25 mg . . . DM 0,95 Klinikpackung mit 200 Stück zu 0,25 mg DM 6,—		Handelsform und Preise
Zäpfchen: Schachtel mit 6 Stück zu 0,5 mg . . . DM 1,20 Schachtel mit 12 Stück zu 0,5 mg . . . DM 1,95 Klinikpackung mit 60 Stück zu 0,5 mg . . . DM 7,35		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 26 33 00)	ARp VVP 07/257/258	Bellatotal compositum
Kombinationspräparat aus Bellatotal und Papaverinum hydrochloricum.		Bestandteile
Verstärktes Spasmolyticum m. neuro- u. myotroper Wirkung.		Indikation
3 mal täglich 1 Tabl. bzw. 2-3 mal täglich 1 Zäpfchen.		Dosierung
Tabl.: Röhrchen mit 20 Stck. (0,25 u. 20 mg) DM 1,35 Klinikpckg. m. 250 Stck. (0,25 u. 20 mg) DM 11,95		Handelsform und Preise
Zäpfchen: Schachtel m. 6 Stck. (0,25 u. 40 mg) DM 1,40 Schacht. m. 12 Stck. (0,25 mg u. 40 mg) DM 2,40 Klinikp. m. 60 Stck. (0,25 mg u. 40 mg) DM 9,20		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Betasid (43 27 63 00) ARp VVP 01/819	
Bestandteile	Vitamin B 1-Injektionslösung mit 5 mg Aneurinhydrochlorid/ccm.
Indikation	Zur Behandlung aller auf Vitamin B 1-Zufuhr reagierenden Erkrankungen (Neuritiden u. Neuralgien, versch. Genese und Lokalisation, postdiphtherische Lähmungen, funikuläre Myelose, Milch- u. Mehinährschäden, Darmträgheit, Inappetenz).
Dosierung	In leichteren Fällen kurmäß. Gebrauch i. m., in schwereren Fällen intravenös. Bis zum Sichtbarwerden des Erfolges täglich 1 ccm i. m. oder i. v. Zusätzliche orale Vitamin B 1-Darreichung ist empfehlenswert.
Handelsform und Preise	Karton mit 5 Amp. zu 1 ccm DM 1,75
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau
Biliton (43 26 81 00) ARp VVP 06/220	
Bestandteile	Natrium dehydrocholicum puriss. in 10 %iger Lösung.
Indikation	Cholagogum, Cholereticum.
Dosierung	1/2-2 Amp. intravenös.
Handelsform und Preise	Packung mit 3 Amp. zu 10 ccm . . . DM 6,19 Klinikpackung mit 20 Amp. zu 10 ccm für Kliniken DM 32,18 für Private DM 36,21
Hersteller	VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau
Bilitrast (43 28 69 00) ARp VVP 13/233/234	
Bestandteile	Tetrajodphenolphthalein-Natrium.
Indikation	Zur röntgenologischen Darstellung der Gallenblase.
Handelsform und Preise	Röhre mit 4 g DM 1,70 Packung mit 3 Amp. zu je 3 g/20 ccm DM 4,80 Glas mit 100 g DM 28,50 Packung mit 50 Amp. zu je 3 g/20 ccm DM 67,45
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof

(43 29 12 00)	A S 10/208	Biofungin
<p>Ferr. glyc. phosph. 0,09, Cupr. formic. 0,000105, Mang. formic. 0,000105, Magnes. borocitr. 0,002120, Acid. formic. 0,002150, Ignatia \emptyset 0,005, Zinc. sulf. D 1 0,018, Arsenic. D 4 5,0, Calc. flur. coll. D 2 0,009, Aqua silicata 0,009, Sir. simpl. 12,5, Alkohol 10,7, p-Oxybenzoesäuremethylester 0,09, Corr. 18,0, Aqua dest. ad 100,0</p>		Bestandteile
<p>Blutarmut, Rekonvaleszenz, Appetitlosigkeit.</p>		Indikation
<p>3 mal täglich 1 Eßlöffel, Kinder 1 Teelöffel voll, vor den Mahlzeiten.</p>		Dosierung
<p>Flasche mit ca. 250 ccm DM 1,80 Flasche mit ca. 500 ccm DM 3,10</p>		Handelsform und Preise
<p>VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig</p>		Hersteller
(43 29 12 00)	A VVP 10/200	Bio-Nektarin
<p>Ferro-Ammon. sulf. 0,2, Cuprum sulf. D 2, Acidum phosphoric. aa 0,01, Natr. arsenicos. D 2 0,002, Manganum chlorat. D 1, Acid. citric. aa 0,02, Vinum et Corrig. ad 100,0</p>		Bestandteile
<p>Roborans, besonders in der Rekonvaleszenz, bei sekundärer Anämie.</p>		Indikation
<p>3 mal täglich 1 Likörglas nach dem Essen.</p>		Dosierung
<p>Flasche mit 200 ccm DM 1,70 Flasche mit 500 ccm DM 3,50</p>		Handelsform und Preise
<p>VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul</p>		Hersteller
(43 26 56 00)	A VVP 07/369	Bismutum subnitricum-Tabletten 0,5
<p>Gastritis, Ulcus ventriculi et duodeni, subakute und chronische Diarrhoe.</p>		Indikation
<p>3 mal täglich $\frac{1}{2}$-1 Tabl.</p>		Dosierung
<p>Röhrchen mit 20 Tabl. DM 0,70</p>		Handelsform und Preise
<p>VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul</p>		Hersteller
(43 28 12 00)	A VVP 15/220	Bisuderm (Streupulver mit 20% Bismut. subgallic.)
<p>Bismut. subgallic. 20,0, Vasenol-Lipoid-Konzentr. 0,4, Talkum 79,6</p>		Bestandteile
<p>Zur Behandlung von Oberflächenwunden, Balanitis.</p>		Indikation
<p>Streudose mit 15 g DM 0,45 Streudose mit 50 g DM 0,90</p>		Handelsform und Preise
<p>VEB Vasenol-Werk, Leipzig</p>		Hersteller

Boromenthol		(43 23 62 00)	A VVP 05/213
Bestandteile	Glykokoll 2,0, Acid. boric. 2,0, Menthol 1,0, p-Aminobenzoesäureaethylester 2,0, Salbengrundlage auf Wollfettbasis 93,0		
Indikation	Antirhiniticum.		
Handelsform und Preise	Tube mit Nasenkanüle mit ca. 10 g . . . DM 0,64		
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		
Brojunival		(43 21 24 00)	A VVT 02/200
Bestandteile	Kal. bromat. 1,75, Natr. bromat. 1,75, Extr. Junip. conc. 5,0, Sir. Amyli 15,2, Extr. Valer. fl. 2,6, Saccharum 19,4, Aromatica 0,039 (in %).		
Indikation	Bei Neurasthenie und Schlaflosigkeit.		
Dosierung	Erwachsene 3 mal täglich 1 Eßlöffel voll und 2 Eßlöffel voll vor dem Schlafengehen. Kinder die Hälfte.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 155 g DM 1,10		
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		
Brojunival verstärkt		(43 21 25 00)	ARp VVT 02/201
Bestandteile	Kal. bromat. 1,75, Natr. bromat. 1,75, Extr. Junip. conc. 5,0 Sir. Amyli 15,3, Extr. Valer. fl. 2,8, Acid. diaethylbarb. 0,25, Saccharum 27,7, Aromatica 0,036 (in %).		
Indikation	Bei Neurasthenie und Schlaflosigkeit.		
Dosierung	Dosierung wie Brojunival.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 155 g DM 1,25		
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		
Bromum compositum Tabletten (Mixtura nervina FMB)		(43 21 24 00)	A VVP 07/256
Dosierung	1-3 Tabl. 3 mal täglich in Wasser gelöst nehmen.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,5 g DM 0,60		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		

(43 21 24 00)	VVP 14/212	Brosedan
Bromnatrium 16,65 %, nach besonderem Verfahren hergestellter Hefeextrakt 8,7 %, pflanzliche Würzstoffe 14 %		Bestandteile
Bei nervösen Störungen aller Art.		Indikation
1-3 mal täglich 1 Teelöffel in ungesalzene Suppen, Gemüsen oder in einer halben Tasse möglichst heißem Wasser zu nehmen.		Dosierung
Flasche mit 150 g DM 1,76		Handelsform und Preise
VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/209	Bryorheum
Spezialauszug Panstabil von: Phytolacca decandra 3,0, Hom. Dil von: Bryonia 10,0, Rhus Tox. 20,0, Dulcamara 10,0, Gnaphal. polyceph. 10,0, Colchic. 5,0, Alkohol 45 % ad 100,0		Bestandteile
Perorales Antirheumaticum.		Indikation
3-4 mal täglich ca. 10 Tropfen in etwas Wasser.		Dosierung
Flasche mit ca. 10 ccm DM 0,65		Handelsform und Preise
Flasche mit ca. 30 ccm DM 1,65		
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 27 39 00)	A VVP 09/382	Calcium bromatum
10 %ige wässrige Lösung von Calcium bromid.		Bestandteile
Zur Behandlung der Spasmophilie, besonders beim Laryngospasmus; ferner Pertussis und Chorea minor bei Kindern. Erwachsenen wird Calcium bromatum bei Epilepsie, Melancholie, Neurasthenie, Schlaflosigkeit und Pruritus verordnet. Zur Behandlung von Hautallergien (Urticaria), Ekzemen, Strophulus.		Indikation
Säuglingen 2-3 mal täglich 2-3 ccm, Kleinkindern von 2-5 Jahren 2-3 mal täglich 4-8 ccm, Schulkindern 2-3 mal täglich 10-15 ccm, Erwachsenen 2-3 mal täglich 10-20 ccm langsam intravenös.		Dosierung
Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm DM 1,80		Handelsform und Preise
VEB Jenapharm, Jena		Hersteller

Calcium chloratum 10%	(43 25 45 00)	A VVP 07/384
Indikation	Für alle Indikationen des Calciums. Zur i. v. Injektion.	
Handelsform und Preise	Schachtel mit 10 Amp. zu 10,5 ccm . . . DM 2,90 Klinikpackg. mit 100 Amp. zu 10,5 ccm DM 20,40	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden	
Calcium gluconic. 10% (z.Zt.beschränkt lieferbar)	(43 27 31 00)	A VVP 07/386
Indikation	Gut verträgliches Calcium-Präparat. Für alle Indikationen der Calcium-Therapie.	
Dosierung	Im allgemeinen 1 Amp. i. m. oder i. v. zu injizieren.	
Handelsform und Preise	Schachtel mit 5 Amp. zu 10,5 ccm . . . DM 1,65 Klinikpackung mit 50 Amp. zu 10,5 ccm DM 11,40	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul	
Calcium-Peptonat-Liquor	(43 27 53 00)	A VVM 01/201
Bestandteile	Pepton, Calc. lactic., Kohlehydrate, Rohrzucker, 4 % Alkohol.	
Indikation	Wohlschmeckendes konzentriertes Eiweiß-Kalkpräparat.	
Dosierung	3-4 Eßlöffel täglich.	
Handelsform und Preise	Flasche mit 180 g DM 1,70 Flasche mit 240 g DM 2,25	
Hersteller	VEB Eumarhal-Werk Bernburg	
Calcium-Resorpta-Sirup (z.Zt.beschränkt lieferbar)	(43 27 39 00)	A VVP 07/250
Bestandteile	Saponin 0,35, Honigaroma 0,1, Acid. benzoic. 0,15, Calc. chlorat. 12,0, Sir. cerasor. 25,0, Sacchar. 17,0, Aqua dest. 45,4	
Indikation	Zur oralen Calcium-Behandlung.	
Dosierung	4 mal täglich 1 Eßlöffel voll.	
Handelsform und Preise	Flasche mit 200 ccm DM 1,20	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul	

(43 27 39 00)	ARp VVP 13/392	Calciumthiosulfat Ampullen „Schering“ (Tecosal)
Calciumthiosulfat in 10 %iger stabiler Lösung.		Bestandteile
Infektionskrankheiten, besonders Tuberkulose, Intoxikationen, allergische Erkrankungen.		Indikation
1-2 Amp. täglich i. v. Langsam (10 ccm in 4 Min.) injizieren!		Dosierung
Packung m. 5 Amp. zu je 10 ccm . . . DM 3,20 Klinikpackung m. 50 Amp. zu je 10 ccm DM 24,85		Handelsform und Preise
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller
(43 27 39 00)	A VVS 01/208	Calmasan
Calc. citr. 20,0, Calc. phosph. 5,0, Calc. fluor. 1,0, Sacchar. et Corrig. ad 100,0.		Bestandteile
Zur Behandlung der Rachitis und anderer Kalkmangelerscheinungen.		Indikation
3 mal täglich 1 Kaffeelöffel oder 3 mal täglich 1-2 Tabl.		Dosierung
Schachtel mit 75 g Pulver DM 1,50 Schachtel mit 50 Tabl. DM 0,90 Klinikpackung mit 1000 Tabl. DM 9,50		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 27 11 00)	A VVA 02/206/211	Calorose
10-40 %ige sterile Invertzuckerlösung in Amp.		Bestandteile
Alle Indikationen des Traubenzuckers. Nähr- und Anregungsmittel für Herz- und Kreislauf, Schwangerschaftserbrechen. Osmotherapie und Leberschutztherapie.		Indikation
Intravenös injizieren.		Dosierung
10 % 5 Amp. zu 10 ccm DM 1,85 10 % 50 Amp. zu 10 ccm DM 13,04 20 % 5 Amp. zu 10 ccm DM 2,— 20 % 50 Amp. zu 10 ccm DM 13,71 35 % 5 Amp. zu 10 ccm DM 2,15 35 % 50 Amp. zu 10 ccm DM 14,51 40 % 5 Amp. zu 10 ccm DM 2,25 40 % 50 Amp. zu 10 ccm DM 15,22		Handelsform und Preise
VEB Kali-Chemie „Rhenania“, Berlin-Niederschöneweide		Hersteller

Calorose 70 %		43 27 12 00)	A VVA 02/207
Bestandteile	70%ige sterile Invertzuckerlösung.		
Indikation	Indikation wie vorstehend.		
Handelsform und Preise	Packung II Flasche je 100 ccm . . .	DM 2,19	
	Packung III Flasche je 1000 ccm . . .	DM 11,09	
Hersteller	VEB Kali-Chemie „Rhenania“, Berlin-Niederschöneweide		
Camphedrin		(43 25 43 00)	ARp VVP 01/203
Bestandteile	Kampfer-Ephedrin-Injektionsöl (15 % Kampfer, 0,5 % Ephedrin. basic. in sterilem Pflanzenöl nach DAB 6).		
Indikation	Zur rasch einsetzenden, lang anhaltenden Herz- und Kreislaufexzitation, bei allen hierfür in Frage kommenden Indikationen, zur Kupierung von Asthma bronchiale-Anfällen.		
Dosierung	Kinder 1/2-1 ccm 1-3 mal täglich im. Erwachsene 2-4 ccm 1-3 mal täglich im. oder früh u. abends als Depot. Kinder bis 2 ccm intramuskulär. Erwachsene 4-5 ccm intramuskulär. Subkutane Injektion von Camphedrin ist zu vermeiden, da Kampfer bei Kindern und Dekrepiden gelegentlich zu stärkerer örtlicher Reizung führt. Bei weitem Zeitabstand zwischen den einzelnen Injektionen wirkt Camphedrin stärker als bei schneller Aufeinanderfolge der Injektionen (Tachyphylaxie).		
Handelsform und Preise	Karton mit 5 Amp. zu 1 ccm . . .	DM 1,90	
	Karton mit 50 Amp. zu 1 ccm		
	für Private	DM 16,30	
	für Kliniken	DM 14,55	
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau		
Camphora Rubini „Schwabe“		(43 29 12 00)	A S 10/210
Bestandteile	Spezialauszug aus Ratanhia 0,1, Camphora 20,0, Corrigens 0,2, Alkohol ad 100,0		
Indikation	Zur Vorbeugung gegen Grippe, bei Durchfällen; Riechmittel bei Ohnmachten.		
Dosierung	Zur Grippeprophylaxe mehrmals täglich 2-4 Tropfen auf Zucker oder in Wasser; bei Durchfällen 1/2-stündlich.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 10 ccm	DM 0,90	
	Flasche mit ca. 30 ccm	DM 1,85	
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		

(43 29 12 00)	I 01/201	Cantharoplast
Gebrauchsfertiges Cantharidenpflaster einschl. Verbandstoff und einer Spezialsalbe zur Nachbehandlung der Wundfläche.		Bestandteile
Zur Ableitung auf die Haut bei rheumatischen und neuralgischen Affektionen und entzündlichen Prozessen.		Indikation
Packung 8X3 cm DM 0,82		Handelsform und Preise
VEB Imbal-Werk, Chemnitz		Hersteller
(43 29 12 00)	A VVP 10/269	Carvomin-Magentropfen
Angelica \emptyset , Cochlearia \emptyset aa 12,0, Calamus \emptyset 20,0, Carduus bened. \emptyset , Basilicum \emptyset aa 2,0, Condurango \emptyset 4,0, Mentha pip. \emptyset 5,0, Menyanthes trif. \emptyset 0,2, Gratiola \emptyset , Absinthium \emptyset , Vinca minor \emptyset aa 0,125, Salvia \emptyset , Ononis spinosa \emptyset aa 0,3, Spiritus et Corrig. ad 100,0		Bestandteile
Chronische Gastritis, Dyspepsie, Appetitlosigkeit, Meteorismus, Achylia gastrica.		Indikation
4-5 mal täglich 15 Tropfen in 1 Eßlöffel Wasser.		Dosierung
Flasche mit 30 ccm DM 1,35		Handelsform und Preise
Flasche mit 500 ccm DM 13,45		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 24 51 00)	A VVA 01/220	Caseosan
Gebrauchsfertige sterile Caseinlösung-Heyden mit etwa 5% Caseingehalt.		Bestandteile
Zur parenteralen Proteinkörpertherapie. Lokale Entzündungsherde, Gelenk-Adnexerkrankungen, Parametritiden, Bubonen, Furunkel, Hornhautgeschwüre, Gonorrhoeekomplikationen. Ferner prophylaktisch bei Infektionskrankheiten (Puerperalsepsis, septischer Abortus).		Indikation
Individuelle Dosierung. Im allgemeinen ist die Einzeldosis:		Dosierung
1. Intramuskulär oder subkutan 0,5, 2, 3, 5 ccm.		
2. Intravenös 0,25, 2, 3 ccm.		
Schachtel mit 10 Amp. zu 1 ccm DM 3,50		Handelsform und Preise
Schachtel mit 6 Amp. zu 5 ccm DM 5,60		
Klinikpackung mit 50 Amp. zu 1 ccm DM 11,70		
Klinikpackung mit 50 Amp. zu 5 ccm DM 29,45		
VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		Hersteller

Chinin-Dragees 0,1 u. 0,3		(43 23 21 00)	A VVP 07/411/412
Indikation	Bei Infektionskrankheiten.		
Dosierung	3 mal täglich 1-2 Dragees.		
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Stück zu 0,1		DM 0,50
	Packung mit 10 Stück zu 0,3		DM 1,25
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Chinin-Perlen 0,05		(43 23 21 00)	A VVP 07/410
Indikation	Bei Infektionskrankheiten.		
Dosierung	4-5 mal täglich 2 Stück.		
Handelsform und Preise	Packung mit 50 Perlen		DM 1,60
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden		
Chloramin „Fahlberg“ DAB 6		(43 28 53 00)	VVOr 02/200
Bestandteile	p-Toluolsulfonchloramidnatrium mit mind. 25 % akt. Chlor.		
Indikation	Wund- u. Händedesinfektion, in der Human- u. Veterinär-Medizin, für hygienisch-prophylaktische Waschungen und Spülungen.		
Dosierung	Zur Herstellung der Lösungen verwendet man eine aus Chloramin-Tabl. od. aus Chloramin-Pulver bereitete 10 %ige Stammlösung.		
Handelsform und Preise	Äußerlich! Pappdose mit 50 g		DM 0,84
	Pappdose mit 100 g		DM 1,33
	Beutel mit 1000 g		DM 8,22
	Beutel mit 5 kg		DM 36,89
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		
Chloramin-Tabletten „Fahlberg“ DAB 6 zu 0,5 u. 1,0 g		(43 28 53 00)	VVOr 02/201/219
Bestandteile	ca. 92 % p-Toluolsulfonchloramidnatrium, ca. 8 % Stärke.		
Indikation	Indikation wie vorstehend.		
Handelsform und Preise	Äußerlich! Faltschachtel mit 10 Tabl. zu 0,5 g		DM 0,24
	Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,5 g		DM 0,41
	Schachtel mit 100 Tabl. zu 0,5 g		DM 1,33
	Schachtel mit 500 Tabl. zu 0,5 g		DM 4,19
	Schachtel mit 1000 Tabl. zu 0,5 g		DM 7,52
	Röhrchen mit 20 Tabl. zu 1 g		DM 0,65
	Schachtel mit 40 Tabl. zu 1 g		DM 1,04
	Schachtel mit 500 Tabl. zu 1 g		DM 7,16
	Schachtel mit 1000 Tabl. zu 1 g		DM 12,70
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		

(43 25 91 30)	ARp VVP 09/243	Chloronitrin JENAPHARM
Synthetisch hergestelltes Antibiotikum des Streptomyces venezuelae. D-threo-1-p-Nitrophenyl-2-dichloracetylamino-propandiol-(1,3).		Bestandteile
Zur Chemotherapie bakterieller Infektionen, insbesondere solcher durch gramnegative Erreger und Rickettsien.		Indikation
Perorale Verabreichung von Kapseln. Normale Tagesdosis für Erwachsene ca. 50 mg/kg Körpergewicht=3 g in 6 Einzeldosen. Toxische Dos. kann praktisch nicht erreicht werd.		Dosierung
Fl. m. 12 Gelatinekaps. z. je 250 mg		Handelsform
VEB Jenapharm, Jena		Hersteller
(43 12 33 00/6)	ARp VVP 13/235	Chlorylen
Aethylenum trichloratum puriss.		Bestandteile
Zur Inhalations-Analgesie; Gynäkologie (Geburtshilfe) Zahnheilkunde, kleine Chirurgie.		Indikation
Packung mit 5 Amp. zu je 2 ccm . . . DM 1,80 Packung mit 50 Amp. zu je 2 ccm für Kliniken DM 11,90 für Private DM 13,40 Packung mit 50 Amp. zu je 5 ccm für Kliniken DM 15,55 für Private DM 17,50 Flasche mit 50 ccm DM 1,75		Handelsform und Preise
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller
(43 26 19 00)	ARp VVP 07/336	Cholin-Kapseln (z.Zt.beschränkt lieferbar)
Ol. ped. tauri 0,28, Adeps suill. 0,17, Cholinchlorid 0,5, Aqua bi-dest. 0,05 pro Kapsel.		Bestandteile
Bei Gallen- und Leberleiden.		Indikation
3 mal täglich 2 Kapseln per os.		Dosierung
Packung mit 20 Kapseln DM 6,30 Packung mit 100 Kapseln DM 27,25		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Cholopant (43 29 12 00) A S 10/211	
Bestandteile	Spezialauszüge Panstabil von: Berberis 1,0, Nux vom. 0,2, Chelone glabra \varnothing 15,0, Chelidonium D 1 10,0, Natr. chol. D 1 5,0, Talcum 10,0, Amylum 25,0, Sacch. ad 100,0
Indikation	Entzündliche Zustände und Dysfunktionen des Leber-Gallensystems.
Dosierung	3 mal täglich, in akuten Fällen 2-stündlich, 1-2 Tabl.
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 40 Tabl. zu 0,25 g . DM 0,80 Packung mit ca. 80 Tabl. zu 0,25 g . DM 1,60
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig
Codeinum phosphoricum Tabletten 0,03 (43 21 49 00) AB VVP 07/426	
Indikation	Bei Reizhusten.
Dosierung	Nach ärztlicher Verordnung.
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 10 Tabl. DM 0,80 Klinikpackung mit 250 Tabl. DM 13,50
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul
Coffeinum-Natrium benzoicum Amp. 0,25 (43 25 46 00) A VVP 07/438	
Indikation	Herz-, Kreislauf- und Atemanaleptikum bei Herzinsuffizienz, Kardiospasmen, Dispnoe, Angina pectoris und Kollaps. Diureticum.
Dosierung	1 Amp. subcutan zu injizieren.
Handelsform und Preise	Schachtel mit 10 Amp. zu 1,1 ccm . . . DM 1,15 und 0,04 Rohstoff-Zuschlag Klinikpackung mit 100 Amp. zu 1,1 ccm DM 7,30 und 0,40 Rohstoff-Zuschlag
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul

(43 25 46 00)	A VVP 07/443	Coffeinum-Natrium salicylicum Amp. 0,25 (z.Zt.beschränkt lieferbar)
Herz-, Kreislauf- und Atemanaleptikum bei Herzinsuffizienz, Kardiospasmen, Dispnoe, Angina pectoris und Kollaps. Diureticum.		Indikation
1 Amp. subcutan zu injizieren.		Dosierung
Schachtel mit 10 Amp. zu 1,1 ccm . . . DM 1,15 und 0,04 Rohstoff-Zuschlag		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 1,1 ccm DM 7,30 und 0,40 Rohstoff-Zuschlag		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 21 39 00)	A VVA 01/200	Coffetyliln (z. Zt. nicht lieferbar)
90% Acetyliln und 10% Coffeinum purum.		Bestandteile
Stimulierendes Analgeticum, Antineuralgicum, Antipyreticum: Kopfschmerzen, Migräne, Zahnschmerzen (auch prophylaktisch), rheumatische Muskel- und Gelenkschmerzen, Grippe, Erkältungskrankheiten und andere fieberhafte Erkrankung., Erschöpfungszustände, nervöse Abgespanntheit.		Indikation
1-2 Tabl. 1-3 mal täglich bzw. bei Bedarf in kalter Flüssigkeit einnehmen.		Dosierung
Röhrchen mit 10 Tabl. zu 0,5 g . . . DM 0,55		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu 0,5 g DM 25,85		
VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		Hersteller
(43 13 00 00)	ARp VVP 09	Colchicin JENAPHARM (in Vorbereitung)
Vorzugsweise zur medikamentösen Therapie inoperabler Tumoren (Mitosegift).		Indikation
Normale Dosierung: 0,5 mg pro Tag. Toxische Dosis: Dosis maxima simplex: 0,002. Dosis maxima pro die: 0,005.		Dosierung
Packung mit 10 Amp. zu 1 ccm . . . DM 2,—		Handelsform und Preise
VEB Jenapharm, Jena		Hersteller

Colloo-Präparate		(43 29 11 00)	A S 10/h
Handelsform und Preise	Dilutionen } D 3, D 4, D 6 Tabl. 0,1 g }		
		Flasche ca. 10 g	DM 0,75
	Amp. zu 1,1 ccm D 3, D 4, D 6		
		Karton mit 6 Amp.	DM 0,95
		Karton mit 12 Amp.	DM 1,50
		Karton mit 60 Amp.	DM 6,35
		Karton mit 125 Amp.	DM 12,20
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Collosulfan-Bad		(43 29 12 00)	A S 10/214
Bestandteile	Gallenschwefelbad mit 2% kolloidem Schwefel (Sulfur-Colloo), 15% Fel tauri inspiss., 4% Ol. Pini pum.		
Indikation	Ekzeme, Psoriasis, Furunkulose, chron. Gelenkrheumatismus, Gicht, Neuralgien.		
Dosierung	1-3 mal wöchentlich ein Bad (34-36° C) v. 15-20 Min. Dauer.		
Handelsform und Preise		Flasche (1 Vollbad)	DM 0,75
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Collosulfan-Puder		(43 29 12 00)	A S 10/213
Bestandteile	Sulfur-Colloo-Milchzuckerkonz. mit 20% Sulfur 25,0, Amylum 100,0, Talcum 675,0, Zinc. oxyd. 140,0, Acid. boric. 35,0, Farbstoff 10,0, Corrig. 0,70		
Indikation	Akne vulgaris, Ekzeme, Furunkulose, Impetigo, Intertrigo, Rosae, Seborrhöe, Scrophul.		
Dosierung	Als Streupuder.		
Handelsform und Preise		Streudose ca. 50 g	DM 0,80
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Colsil		(43 21 80 00)	A VVP 06/203
Bestandteile	Cholesterin-Lecithin-Verbindung.		
Indikation	Zur Bekämpfung des Röntgenkaters.		
Dosierung	3 mal täglich 1-2 Tabl.		
Handelsform und Preise		Packung mit 12 Tabl.	DM 1,52
		Packung mit 250 Tabl.	DM 21,10
Hersteller	VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau		

(43 21 80 00)	A VVP 06/204	Cosil-Suppositorien
Cholesterin-Lecithin-Verbindung. Zur Bekämpfung des Röntgenkaters. 1-6 Stück im Laufe des Tages. Packung mit 8 Supp. DM 1,96 Packung mit 50 Supp. DM 8,84 VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 21 33 00)	A VVP 04/210	Combiphenan
Chinin. hydrochl. 0,05, Acid. acetylosalicylic. 0,2, Phenacetin 0,2. Bei Schmerzzuständen aller Art, fieberhaften Erkältungs- krankheiten, Grippe- und Gelenkrheumatismus. 3 mal täglich 1-2 Tabl. Packung mit 10 Tabl. zu 0,5 g DM 0,60 VEB Pharm. Werk Oranienburg		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/215	Congelatum Frostbalsam
Extract. Artemisiae abrotani 4,2 g, Acid. tannic. 5,0 g, Oleum Coloniense 0,8 g, Spir. Petrolei ad 100 g. Frostbeulen und nicht offene Frostschäden. Bei leichteren Frostschäden mehrmals täglich aufpinseln oder ohne größeren Druck mit der Hand vorsichtig einmas- sieren. Bei stärkeren Frostschäden bis dicht a. d. Grenze d. geschädigten Gewebes in gleicher Weise zu verwenden. Flasche mit ca. 20 ccm DM 0,55 Flasche mit ca. 50 ccm DM 1,10 VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 25 43 00)	ARp G 03/203	Convallan
Gesamtglykoside der Convallaria majalis. 1 Dragee=1000 FD. Ödem und Hydrops bei Herzinsuffizienz. Mittelschwere und leichte Herzinsuffizienzen. 3 mal täglich 1-3 Dragees. Packung mit 40 Dragees zu 0,5 g DM 2,45 Gödecke & Co., Chem. Fabr. in Verwaltung, Teltow b. Berlin		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller

Cortiron		(43 22 54 00) ARp VVP 13/226/227
Bestandteile	Desoxycorticosteronacetat.	
Indikation	Addison und Addisonismen, Infektionskrankheiten, Intoxikationen.	
Dosierung	Die Dosierung richtet sich nach der Schwere des Falles und dem jeweiligen Erfolg. Sie beträgt im allgemeinen dreimal wöchentlich 1 Amp. zu 5 mg bis einmal täglich 1 Amp. zu 10 mg i. m. Beim ausgesprochenen Morbus Addison hat sich die tägliche Zufuhr von 15-20 mg Cortiron i. m. pro Tag als nützlich erwiesen. Weitere Dosissteigerungen über dieses Maß hinaus bis zu etwa 50 mg pro Tag können bei hochgradigen Intoxikationszuständen, wie sie bei schweren Fällen von Diphtherie, Flecktyphus usw. und bei ausgedehnten Verbrennungen auftreten, ferner bei bedrohlichen Leberintoxikationen unbedenklich vorgenommen werden. Bei Arthritis 3-5 mg Cortiron i. m., sofort danach, spätestens 5 Minuten, 1000 mg Ascorbinsäure i.v.	
Handelsform und Preise	Packung mit 4 Amp. zu je 5 mg/ccm DM 8,10 Packung mit 20 Amp. zu je 5 mg/ccm DM 34,70 Packung mit 4 Amp. zu je 10 mg/ccm DM 13,60 Packung mit 20 Amp. zu je 10 mg/ccm DM 62,40	
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof	
Corvitol		(43 25 44 00) ARp VVP 13/214/215
Bestandteile	Pyridin- β -Carbonsäurediethylamid (25 %ige Lösung).	
Indikation	Atmungs- und Kreislauf-Stimulans, zentral angreifendes Analepticum, Kreislaufschwäche, Hypotonie, Narkoseunterbrechung, Kollapszustände, Intoxikationen (Narcotica, Hypnotica, Leuchtgas, Kohlenoxyd u. a.).	
Dosierung	Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.	
Handelsform und Preise	Packung mit 3 Amp. zu je 1,7 ccm . DM 1,60 Klinikpackg. mit 20 Amp. zu je 1,7 ccm DM 7,65 Packung mit 2 Amp. zu je 5,5 ccm . DM 2,35 Klinikpackg. mit 20 Amp. zu je 5,5 ccm DM 14,85 Flasche mit 10 ccm DM 1,60	
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof	
Crataegutt		(43 29 12 00) A S 10/216
Bestandteile	Spezialauszug aus Crataeg. e fruct. et fol. 10 FD/ccm.	
Indikation	Leichte Kreislaufanomalien und Herzstörungen, Myodegeneratio cordis, Altershochdruck.	
Dosierung	3-4 mal täglich ca. 10 Tropfen in etwas Wasser zu nehmen.	
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 20 ccm DM 1,15 Flasche mit ca. 50 ccm DM 2,55	
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig	

(43 29 12 00)	A S 10/217	Cupridium
1 ccm=0,020 mg Cuprum metallic. mit 10 %iger Acid. formic. in Ringerlösung.		Bestandteile
Zur unspezifischen Reiztherapie, Arthritiden, Ischias, Antiallergicum bei Asthma und Heufieber.		Indikation
Individuell zu steigende Injektionen von 0,2-1 ccm subkutan, intramuskulär und intravenös, 1-3 mal wöchentlich.		Dosierung
Packung mit 6 Amp. (1,1 ccm) . . . DM 1,20 Packung mit 12 Amp. (1,1 ccm) . . . DM 1,70		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/230	Cupridium forte
1 ccm=0,100 mg Cuprum metallic. mit 1 %iger Acid. formic. in Ringerlösung.		Bestandteile
Indikation und Dosierung wie vorstehend.		
Packung mit 6 Amp. (1,1 ccm) . . . DM 1,20 Packung mit 12 Amp. (1,1 ccm) . . . DM 1,70		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 26 89 00)	A VVP 14/213	Curcumen
Wirkstoffe der Curcuma 3,75 %, Gallensaure Salze 12,5 %.		Bestandteile
Bei allen Erkrankungen der Gallenblase u. der Gallenwege akuter und chronischer Art (Cholecystitis, Cholelithiasis und Cholangitis). Zur Nachbehandlung von Gallenblasenoperationen. Antiphlogisticum zur Behandlung infektiöser Leber- und Gallenerkrankungen und enteraler Sepsis.		Indikation
1-2 Dragees 3 mal täglich unzerkaut kurz nach dem Essen zu nehmen.		Dosierung
Röhrchen mit 30 Dragees DM 2,12 Glas mit 200 Dragees DM 8,24		Handelsform und Preise
VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		Hersteller
(43 29 12 00)	ARp S 10/227	Cynosid liquidum (z.Zt.beschränkt lieferbar)
Apocynum-Glykosid-Lösung 600 FD/ccm.		Bestandteile
Dekompensation, Herzinsuffizienz, Klappenfehler, Herzmuskelschwäche, Myodegeneratio cordis, Hypertension, Hypertrophie, Dilatation, allgemeine Wassersucht.		Indikation
Im allgemeinen 3 mal täglich 20 Tropfen=insges. 900 FD (40 Tropfen=1 ccm). Höhere Dosen bis maximal 3 mal täglich 30 Tropf.=insges. 1350 FD in besond. schweren Fällen.		Dosierung
Tropfflasche mit ca. 20 ccm DM 2,30		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller

Cystin		(43 27 59 00)	A VVT 03/200
Bestandteile	0,2 g Cystin pro Tabl.		
Indikation	Prophylacticum und Therapeutikum, bei Stoffwechselstörungen, Hepatitis, Infektiösen Erkrankungen, zur Normalisierung des gestörten Redox-Gleichgewichtes in den Zellen, bei Sudeckschen Dystrophien, zur Ernährung von Frühgeburten, prophylaktisch bei Schwangerschaftsbeschwerden bis 3 Monate, bei Röntgen-Tiefenbestrahlung Erhaltung des Eiweißspiegels, Therapeuticum z. Förderung der Laktationsfähigkeit, im Bedarfsfalle indiv. Dosierung.		
Dosierung			
Handelsform und Preise	Röhrchen m. 20 Tabl. zu je 0,2 g Cystin DM 2,95 Klinikp. m. 250 Tabl. zu je 0,2 g Cystin DM 25,65		
Hersteller	VEB Promassol-Werk Erfurt		
Cystiplant		(43 29 12 00)	A S 10/231
Bestandteile	Spezialauszüge Panstabil von: Belladonna 0,1, Cannabis 4,0, Uva ursi 5,0, Petrosel. 6,0, Cantharis 0,1, Alkohol (95 %) 40,0, Aqua destillata ad 100,0		
Indikation	Akute und chronische Cystitis, Cystopyelitis.		
Dosierung	3 mal täglich ca. 10 Tropfen in etwas Wasser 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten nehmen.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 10 ccm DM 0,65 Flasche mit ca. 30 ccm DM 1,65		
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Daucaron		(43 26 57 00)	VVA 02/204
Bestandteile	Natives Möhrentrockenpräparat.		
Indikation	Akute und chronische Ernährungsstörungen, bes. im Säuglings- und Kindesalter. Umstimmung der Darmflora, Ausgleichung akuter und habitueller Exsiccation.		
Dosierung	Dosierung gemäß d. jeder Packung beiliegenden Anweisp.		
Handelsform und Preise	Dose 100 g DM 2,33 Dose 1000 g DM 18,60		
Hersteller	„Rhenania“ VEB Kali-Chemie, Bln.-N'schöneweide		
Dehydasaal-Ampullen		(43 26 39 00)	ARp VVSx 03/201
Bestandteile	Diaethyl-(β-oxyaethyl)-amin 1,0 g/5 ccm.		
Indikation	Gefäß-Spasmolyticum z. B. bei peripheren Durchblutungsstörungen, Hypertension usw.		
Dosierung	Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Packung mit 5 Amp. zu 5 ccm DM 3,59 Klinikpackung mit 100 Amp. zu 5 ccm für Kliniken DM 42,19 für Private DM 47,46		
Hersteller	VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		

(43 26 39 00)	ARp VVSx 03/200	Dehydasaal liquidum
Solut. Diaethyl-(β -oxyaethyl)-amin comp. 30 % Indikation und Dosierung wie vorstehend.		Bestandteile
Flasche mit 30 ccm 30 %ige Lösung DM 1,97		Indikation
Klinikpackung mit 250 ccm 30 %ige Lösung für Kliniken DM 11,87		Handelsform und Preise
für Private DM 13,35		
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		Hersteller
(43 26 39 00)	ARp VVSx 03/217	Dehydasaal-Suppositorien
Diaethyl-(β -oxyaethyl)-amin in Lasupol (0,4 g/Supp.) Indikation und Dosierung wie vorstehend.		Bestandteile
Packung mit 6 Suppos. DM 2,19		Indikation
Klinikpackung mit 50 Suppos. für Kliniken DM 10,31		Handelsform und Preise
für Private DM 12,38		
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		Hersteller
(43 26 39 00)	ARp VVSx 03/221	Dehydasaal-Traubenzucker-Ampullen
Diaethyl-(β -oxyaethyl)-amin (0,5 g und 2 g Glucose/10 ccm). Indikation und Dosierung wie vorstehend.		Bestandteile
Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm DM 4,07		Indikation
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10 ccm für Kliniken DM 52,73		Handelsform und Preise
für Private DM 59,33		
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		Hersteller
(43 26 81 00)	A VVT 03/201	Dehydrochol-Tabletten
Acid. dehydrocholicum 0,125 g pro Tabl. Cholagogum, Cholericum, Diureticum. 3-5 Tabl. täglich.		Bestandteile
Packung mit 40 Tab. zu 0,125 g DM 2,05		Indikation
VEB Promassol-Werk, Erfurt		Dosierung
		Handelsform und Preise
		Hersteller

Dekristol (Vitamin D₂) (43 27 66 00) A VVP 09/833

Bestandteile Kristallisiertes Vitamin D₂ in öliger Lösung; 1 ccm enthält 0,5 mg = 20000 IE krist. Vitamin D₂

Indikation Rachitis und andere Knochenerkrankungen (zur Prophylaxe und Therapie).

Dosierung Zur Prophylaxe täglich 2-10 Tropfen, zur Therapie täglich 10-20 Tropfen oral. Gesamtmenge für eine Behandlung 3 Flaschen zu 10 ccm, nach jeder verbrauchten Flasche Behandlungspause von 4 Wochen.

Handelsform und Preise Flasche mit 10 ccm DM 1,25
Klinikpackung mit 50 ccm. DM 4,80

Hersteller VEB Jenapharm, Jena

Dekristol „forte“ (43 27 66 00) ARp VVP 09/832

Bestandteile 1 ccm enthält 10 mg = 400000 IE krist. Vitamin D₂

Indikation Rachitis und andere Knochenerkrankungen, Lupus vulgaris.

Dosierung Zur Prophylaxe der Rachitis 1 ccm, zur Therapie 1,5 ccm auf einmal. Wiederholung nach 3 bis 6 Monaten.
Zur Therapie des Lupus vulgaris 0,5 bis 1,5 ccm mehrmals wöchentlich unter ärztlicher Aufsicht.

Handelsform und Preise Zur Stoßprophylaxe Röhrchen zu 1 ccm DM 1,90
Klinikpckg. mit 12 Röhrchen zu 1 ccm DM 18,90
Zur Stoßtherapie Röhrchen zu 1,5 ccm DM 2,75
Klinikpckg. mit 12 Röhrchen zu 1,5 ccm DM 26,05

Hersteller VEB Jenapharm, Jena

Densana (43 23 76 00) A VVT 02/204

Bestandteile Myrrha 0,14, Flor. Arnicae 0,25, Herba Millefolii 2,5, Oliban. 0,14, Benzoe 0,28, Flor. Chamom. 2,5, Spir. 70 Vol.-%.

Indikation Entzündungen und Erkrankungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches.

Dosierung Konzentriert oder verdünnt zur Pinselung.

Handelsform und Preise Flasche mit ca. 30 ccm DM 1,05
und Spir.-Zuschlag DM 0,07

Hersteller VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.

(43 28 39 00)	A VVOr 02/225	Dentofalicain 0,5% mit 0,003% Adrenalin
0,5% Falicain, 0,003 % Adrenalin DAB 6, 0,005 % Ascorbinsäure, 0,9 % Natr. chlorid, 0,066 % Kaliummetabisulfit, 0,9 % Kaliumbi- phosphat ad 100 % Aqua dest.		Bestandteile
Lokal- und Leitungsanaestheticum für die Stomatologie. Zur Injektion bei der Extraktion von Zähnen.		Indikation
Karton mit 100 Amp. zu 2 ccm DM 17,58		Handelsform und Preise
VEB Fahlberg-List Magdeburg		Hersteller
(43 28 39 00)	A VVOr 02/228	Dentofalicain „stark anämisch“ 0,5 % mit 0,005 % Adrenalin
0,5 % Falicain, 0,005 % Adrenalin DAB 6, 0,003% Ascorbinsäure, 0,9 % Natr. chlorid, 0,066 % Kaliummetabisulfit, 0,9 % Kaliumbi- phosphat ad 100 % Aqua dest.		Bestandteile
Lokal- und Leitungsanaestheticum für die stomatologische Chirurgie. Zur Injektion bei chirurgischen Eingriffen im Gebiet der Kiefer.		Indikation
Karton mit 100 Amp. zu 2 ccm DM 17,88		Handelsform und Preise
VEB Fahlberg-List Magdeburg		Hersteller
(43 25 11 00)	ARp VVP 10/301	Depot-Penicillin
Depot-Penicillin = ölige Suspension von Penicillin-Calcium in hochgereinigtem Pflanzenöl unter Zusatz von Bienenwachs.		Bestandteile
Bei allen Infektionskrankheiten, deren Erreger auf Penicillin ansprechen.		Indikation
Dosierung nach ärztlicher Vorschrift.		Dosierung
Amp. zu 3 ccm mit 300 000 IE		Handelsform
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
Depot-Penicillin JENAPHARM siehe Jenacillin		
(43 28 25 00)	ARp VVSx 03/218	Devaricin
a-hexyldekansaures Natrium (0,05 g/2 ccm).		Bestandteile
Verödungsmittel z. B. Varizen, Varikozelen, Haemorrhoiden, Haemangiome.		Indikation
Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		Dosierung
Packung mit 3 Amp. zu 2 ccm DM 1,55		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 20 Amp. zu 2 ccm		
für Kliniken DM 6,29		
für Private DM 7,80		
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		Hersteller

Dextran „Dessau“ (43 27 10 00) VVP 01	
Bestandteile	Kolloidales, hydrolysiertes Polysaccharid.
Indikation	Gesamter Bereich der allgem. Infusionstherapie: Großchirurgie, Unfälle, Gynäkologie, Innere Medizin, Kinderheilkunde; speziell Toxikosen.
Dosierung	Ca. 6-10 ccm/kg Körpergewicht iv., im Bedarfsfalle Wiederholung.
Handelsform	20 ccm Doppelendamp. 250 ccm Doppelendamp.
Hersteller	In Vorbereitung. VEB Serum-Werk Dessau
Dextromalt (43 27 44 00) VVOr 03/201	
Bestandteile	Dextrin 55-45 %, Maltose 45-55 %, Kochsalz 1,25 %
Indikation	Ernährungsstörungen von Säuglingen und Kleinkindern.
Dosierung	Dosierung gemäß der jeder Packung beiliegenden Anweisung.
Handelsform und Preise	-Packung mit 500 g DM 2,50 lose 1000 g DM 3,50
Hersteller	VEB Lactacida, Niederstriegis/Sa.
Diacard-Goldtropfen (43 29 12 00) A VVP 10/277	
Bestandteile	Tinct. Valer. aeth. 5,0, Crataegus Ø 2,5, Cactus grandifl. Ø 0,2, Strophanthus Ø 0,15, Camphora synth. 0,05, Aur. natr. chlorat. D 2 0,003, Spirit. et Corrig. ad 100,0
Indikation	Herztonikum bei leichten Formen der Herzinsuffizienz und anginoiden Herzbeschwerden. Zur Nachbehandlung von Strophanthin-Kuren. Bei Kollaps und zur Kollapsprophylaxe vor chirurgischen und zahnärztlichen Eingriffen.
Dosierung	3 mal täglich 15 Tropfen.
Handelsform und Preise	Flasche mit 10 ccm DM 0,70 Flasche mit 30 ccm DM 1,55 Flasche mit 50 ccm DM 2,25 Flasche mit 100 ccm DM 4,— Flasche mit 500 ccm DM 16,85
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul
Digibletten (43 25 41 00) ARp VVP 07/252	
Bestandteile	Tabl. mit 0,1 g Fol. Digit. purp. titrat. (200 FD).
Indikation	Cardiotonicum.
Dosierung	2-3 mal täglich 1-2 Tabl.
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Tabl. DM 0,80
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul

(43 25 41 00)	ARp VVT 03/202	Digitocordin
Glykoside aus Fol. digit. purp. DAB 6. 16 Tropf. = 0,05 g Fol. digit. Herzinsuffizienz im Sinne der üblichen Digitalis-Therapie. 1-3 mal täglich 12-25 Tropfen. Tropfflasche mit 20 g DM 1,95 VEB Promassoi-Werk, Erfurt		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 25 41 00)	ARp VVP 07/355	Digitoxin-Tabletten 0,0001 (0,1 mg)
1 Tabl. enthält 0,1 mg Digitoxin. Rasch resorbierbares, exakt dosierbares Cardiotonicum und Diureticum bei schweren Dekompensationserscheinungen. Dosierung individuell, nach ärztlicher Verordnung. Röhrchen mit 20 Tabl. DM 0,90 VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 13 54 00)	ABV VVP 07/463	Dihydrocodeinon. bitartricum Tabl. 0,01
Narcoticum, besonders gegen Reizhusten. Dosierung nach ärztlicher Verordnung Röhrchen mit 10 Tabl. DM 0,95 VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 22 45 00)	ARp VVP 13/207	Dijodtyrosin
3,5-Dijod-4-oxyphenylalanin. Zur Behandlung von Thyreotoxikosen und Basedow. Dosierung nach ärztlicher Verordnung. Röhrchen mit 10 Tabl. zu je 0,1 g . . . DM 1,75 VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 25 39 00)	ARp VVP 09/235	Dimitan
Jede Amp. enthält: 5 mg Methyl- bis (β -chloraethyl)-aminhydro- chlorid und 45 mg Natr. chlorat. Zur Behandlung der Lymphogranulomatose, des Lymphosar- koms, der lymphatischen Leukämie. Zur intravenösen Injektion. Allgemein 0,05 bis 0,1 mg/kg Körpergewicht, jedoch nicht mehr als 5 mg pro dosi. Packung mit 10 Trock.-Amp. zu 5 ccm DM 16,25 VEB Jenapharm, Jena		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller

Dioptrix-Augensalbe		(43 29 12 00)	Ä S 10/232	
Bestandteile	Oleum Jecoris Aselli 20,0 g, Arnica Ø 2,0 g, Extract. Hamamelidis 28,0 g, Augensalbengrundlage ad 100,0 g			
Indikation	Conjunctivitis, Blepharitis. Schutzsalbe b. Hornhautverletzungen und Epitheldefekten.			
Dosierung	Mehrere Male täglich, in leichteren Fällen nur abends, auf den unteren Lidrand auftragen.			
Handelsform und Preise	Dose mit ca. 5 g			DM 0,65
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig			
Diphtherie-Serum „Dessau“		(43 41 70 00)	ARp VVP 01	
Bestandteile	Antitoxisches Immuneserum von Pferden (500 bis 1000 AE/ccm) u. Hammeln (200 bis 400 AE/ccm), konserv., 3 Jahre verwendb.			
Indikation	Zur passiven Schutz- und zur Heilimpfung bei Diphtherie.			
Dosierung	Dosierung nach den Richtlinien Reichsges. Bl. 1935, 17.			
Handelsform und Preise	Vom Pferd	Amp. mit 8 ccm	4000 AE	DM 2,80
	Vom Pferd	Amp. mit 6 ccm	6000 AE	DM 6,05
	Vom Pferd	Amp. mit 10 ccm	10000 AE	DM 9,50
	Vom Hammel	Amp. mit 10 ccm	2000 AE	DM 2,05
	Vom Hammel	Amp. mit 10 ccm	4000 AE	DM 3,65
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau			
Diphtherie-Toxoid „Dessau“		(43 45 90 00)	ARp VVP 01	
Bestandteile	Diphtherietoxoid-Aluminium-Depotimpfstoff m. 50 bis 150 SE/ccm, konserviert, 5 Jahre verwendbar.			
Indikation	Zur aktiven und simultanen Immunisierung gegen Diphtherie.			
Dosierung	Streng sbk. (zwischen Schulterblättern). Kleinkind (1-6 J.) 2 mal 0,5 ccm, Schulkind (6-12 J.) 2 mal 0,3 ccm, Jugendl. (12-21 J.) 2 mal 0,2 ccm, Erwachsene (über 21 J.) 2 mal 0,1 ccm im Abstand von mindestens 4 Wochen.			
Handelsform und Preise	Karton mit 2 Amp. zu 0,5 ccm			DM 1,35
	Amp.-Flasche zu 25 ccm			
	für Kliniken			DM 9,60
	für Private			DM 10,05
	Karton mit 5 Amp.-Flaschen zu 25 ccm			
	für Kliniken			DM 48,—
	für Private			DM 50,40
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau			

(43 45 90 00)	ARp VVP 02	Di-Scarla-Toxoid
Auf H- und S-Einheiten staatl. gepr. Doppel-Impfstoff (Diphtherie- und Scharlach-Toxoid).		Bestandteile
Diphtherie-Scharlach-Toxoid-Depot-Impfstoff zur gleichzeitigen aktiven Schutzimpfung.		Indikation
2malige Injektion im Abstand von 4 Wochen je nach Alter 0,2-1 ccm.		Dosierung
Karton mit 2 Amp. zu je 1 ccm DM 2,31		Handelsform und Preise
Karton mit 1 Amp. zu 25 ccm DM 18,20		
VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		Hersteller
	ARp VVSx 03/222	Dithioglycerin
Dithioglycerin 5 % in öliger Lösung.		Bestandteile
Zur Behandlung von Metallvergiftungen (As, Hg, Cu, Zn, Pb), multipler Sklerose, Hepatitis, Morb. Werlhof.		Indikation
Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		Dosierung
Packung mit 5 Amp. zu 2 ccm DM 3,86		Handelsform und Preise
Packung mit 25 Amp. zu 2 ccm		
für Kliniken DM 14,01		
für Private DM 15,76		
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/233	Diugutt A
Spezialauszüge Panstabil von: Adonis 0,2 g, Convallaria 0,3 g, Scilla 0,5 g, Apocynum 1,0 g, Crataegus 5,2 g, Helleborus 0,1 g, Petroselin. 1,0 g, Uva Ursi 1,0 g, Ononis \emptyset 1,0 g, Sambucus \emptyset 1,0 g, Na ₂ SO ₄ crist. 8,0 g, p-Oxybenzoesäurethylester 0,1 g, Sirup. simplex 48,0 g, Aqua destillata ad 100,0 g		Bestandteile
Hydrops, besonders kardialen Ursprungs, Aszites, Oedeme.		Indikation
3 mal täglich 1-2 Teelöffel voll $\frac{1}{2}$ Stunde nach den Mahlzeiten, in schweren Fällen bis zu 2stündlich, zu nehmen.		Dosierung
Flasche mit ca. 110 g DM 1,30		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/234	Diugutt B
Spezialauszüge Panstabil von: Adonis 0,2 g, Convallaria 0,3 g, Scilla 0,5 g, Apocynum 1,0 g, Crataegus 5,2 g, Helleborus 0,1 g, Petroselin. 1,0 g, Uva ursi 1,0 g, Ononis \emptyset 1,0 g, Sambucus \emptyset 1,0 g, Na ₂ SO ₄ crist. 10,0 g, Extract. Frangulae fluid. 24,0 g, p-Oxybenzoesäuremethylester 0,1 g, Sirup. simplex 42,6 g, Aqua destillata ad 100,0 g		Bestandteile
Hydrops, besonders kardialen Ursprungs, Aszites, Oedeme.		Indikation
Dosierung wie Diugutt A		Dosierung
Flasche mit ca. 110 g DM 1,30		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller

Diursan	(43 22 89 00)	A VVT 02/202
Bestandteile	Extr. Junip. conc. 10,0, Extr. Uvae ursi fl. 10,0, Extr. Vitis idae fl. 5,0, Sir. Amyli 16,0, Saccharum 40,0, Aromatica 0,0472 (in %).	
Indikation	Diuretischer Pflanzenextrakt.	
Dosierung	3-6 Teelöffel voll pro Tag 1/2 Stunde vor der Mahlzeit in Tee oder Wasser.	
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 155 g DM 1,25	
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.	
Dolosin	(43 21 39 00)	A VVA 01/224
Bestandteile	90 % Lopirin (Salicylsäure-Isopropylamid) und 10 % Coffeinum purum.	
Indikation	Analgeticum gegen Schmerzen aller Art: Kopfschmerzen (auch Migräne), Zahnschmerzen sowie Schmerzen im Gefolge von Infektions- und Erkältungskrankheiten.	
Dosierung	Je nach Bedarf 3 mal täglich 1-2 Tabl. in Flüssigkeit aufgelöst einnehmen.	
Handelsform und Preise	Schiebeschachtel mit 10 Tabl. zu 0,5 g DM 1,— Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu 0,5 g DM 52,95	
Hersteller	VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden	
Doppel-Impfstoff „Weißensee“	(43 45 90 00)	ARp VVP 02
Bestandteile	Staatl. gepr. Depot-Impfstoff.	
Indikation	Zur gleichz. akt. Schutzimpfung gegen Diphtherie und Pertussis. Zweimalige Inj. im Abstand von 4 Wochen je nach Alter 0,2-1 ccm.	
Dosierung		
Handelsform und Preise	Karton mit 2 Amp. zu 1 ccm DM 2,38 Karton mit 1 Amp. zu 25 ccm DM 13,65 Karton mit 5 Amp. zu 25 ccm DM 53,—	
Hersteller	VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee	
Dragees Neunzehn verstärkt	(43 26 49 00)	A VVP 11/205
Bestandteile	1 Drageekern enthält: Extr. Aloe 0,0074, Rhiz. Rhei 0,0229, Cort. Frang. 0,0086, Spec. lax. 0,0486, Natr. sulf. 0,0073, Galle 0,0186, Saponin 0,0004, Phenolphthalein 0,0045, Glycoside 0,0017	
Indikation	Mildwirkendes Stuhlregulierungsmittel z. kurmäßigen Gebr.	
Dosierung	Bei Bedarf 1-3 Stück unzerkaut zur Zeit nehmen. Sonst un- mittelbar nach jeder Mahlzeit 1-2 Stück.	
Handelsform und Preise	Glasflasche mit 40 Dragees DM 1,05	
Hersteller	VEB Pharm. Werk Pankow, Berlin-Pankow	

(43 21 25 00)	A VVP 11/201	Dreinerv-Dragees
1 Drageekern enthält: Pflanzl. Nährsubstanz 0,1925, Nährsalze 0,1550, Kal. und Natr. brom. 0,0150, Cholesterin 0,0100, Glucose 0,0575, Sacch. alb. 0,0700		Bestandteile
Nervinum und allgemeines Aufbaumittel, besonders wirksam infolge der mildwirkenden Bromkomponenten.		Indikation
3 mal täglich 1-2 Dragees nach den Mahlzeiten (mit etwas Wasser schlucken)		Dosierung
Glasflasche mit 72 Dragees DM 2,50		Handelsform und Preise
VEB Pharm. Werk Pankow, Berlin-Pankow		Hersteller
(43 26 57 00)	A VVOr 02/205	Dyspepsol „Fahlberg“ granulat.
55 % Pektin, 45 % Zellulose.		Bestandteile
Chronische und akute dyspeptische Störungen, infektiöse u. toxische Darmerkrankungen bei Erwachsenen und Kindern.		Indikation
Erwachsene u. Kinder 3-5 mal täglich je einen gestrichenen Eßlöffel einnehmen. Mit etwas Wasser, Tee o. ä. nachspül.		Dosierung
Schachtel mit 50 g DM 1,20		Handelsform und Preise
VEB Fahlberg-List, Magdeburg		Hersteller
(43 26 57 00)	A VVOr 02/204	Dyspepsol „Fahlberg“ liquidum
79,79 % Aqua dest., 20,0 % Pektin, 0,06 % Krist.-Saccharin, 0,12 % p-Oxybenzoesäuremethylester, 0,03 % p-Oxybenzoesäurepropylester.		Bestandteile
Chronische und akute dyspeptische Störungen, infektiöse u. toxische Darmerkrankungen bei Säuglingen, die noch keine Zellulosebelastung vertragen.		Indikation
Bei einem Alter bis zu 1 Monat 1/2-1 Teelöffel, bei einem Alter bis zu 1 Jahr 1/2-1 Eßlöffel, 3 mal täglich in Tee oder in einem Teil der sonstigen Nahrung geben.		Dosierung
Flasche mit 150 ccm DM 2,—		Handelsform und Preise
Flasche mit 250 ccm DM 3,10		Handelsform und Preise
VEB Fahlberg-List, Magdeburg		Hersteller
(43 29 12 00)	A VVP 10/283	Echinacin ad iniektionem
Extr. Echinaceae purpur. e planta rec. 25 %, in physiologischer Kochsalzlösung.		Bestandteile
Zur Resistenzsteigerung bei septischen und entzündlichen Prozessen, Furunkulose.		Indikation
Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		Dosierung
Schachtel mit 6 Amp. zu 1 ccm DM 3,35		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Echinacin extern		(43 29 12 00)	A VVP 10/284
Bestandteile	Extr. Echinaceae purpur. e planta rec. 55,5, Urea pura 9,5, Aqua ad 100,0		
Indikation	Zur schnellen Wundreinigung bei infizierten Wunden, Ulcera cruris, Verbrennungen, Erfrierungen, Fluor albus, Portioerosion.		
Dosierung	Unverdünnt zu Umschlägen.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 125 ccm	DM 2,10	
	Flasche mit 500 ccm	DM 7,10	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Echinacin intern		(43 29 12 00)	A VVP 10/272
Bestandteile	Extr. Echinaceae purpur. e planta rec. 81,0, Spirit. ad. 100,0		
Indikation	Im Sinne einer Resistenzsteigerung bei septischen und entzündlichen Prozessen, Furunkulose.		
Dosierung	3 mal täglich 15-40 Tropfen.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 20 ccm	DM 1,45	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Echinacin-Salbe		(43 29 12 00)	A VVP 10/221
Bestandteile	Echinacin extern 10,0, Ungt. molle ad 100,0		
Indikation	Gegen Ekzeme, Ulcera cruris, Furunkulose.		
Dosierung	Äußerlich!		
Handelsform und Preise	Packung mit 30 g	DM 0,85	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Emser Salz		(43 23 53 00)	VVSA 01/204
Bestandteile	Sal. Ems. factit. Erg. Bd. VI pulv.		
Indikation	Katarrhe des Respirationstraktus.		
Dosierung	Zum Gurgeln 3-6 g auf 1/2 Ltr. Wasser. Zur Trinkkur 3 g auf 1 Ltr. Wasser.		
Handelsform und Preise	Faltschachtel mit 100 g	DM 0,55	
Hersteller	VEB Eumarhal-Werk Bernburg		

(43 29 12 00)	A S 10/251	Enuroplant
Spezialauszug Panstabil von: Belladonna 0,034 g, Equiset. \emptyset 17,0 g, Millefol. \emptyset 17,0 g, Plantago \emptyset 17,0 g, Pulsatilla hom. dil. 1,0 g, Kal. phosph. 0,17 g, Zinc. phosphoric. colloid. hom. dil. 1,0 g, Alkohol 45 % ad 100,0		Bestandteile
Enuresis nocturna, Incontinentia urinae.		Indikation
3 mal täglich, evtl. öfter, ca. 10 Tropfen mit wenig Wasser 1 Stunde nach den Mahlzeiten.		Dosierung
Flasche mit 10 ccm DM 0,65		Handelsform und Preise
Flasche mit 30 ccm DM 1,65		
VEB Homöopharm Dr. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 23 14 00)	A VVT 03/204	Epecton Hustensaft mit Ephedrin
Ephedrin benzoic. 0,2 %, Extr. Thymii 5 %, Extr. Foeniculi 5 %, Kal. bromat. 1 %, Sacchar. 50 %, Ol. Anisi 0,012 %, Aqua dest. ad. 100 %		Bestandteile
Tussis, Pertussis, Bronchitis.		Indikation
4 mal täglich 1 Teelöffel.		Dosierung
Flasche mit 100 ccm DM 1,45		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 1000 ccm DM 9,95		
VEB Promassol-Werk, Erfurt		Hersteller
(43 23 11 00)	A VVT 03/205	Epecton Hustentropfen
Extr. Pectorale 10 %, Extr. Thymi 15 %, Ol. Anisi 0,15 %, Ol. Eucalypti 0,15 %, Spirit. 10 %, Ammon. chlor. 2,5 %, Aqua dest. ad. 100 %		Bestandteile
Tussis, Pertussis, Bronchitis.		Indikation
3 mal stündlich 15-20 Tropfen.		Dosierung
Tropfflasche mit ca. 20 g DM 0,95		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 200 g DM 6,20		
Klinikpackung mit 1000 g DM 27,20		
VEB Promassol-Werk, Erfurt		Hersteller
(43 23 16 00)	A VVT 03/227	Epecton „C“
Extr. Pectorale 10 %, Extr. Thymi 15 %, Ol. Anisi 0,15 %, Ol. Eucalypti 0,15 %, Codein 0,1 %, Spirit. 10 %, Ammon. chlor. 2,5 %, Aqua dest. ad 100 %		Bestandteile
Bei hartnäckigem Husten und katarrhalischen Reizzuständen		Indikation
Flasche mit 15 ccm DM 1,50		Handelsform und Preise
VEB Promassol-Werk, Erfurt		Hersteller

Ephedrin-Dragees (f. Kinder)		(43 23 27 00)	A VVOr 02/229
Bestandteile	5 % d,l-Ephedrin hydrochlor., 95 % Sacch. alb.		
Indikation	Herz- und Kreislaufstörungen, Enuresis nocturna, asthmatische Beschwerden, Heufieber.		
Dosierung	Nach Verordnung des Arztes je nach Lebensalter 1-3 mal täglich 1-3 Dragees.		
Handelsform und Preise	Röhre mit 20 Dragees zu 0,2 mit je 0,01 g d,l-Ephedrin hydrochlor. DM 0,98		
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		
Ephedrin-Lösung in Ampullen		(43 25 45 00)	ARp VVOr 02/222
Bestandteile	94,9 % Aqua dest., 5,0 % d,l-Ephedrin hydrochlor., 0,08 % p-oxybenzoesäuremethylester, 0,02 % p-oxybenzoesäurepropylester.		
Indikation	Asthma bronchiale, Heufieber und allergische Erkrankungen, Kreislaufschwäche.		
Dosierung	Subkutane Injektion 1-3 mal täglich 1/2-1 Amp.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 10 Amp. zu 1,1 ccm . DM 2,87		
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		
Ephedrin-Tabletten „Fahlberg“		(43 23 27 00)	A VVOr 02/474
Bestandteile	20 % d,l-Ephedrin hydrochlor., 20 % Stärke, 12 % Talkum, 48 % Milchzucker.		
Indikation	Bronchialasthma, Heufieber und andere allergische Erkrankungen, Bronchitis, Kreislaufstörungen, Hypotonie usw.		
Dosierung	Bei asthmatischem Anfall 1/2-1 Tabl. oder 2-3 mal täglich 1/4-1/2 Tabl.		
Handelsform und Preise	Röhrch. m. 10 Tabl. zu je 0,05 g Ephedrin DM 1.— Klinikpackg. mit 200 Tabl. zu je 0,05 g DM 14,85		
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		

(43 45 90 00)	ARp VVP 01/201	Epileptasid „Dessau“
Injektionslös. v. Crotalus-(Klapperschlangen-)Toxin 0,04 mg/ccm, konserviert, staatl. geprüft, 2 Jahre verwendbar.		Bestandteile
Zur Behandlung genuiner u. traumatischer Epilepsie, Chorea minor und migränoider Kopfschmerzen.		Indikation
Kurmäßige Anwendung. Kur ca. 1/2 Jahr. Wiederholung nach Jahresfrist. Injektionen sbk. oder im. in Abständen von 1 Woche. Anfangsdosis 0,3 ccm, Anstieg um 0,1 ccm, Höchstdosis 2,0 ccm. Kinder: 1/2-1/4 der Dosis.		Dosierung
Karton mit 5 Amp. zu 1 ccm DM 5,90 Amp.-Flasche mit 5 ccm DM 5,05		Handelsform und Preise
VEB Serum-Werk Dessau		Hersteller
(43 28 15 00)	A VVP 14/214	Epithen-Salbe
Pellidol 0,88 ‰, Scharlachrot 0,005 ‰ und Perubalsam 0,88 ‰ in besonderer Salbengrundlage.		Bestandteile
Gegen Hautschäden aller Art, Furunkulose, offene Frostschäden, nach Ausbrennen von Lupus und Hautkrebs, Erosionen, Fissuren (Fissura mammae et ani).		Indikation
Je nach Bedarf in nicht zu dünner Schicht auftragen oder einreiben.		Dosierung
Tube mit 20 g DM 0,64 Tube mit 35 g DM 0,85 Dose mit 200 g DM 3,05		Handelsform und Preise
VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		Hersteller
(43 41 90 00)	VVP 01	Erysipeloid-Serum „Dessau“
Antiinfektiöses Rotlaufserum ad us. hum. vom Schwein, 100 IE /ccm, konserviert, 1 Jahr verwendbar.		Bestandteile
Zur Therapie des Stäbchenrotlaufs und von Murisepticum-Infektionen (Erysipeloid Rosenbach).		Indikation
Leichte Fälle 10 ccm, schwere Fälle 20 ccm i. m. u. z. TI. sbk. unter u. rings um den Krankheitsherd. Neben d. parenteralen Behandlung mit E. Befeuchtung mit reinem Wundbenzin 5-10 Minuten. Anschl. Verband m. E. Fast stets genügt einmalige Applikation.		Dosierung
Amp. mit 10 ccm DM 2,15		Handelsform und Preise
VEB Serum-Werk Dessau		Hersteller

Esenecal-Tinktur		(43 29 12 00)	A VVP 10/282
Bestandteile	Kal. caustic. 1,0, Oleum 6,25, Methyl. salicylic. 2,0, Ol. Eucalypt. 0,8, Pinus silv. Ø 5,0, Capsic. Ø 3,6, Rhus toxicod. Ø 0,2, Tanacetum Ø, Melissa Ø, Eucalypt. glob. Ø aa 1,4, Camphora 0,2, Ol. Tymy 0,4, Ol. Terebinth. 1,4, Spiritus et Corrig. ad 100		
Indikation	Muskelrheumatismus, Neuralgien, Senkfußbeschwerden.		
Dosierung	Äußerlich zur Einreibung.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 50 ccm	DM 0,80	
	Flasche mit 500 ccm	DM 6,05	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Esmarolan		(43 21 63 00)	A VVP 05/214
Bestandteile	Allylthiocarbamid 2,0, Methyl. salicyl. 5,0, Sapo kalinus 20,0, Olea aether. 2,0, Salbengrundlage auf Wollfettbasis 71,0		
Indikation	Antirheumaticum, Antiarthriticum.		
Dosierung	Äußerlich zu Einreibungen.		
Handelsform und Preise	Dose mit ca. 35 g	DM 1,25	
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		
Essentia aurea „Schwabe“		(43 29 12 00)	A S 10/252
Bestandteile	Crataegus 10 FD/ccm 17,0, Aurum muriatic. D 4 0,12, Cactus D 2 17,0, Lobelia D 4 17,0, Ignatia D 4 17,0, Spezialauszug Panstabil von Convallaria 0,017, Aqua destillat. ad 100,0		
Indikation	Dysfunktion des Kreislaufs, leichte Formen des roten Hochdrucks mit Herzbeschwerden.		
Dosierung	3-4 mal täglich ca. 10 Tropfen in etwas Wasser.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 10 ccm	DM 0,65	
	Flasche mit ca. 30 ccm	DM 1,65	
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Eufemyl		(43 22 25 00)	A VVP 14/215
Bestandteile	Mamm. Lact. sicc. 0,1 g pro Drag.		
Indikation	Gegen Menstruationsbeschwerden, insbesondere ovarielle Dysmenorrhoen, Poly-Hypermorrhoen und Metrorrhagien, blutende Myome.		
Dosierung	3-4 Tage vor der zu erwartenden Menstruation 3 mal täglich 2 Dragees, im ganzen 6 Tage, zu nehmen. Diese Dosis kann in schweren Fällen ohne Bedenken erhöht werden.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 40 Dragees	DM 0,95	
Hersteller	VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		

(43 29 12 00)	A VVP 10/281	Eufoliat
Calc. carb. 0,0068, Testae ovar. plv. 0,0068, Myrrha 0,1, Card. benedict. Teep 3,0, Taraxacum Teep 2,0, Absinthium Teep 20,0, Herba Absinthii plv. 1,2, Sacch. et Massa ad 100 Dragees 13,686		Bestandteile
Bei Erkältungskrankheiten, Grippe-Prophylaxe, i. Sinne einer allgemeinen Resistenzsteigerung bei Ermüdungs- und Erschöpfungszuständen verschiedener Genese, Ulcus cruris, Migräne, Kopfschmerzen.		Indikation
3 mal täglich 1-2 Tabl.		Dosierung
Packung mit 40 Dragees DM 0,75		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 23 59 00)	VVP 07/253	Eugarrol
Natr. salicylic. 0,5, Natr. benzoic. 0,8, Natr. bicarbonic. 1,0, Borax 2,0, Ol. Eucalypti 1,0, Ol. Menth. piper. 1,0, Ol. Thymi 2,0, Menthol 2,0, Spirit. 47,0, Glycerin. 20,0, Aqua dest. ad 100,0		Bestandteile
Desinfiz. und desodorierendes Mundwasser zum Gurgeln und zu Mundspülungen.		Indikation
Spritzflasche mit 45 ccm DM 1,45 und Spritzschlag DM 0,14		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 26 42 00)	A VVP 06/202	Euglissin
1 Tabl. enth.: Phenolphthalein 0,125, Rhiz. rhei 0,25, Extr. frang. 0,05		Bestandteile
Mildes, zuverlässig wirksames Abführmittel für Erwachsene, Kinder und Bettlägerige.		Indikation
1-2 Tabl., ggf. mehr.		Dosierung
Packung mit 12 Tabl. DM 0,70		Handelsform und Preise
Packung mit 30 Tabl. DM 1,50		
Klinikpackung mit 200 Tabl. DM 6,50		
VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau		Hersteller
(43 23 52 00)	VVA 02/202	Eukalyptus-Menthol- Tabletten
Menthol 0,15, Ol. Menth. pip. 0,25, Ol. Eucalypt. 0,50, Sal Ems. art. 1,55, o-Benz. sulfimid-Na 0,05, Sacchar. alb. 48,75, Sacchar. Uv. 48,75		Bestandteile
Erkrankungen des Rachens und der Atmungsorgane.		Indikation
Mehrere mal täglich 1 Tabl.		Dosierung
Packung mit 50 Tabl. zu je 0,25 g DM 1,—		Handelsform und Preise
„Rhenania“ VEB Kali-Chemie, Bln.-N'schönevide		Hersteller

Euphydigital		(43 25 41 00)	ARp VVP 04/208
Bestandteile	Euphyllin 0,1 g, Fol. dig. purp. 150 FD.		
Indikation	Bei allen Herz- und Kreislauf-Insuffizienz-Erscheinungen, besonders bei cardialen Odemen, Coronarsklerose und Angina pectoris, soweit eine Digitalis-Medikation angezeigt ist.		
Dosierung	3 mal täglich 1-2 Tabl. nach dem Essen.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 10 Tabl.	DM 1,16	
	Röhrchen mit 20 Tabl.	DM 1,95	
	Klinikpackung mit 250 Tabl.	DM 18,37	
Hersteller	VEB Pharm. Werk Oranienburg		
Euphyllin		(43 25 46 00)	ARp VVP 04/209/206/215
Bestandteile	Theophyllin-Aethylendiamin. (78 % Theophyllingehalt).		
Indikation	Diureticum und Cardiacum.		
Dosierung	Amp. nur nach ärztlicher Verordnung. Suppositorien 2-3 Stück täglich. Tabl. 3-4 mal täglich 1 Tabl. mit Flüssigkeit.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 5 Amp. zu 1 ccm=0,12 g Euphyllin	DM 2,20	
	Klinikpackung-mit 100 Amp. zu 1 ccm	DM 22,28	
	Schachtel mit 10 Suppos., enthaltend je 0,36 g Euphyllin	DM 2,92	
	Röhrchen m. 10 Tabl. zu 0,1 g Euphyllin	DM 0,87	
	Röhrchen mit 20 Tabl.	DM 1,60	
	Klinikpackung mit 100 Tabl.	DM 6,56	
Hersteller	VEB Pharm. Werk Oranienburg		
Euphyllin-Calcium		(43 25 46 00)	ARp VVP 04/217
Bestandteile	Euphyllin 0,1 g, Calc. lact. 0,14 g.		
Indikation	Cardiacum und Diureticum. Bei Asthma bronchiale, Vergiftungen.		
Dosierung	3 mal täglich 1 Tabl. nach dem Essen.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Tabl.	DM 1,64	
	Klinikpackung mit 100 Tabl.	DM 6,56	
Hersteller	VEB Pharm. Werk Oranienburg		
Euphyllin-Jod-Calcium		(43 25 46 00)	ARp VVP 04/218
Bestandteile	Euphyllin 0,1 g, Calc. lact. 0,14, Kal. jodat. 0,0067 g		
Indikation	Bei Arteriosklerose, Hypertonie, klimakt. Beschwerden.		
Dosierung	3 mal täglich 1 Tabl. nach dem Essen.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Tabl.	DM 1,64	
	Klinikpackung mit 100 Tabl.	DM 6,56	
Hersteller	VEB Pharm. Werk Oranienburg		

(43 25 29 00)	ARp VVA 01/231	Euvernil
Chemotherapeutikum, N-Sulfanylcarbamid. Gegen Infektionen der Harnwege (Cystitis, Pyelitis, Pyelonephritis, Prostatitis). Gleichmäßig über den Tag verteilt 6 mal je 3 Tabl., nach Zerfallen in wenig Wasser. Es ist unbedingt erforderlich, diese Dosierung und den Abstand von je 4 Stunden einzuhalten. Bei Kindern bis zu 2 Jahren ist die Dosierung 4 mal 1 Tablette, bei Kindern über 2 Jahre 4 mal 2 Tabl. In besonders schweren oder hartnäckigen Fällen kann infolge der Ungiftigkeit von Euvernil die Dosis nach Anordnung des Arztes auf 6 mal 4 bis 6 mal 5 Tabl. erhöht werden. Über Anwendung von Euvernil in Ampullenform unterrichtet die den Amp.-Packungen beiliegende Gebrauchsanleitung. Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,5 g DM 1,90 Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu 0,5 g DM 61,80 Schachtel mit 5 Amp. zu 10,5 ccm DM 4,70 Schachtel mit 3 Amp. zu 25 ccm DM 5,40 Klinikpackung mit 50 Amp. zu 10,5 ccm DM 34,20 VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 25 29 00)	ARp VVA 01/231	Euvernil
Chemotherapeutikum, N-Sulfanylcarbamid. Zu Instillationen und Körperhöhlen-Spülungen, jedoch nicht für die parenterale Applikation. Flasche mit 250 ccm DM 15,10 VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller
(43 29 90 00)	VVP 02	Extrakte zur Serodiagnostik Citochol-Extrakt
Alkohol. cholester. Rinderherzextrakt. Staatl. geprüft. Zur Ausführung d. Citochol-Reaktion nach Sachs u. Witebsky. Flasche mit 50 ccm DM 20,10 VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller
(43 29 90 00)	VVP 02	Kahn-Extrakt
Alkohol. cholester. Rinderherzextrakt. Staatl. geprüft. Zur Ausführung der Kahn'schen Reaktion auf Syphilis. Flasche mit 50 ccm DM 6,50 Flasche mit 100 ccm DM 12,27 VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller

Rinderherzextrakt		(43 29 90 00)	VVP 02
Bestandteile	Alkohol. cholester. Rinderherzextrakt.		
Indikation	Zur Ausführung d. Wassermann'schen Reaktion. Staatl. gepr.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 50 ccm	DM 13,70	
	Flasche mit 100 ccm	DM 24,70	
Hersteller	VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		
Haemolytischer Ambozeptor		(43 29 90 00)	VVP 02
Indikation	Staatlich gepr. für die Wassermann'sche Reaktion. Titer von 1600 und 3000		
Handelsform und Preise	Karton mit 3×1 ccm, Titer 1:1600	DM 10,05	
	Karton mit 3×1 ccm, Titer 1:3000	DM 13,—	
	Karton mit 2×5 ccm, Titer 1:1600	DM 28,30	
	Karton mit 2×5 ccm, Titer 1:3000	DM 41,30	
Hersteller	VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		
Exrhinin (Schnupfensalbe)		(43 23 62 00)	A VVOr 02/224
Bestandteile	29,0 % Eucerin, 2,9 % Wollfett, 4,8 % Weißöl, 3,0 % d,l-Ephedrin hydrochlor., 4,8 % Glycerin, 55,1 % Aqua dest., 0,1 % Fallicain, 0,21 % p-Oxybenzoesäuremethylester, 0,09 % p-Oxybenzoesäurepropylester.		
Indikation	Bei allen Entzündungen der Nasenschleimhaut, Schnupfen, Heuschnupfen.		
Dosierung	Je nach Bedarf Tubenkanüle in die Nasenlöcher einführen, 1/2 cm Salbe hineindrücken, Nasenflügel massieren.		
Handelsform und Preise	Tube mit Kanüle 10 g	DM 1,05	
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		
Exrhinisol (Nasenöl)		(43 23 62 00)	A VVOr 02/220
Bestandteile	97,25 % Paraffinum liquid., 0,75 % d,l-Ephedrinchlorhydrat, 0,50 % Eukalyptol, 0,50 % Menthol, 0,50 % Rizinusöl, 0,50 % Kampfer.		
Indikation	Bei Rhinitis, Pharyngitis, Asthma bronchiale, Heuschnupfen.		
Dosierung	3-stündlich 3-5 Tropfen in jedes Nasenloch einträufeln und die Nasenflügel leicht massieren.		
Handelsform und Preise	Pipettenflasche mit 15 ccm	DM 1,32	
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		

(43 23 14 00)	A VVOr 02/206	Extussin-Hustensaft mit Ephedrin
<p>52,4 % Sacchar. alb., 38,3 % Aqua dest., 7,5 % Extr. Thymi comp. fluid., 0,6 % Natr. brom., 0,6 % Kal. brom., 0,1 % p-Oxybenzoesäureester, 0,2 % d.l-Ephedrinchlorhydrat., 0,3 % Ammon. brom</p> <p>Bei Husten aller Art, Erkältungszuständen.</p> <p>Erwachsene 4 mal täglich 1-2 Teelöffel, Kinder 2-4 mal täglich 1/2-1 Teelöffel.</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p>
<p>Flasche mit 100 ccm DM 1,50</p> <p>Klinikpackung mit 5 kg</p> <p>Klinikpackung mit 10 kg</p> <p>VEB Fahlberg-List, Magdeburg</p>		<p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 23 14 00)	ARp VVOr 02/207	Extussin-Hustensaft mit Ephedrin und Codein
<p>52,4 % Sacchar. album, 38,26 % Aqua dest., 7,5 % Extr. Thymi comp. fluid., 0,3 % Ammon. bromat., 0,6 % Natr. bromat., 0,6 % Kal. bromat., 0,1 % p-Oxybenzoesäureester, 0,2 % d.l-Ephedrin hydrochlor., 0,04 % Codein hydrochloric.</p> <p>Bei Husten aller Art, Erkältungszuständen.</p> <p>Erwachsene 4 mal täglich 1-2 Teelöffel, Kinder 2-4 mal täglich 1/2-1 Teelöffel voll.</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p>
<p>Flasche mit 100 ccm DM 1,81</p> <p>Klinikpackung mit 5 kg</p> <p>Klinikpackung mit 10 kg</p> <p>VEB Fahlberg-List, Magdeburg</p>		<p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 26 89 00)	ARp VVOr 02/208	Falichol
<p>50,0 % Fel tauri sicc., 25,0 % Hexamethylentetramin, 4,5 % Phenolphthalein, 1,0 % Gummi arab., 8,1 % Talkum, 10,0 % Magnesia usta, 0,4 % Kampfer, 0,4 % Menthol, 0,6 % Calomel.</p> <p>Mangelnde Galleproduktion bei einfacher Leberinsuffizienz, gestörte Motilität der Gallenwege, Entzündungserscheinungen in der Leber-Gallengegend.</p> <p>Bei Kurbeginn 1 Dragee nach dem Abendessen, vom 2. Tage ab nach der Mittags- und Abendmahlzeit je 1 Dragee, später evtl. 3 mal täglich 1 Dragee unzerkaut hinunterspülen.</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p>
<p>Röhrchen mit 15 Dragees DM 1,05</p> <p>Klinikpackung mit 250 Dragees DM 11,51</p> <p>Klinikpackung mit 1000 Dragees DM 37,58</p> <p>VEB Fahlberg-List, Magdeburg</p>		<p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>

Fallmint (43 23 59 00) A VVOr 02/218		
Bestandteile	94,5 % Sacchar. album, 5,5 % 1-propoxy-2-acetamino-4-nitrobenzol.	
Indikation	Bei allen Entzündungen des Nasen-Rachenraumes, Raucher- und Theaterhusten, zur Verhinderung des Würgereizes bei vorzunehmenden instrumentalen Untersuchungen im Mund- und Rachenraum.	
Dosierung	Täglich 6-10 Dragees je nach Bedarf langsam im Munde zergehen lassen.	
Handelsform und Preise	Bakelitdose mit ca. 50 Dragees . . .	DM 1,22
Hersteller		
Falipsoryl (43 24 13 00) ARp VVOr 02/209		
Bestandteile	59,82 % Aceton, 26,10 % Reinbenzol, 13,95 % Spezialteer, 0,12 % Wintergreenöl, 0,01 % Sublimat.	
Indikation	Parasitäre Dermatosen, insbesondere Psoriasis, Epidermophytien, Neurodermitis, chronische Ekzeme.	
Dosierung	Nach Entschuppung 1-2 mal täglich mit einem Pinsel oder Wattebausch auftragen.	
Handelsform und Preise	Flasche mit 50 ccm	DM 1,75
	Flasche mit 100 ccm	DM 2,29
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg	
Fallistypt zur Injektion (43 28 21 00) ARp VVOr 02/210		
Bestandteile	5,0 % Reinpektin, ca. 92,0 % Aqua dest., 3,0 % Aminoessigsäure, 0,12 % p-Oxybenzoesäuremethylester, 0,03 % p-Oxybenzoesäurepropylester.	
Indikation	Blutungszustände jeglicher Ätiologie, z. B. Magen-, Darm-, Lungen-, Nieren- und Blasenblutungen. Intramuskulär injizieren.	
Handelsform und Preise	Schachtel mit 5 Amp. zu 10 ccm . . .	DM 4,20
	Karton mit 50 Amp. zu 10 ccm . . .	DM 29,84
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg	
Fallistypt zur Instillation (43 28 21 00) ARp VVOr 02/210		
Bestandteile	5,0 % Reinpektin, ca. 92,0 % Aqua dest., 3,0 % Aminoessigsäure, 0,12 % p-Oxybenzoesäuremethylester, 0,03 % p-Oxybenzoesäurepropylester.	
Indikation	Bei Blasenblutungen. Zur Instillation und zur vesikalen Spülung.	
Handelsform und Preise	Schachtel mit 6 Amp. zu 25 ccm . . .	DM 8,42
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg	

(43 28 21 00)	A VVOr 02/211	Falistrypt liquidum
76,21 % Aqua dest., 20,64 % Rohpektinlösung, 3,0 % Aminoessigsäure, 0,12 % p-Oxybenzoesäuremethylester, 0,03 % p-Oxybenzoesäurepropylester.		Bestandteile
Indikation wie bei Falistrypt zur Inj. 3-5 mal täglich 1 Eßlöffel.		Indikation
Flasche mit 150 ccm DM 3,34 Flasche mit 250 ccm DM 5,—		Dosierung Handelsform und Preise
VEB Fahlberg-List, Magdeburg		Hersteller
(43 28 21 00)	A VVOr 02/212	Falistrypt-Puder
73,5 % Calcium carbonic., 16,5 % Reinpektin, 10,0 % Aminoessigsäure.		Bestandteile
Zum Aufstreuen auf Wundflächen, auch für Zwecke der Oto-, Rhino- und Laryngologie und für die Zahnmedizin.		Indikation
Streuglas mit 15 g DM 1,80		Handelsform und Preise
VEB Fahlberg-List, Magdeburg		Hersteller
(43 28 21 00)	A VVOr 02/212	Falistrypt-Puder steril in Ampullen
80 % Reinpektin, 20 % Aminoessigsäure.		Bestandteile
Zum Aufstreuen auf Wundflächen, zum Einbringen in Wundhöhlen, in der Chirurgie z. B. bei Operationen mit anschließendem Wundverschluß, auch für Zwecke der Oto-, Rhino- und Laryngologie. Zum Aufstreuen auf blutende Wunden bzw. Einbringen in Wundhöhlen.		Indikation
Schachtel mit 10 Amp. zu 0,5 g DM 6,10		Handelsform und Preise
VEB Fahlberg-List, Magdeburg		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/253	Ferrofungin liquidum
50 mg Ferrum (in zweiwertiger Form, stabilisiert) in 5 ccm (=1 Teelöffel).		Bestandteile
Alimentäre Schwächezustände. Anaemie und Chlorose.		Indikation
1-2 mal täglich 1 Teelöffel voll auf 1/2 Ltr. Glas Wasser; sofort zu trinken.		Dosierung
Flasche mit ca. 100 ccm DM 1,05		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller

Ferrostabil		(4327 23 00)	A VVP 13/206
Bestandteile	Stabilisiertes Ferrochlorid.		
Indikation	Sekundäre Anaemie, Chlorose, Rekonvaleszenz.		
Dosierung	3-4 mal täglich 2 Dragees nach den Mahlzeiten. Bei hartnäckigen Chlorosen kann die Ferrostabil-Menge über die übliche Dosierung hinaus gesteigert werden.		
Handelsform und Preise	Packung mit 50 Dragees zu je 0,05 g DM 1,35 Klinikpackg. m. 250 Dragees zu je 0,05 g DM 5,75		
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		
Fibrex		(43 21 33 00)	A VVP 06/222
Bestandteile	Phenacetin 0,3, Coffein. 0,03, Chinin 0,03, Acetylsalicylsäure 0,1		
Indikation	Antineuralgicum, Antipyreticum, Analgeticum.		
Dosierung	3 mal täglich 1-2 Tabl.		
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Tabl. DM 0,94		
Hersteller	VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau		
Fissurin-Salbe		(43 28 17 00)	A VVP 01/213
Bestandteile	8,8 % Invert.-Zucker, 1,8 % Ol. ped. tauri, 4,5 % ZnO, 1,35 % Bi OH (NO ₂) ₂ , 13 % Adeps lanae, 1,85 % Ceresine, 68,70 % Salbengrundlage c. aq.		
Indikation	Ekzeme verschiedener Art, Brand- und Frostschäden, Wundsein der Kinder, Rhagaden, Fissuren, spröde und rissige Haut, Sonnenbrand.		
Dosierung	Dünnes Auftragen kleinster Salbenmengen täglich 1-2 mal.		
Handelsform und Preise	Kruke mit 30 g DM 0,85 Kruke mit 50 g DM 1,30 Kruke mit 250 g für Private DM 5,55 für Kliniken DM 4,60		
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau		
Flaviform-Tabletten		(43 25 35 00)	VVP 07/254
Bestandteile	Tabl. mit 0,003 g 3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid.		
Indikation	Prophylacticum bei Infektionskrankheiten. Zur Desinfektion von Mund und Rachen.		
Dosierung	Stündlich 1-2 Tabl. langsam im Munde zergehen lassen.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Tabl. DM 0,75 Klinikpackung mit 500 Tabl. DM 9,80		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		

(43 29 12 00)	A S 10/254	Formidium (Injektionen) D 3, D 4, D 5, D 6, D 12
Acid. formicic. e formica rufa parat. in isotonischer Lösung. Unspezifische Reiztherapie, Myalgien, Neuralgien, Ischias, chron. Rheumatismus, Pruritus, Urticaria, Ekzeme. Injektion von 0,2-1 ccm subkutan, intramuskulär oder intra- venös 2-3 mal wöchentlich. Packung mit 6 Amp. (1,1 ccm) DM 0,65 Packung mit 12 Amp. (1,1 ccm) DM 1,10 VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 21 61 00)	VVT 02/817	Franzbranntwein
Spiritus 50 Vol. ‰, Menthol 0,01 ‰, Aether acet. 0,1 ‰, Spir. aeth. nitr. 1,0 ‰, Camphora 0,5 ‰ Nachtschweiße, Vorbeugung gegen Durchliegen der Bett- lägerigen. Mehrmals täglich einzureiben. Flasche mit ca. 100 ccm DM 1,04 und Spir.-Zuschlag DM 0,31 VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 28 19 00)	A VVS 01/204	Frigidin-Salbe
Oleum petrae 4,0, Campher 7,0, Fel tauri 10,0, Zinc. oxyd. 6,0, Ol. tereb. 6,0, Salbengrundlage 67,0 Gegen Frostschäden aller Art. Glasdose mit 20 g DM 1,10 VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller
(43 26 55 00)	A VVP 01/204	Gastrase
Magen- und Darmantisepticum mit 0,75 ‰ Ag in kolloid. Form. Geg. akute Magenverstimmungen, Gastritiden, Magen-Darm- katarrhe u. -Entzündungen, Sommerdiarrhoe, bei beginnendem Ikterus simplex, zur Rollkur bei Ulcus ventric. Erwachsene 3-4 mal täglich 20 Tropfen, Kinder 3-4 mal täg- lich 5-15 Tropf. Bei akutem Brechdurchfall Dosis am 1. Tage verdoppeln. Mit je 1 Eßlöffel Kamillen-, Pfefferminz- oder schwarzem Tee, Suppe etc. Zur Rollkur: 40 Tropfen in 1/2 Tassenkopf warmen Wassers lösen. 1 Stunde vor dem Früh- stück trinken. Tropfflasche mit ca. 20 g DM 1,— VEB Serum-Werk Dessau		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller

Gastrosecrin „Neutral“		(43 26 19 00)	A VVT 03/203
Bestandteile	Biologisch gewonnene Aminosäuren und Polypeptide mit etwa 25 % Kochsalz.		
Indikation	Zur Anregung der Magensaftsekretion, bei Subacidität, latenten Eiweißmangelschäden u. allgemein. Appetitlosigkeit.		
Dosierung	1-2 Dragees 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten.		
Handelsform und Preise	Glas mit 40 Dragees	DM 1,70	
	Klinikpackung mit 400 Dragees	DM 10,65	
Hersteller	VEB Promassol-Werk, Erfurt		
Gastrosecrin „Sauer“		(43 26 19 00)	A VVT 03/213
Bestandteile	Biologisch gewonnene Aminosäuren unter Zugabe von Betain-Chlorhydrat, entsprechend etwa 25 mg Acid. hydrochl. pro Tabl. 5 Tabl. ersetzen 1 ccm=20 Tropfen Acid. hydrochl. dil.		
Indikation	Zur Anregung der Magensaftsekretion mit gleichzeitiger Salzsäure-Substitution, bei chronischer Achylie und begleitenden dyspeptischen Beschwerden, bei starkem Meteorismus, achyl. Diarrhöen, chron. Cholecystitis sowie nach Magenresektionen.		
Dosierung	1-2 Dragees 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten.		
Handelsform und Preise	Glas mit 40 Tabl. zu 0,25 g	DM 1,85	
	Klinikpackung mit 400 Tabl.	DM 12,10	
Hersteller	VEB Promassol-Werk, Erfurt		
Gastro-Sil		(43 26 11 00)	A VVA 01/205
Bestandteile	Calciumsilikat in Gelform, DRP 570 856.		
Indikation	Hyperacidität, Hypersekretion, Hypermotilität, Ulcus ventriculi et duodeni, Gastritis, Gastro-Enteritis, Nachbehandlung von operierten Ulcuskranken, Herabsetzung des Vagus-Tonus. Zur ursächlichen Behandlung: durch Erhöhung d. Serumkalkspiegels.		
Dosierung	Vor, ggf. auch nach den Mahlzeiten 1-2 Teelöffel in Flüssigkeit gut verrührt. Die Dosis kann n. Bedarf beliebig erhöht werden.		
Handelsform und Preise	Karton mit 50 g	DM 1,30	
	Klinikpackung mit 1000 g	DM 16,—	
Hersteller	VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		

(43 26 32 00)	ARp VVA 01/206	Gastro-Sil „B“
<p>Tabl. mit je 0,5 g Gastro-Sil u. 0,015 g Bellad.-Extrakt (an Gastro-Sil adsorbiert).</p> <p>Zur Einleitung oder Ergänzung der Gastro-Sil-Kur, insbesondere zur raschen Beseitigung der Schmerzen und Spasmen bei Hyperacidität, Ulcus usw.</p> <p>3 mal täglich 1 Tabl.</p> <p>Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,5 g DM 1,— Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu 0,5 g DM 26,55</p> <p>VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 21 21 00)	ARp VVP 07/226	Gecobrol (z. Zt. beschränkt lieferbar)
<p>Natr. bromat. 5,0, Natr. monomethylarsenicic. 0,0075, Natr. diaethylbarbituric. 1,0, Extr. Humuli lupuli fl. 2,0, Lecithin 0,1, Sacch., Spirit., Aqua ad 100,0</p> <p>Sedativum und mildes Hypnoticum, 1-3 mal täglich 1 Teelöffel voll.</p> <p>Flasche mit 250 g DM 2,65</p> <p>VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
43 26 41 00)	A VVP 07/227	Gecolax-Dragees
<p>Extr. Frang. aq. sicc. 0,16, Extr. Rhei aq. sicc. 0,05, Extr. Alyp. fol. aq. sicc. 0,03 pro Dragee.</p> <p>Rein pflanzliches Abführmittel.</p> <p>Morgens nüchtern 2-4 Dragees mit einem Schluck Wasser zu nehmen.</p> <p>Schachtel mit 30 Dragees DM 0,75 Klinikpackung mit 500 Dragees DM 5,45</p> <p>VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 23 29 00)	ARp VVP 07/223	Gecopulmin (z. Zt. nicht lieferbar)
<p>Chinin. bas. puriss. 0,3, Camph. 12,0, Ol. Tereb. birectif. 10,0, Ol. ped. tauri pro inj. 77,7</p> <p>Bei Pneumonien und Grippe-Pneumonien. Zur intraglutaeealen Injektion.</p> <p>Schachtel mit 3 Amp. zu 1,2 ccm DM 1,50 Schachtel mit 10 Amp. zu 1,2 ccm DM 4,40</p> <p>VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>

Gelonida Aluminium subacetici		(43 26 64 00)	A G 03/200
Bestandteile	Basisches Aluminiumacetat 0,9, Aluminiumsulfat 0,1		
Indikation	Bei Oxyuriasis.		
Dosierung	3-5 mal 1 Stück tägl.; für Kinder unter 8 Jahren halbe Dosen.		
Handelsform und Preise	Packung mit 30 Tabl. zu 1,1 g . . . DM 1,55		
Hersteller	Gödecke & Co., Chem. Fabr. in Verwaltung, Teltow b. Berlin		
Gelonida antineuralgica		(43 21 39 00)	ARp G 03/201
Bestandteile	Codein. phosphor. 0,01, Acetylsalicylsäure 0,25, Phenacetin 0,25		
Indikation	Bei Grippe, Erkältungskrankheiten, Pneumonie, Myalgie, Neuralgien, rheumatischen Erkrankungen, Dysmenorrhoe.		
Dosierung	2-4 mal täglich 1-2 Tabl.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 10 Tabl. zu 0,6 g . . . DM 0,80 Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,6 g . . . DM 1,35 Klinikpackung mit 100 Tabl. zu 0,6 g . . . DM 5,—		
Hersteller	Gödecke & Co., Chem. Fabr. in Verwaltung, Teltow b. Berlin		
Gelonida stomachica		(43 26 19 00)	ARp G 03/202
Bestandteile	Extract. belladonnae 0,01, Bismut. subnitric. 0,2, Magnesia usta 0,6		
Indikation	Bei Hyperacidität und Hypersekretion, Gastritis, Ulcus ventriculi et duodeni, spastischen Zuständen des Magens und Darms; Nachbehandlung von Magenoperierten.		
Dosierung	3-4 mal täglich 1-2 Tabl.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Tabl. zu 1,16 g . . . DM 1,25		
Hersteller	Gödecke & Co., Chem. Fabr. in Verwaltung, Teltow b. Berlin		
Gentiaeverm		(43 26 69 00)	A VVP 13/216
Bestandteile	Penta- und Hexamethyl-derivate des p-Rosanilins.		
Indikation	Anthelminticum gegen Oxyuren (Madenwürmer).		
Dosierung	Im allgemeinen ist eine 3-Tage-Kur vorgesehen. In besonders hartnäckigen Fällen kann die Therapie einige weitere Tage fortgesetzt oder nach einer Pause von 14 Tagen eine Wiederholungskur vorgenommen werden. Dosierungsschema für die 3-Tage-Kur: Kinder bis 3 Jahre täglich 1 Dragee, Kinder von 3-10 Jahren täglich 2 mal 1 Dragee, Kinder über 10 Jahre täglich 3 mal 1 Dragee, Erwachsene (und Kinder über 15 Jahre) täglich 3 mal 2 Dragees jeweils gut eine Stunde vor den Mahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit nehmen.		
Handelsform und Preise	Packung mit 20 Dragees zu je 0,06 g . . . DM 0,80 Klinikpackg. m. 250 Dragees z. je 0,06 g DM 5,30		
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		

(43 29 12 00)	A S 10/256	Glisitol (z.Zt.beschränkt lieferbar)
Fel tauri 0,3, Extr. Rhei fluid. 4,0, Oleum Menthae plp. 0,1, Glycerinum 33,0, Berberis i. h. V. 10,0, Sirup. simplex ad 100,0		Bestandteile
Grieß- und Gallensteinbildung.		Indikation
3 mal täglich kurz nach den Mahlzeiten 1 Eßlöffel voll in 1/4 Ltr. heißem Wasser gelöst zu nehmen.		Dosierung
Flasche mit ca. 120 g DM 1,20		Handelsform und Preise
Flasche mit ca. 300 g DM 2,45		
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 27 53 00)	A VVP 01/205	Globinal
Pulver aus 60 % Globin (Albumin aus Haemoglobin) und 40 % Saccharose.		Bestandteile
Zur Substitution hochwertiger Aminosäuren bei alimentären Eiweißmangelzuständen, Eiweißverlusten durch Blutverluste, Eiterungen, Infektionskrankheiten, bei endokrinen Störungen, zur Vor- und Nachbehandlung bei Operationen, als Zusatzkost für Schwerkranke und Rekonvaleszenten.		Indikation
Bei hochgrad. Eiweißmangel täglich 5 gestr. Eßlöffel, leichteren Formen täglich 30 g vor dem Essen auf 5 Mahlzeiten verteilt mit Wasser oder Fruchtsaft angerührt nehmen.		Dosierung
Packung mit ca. 250 g DM 3,75		Handelsform und Preise
VEB Serum-Werk Dessau		Hersteller
(43 27 11 00)	A VVP 09/205/206/207	Glykofrukton
Gemisch gleicher Teile Trauben- und Fruchtzucker 10-, 25- und 40 %ige Lösungen.		Bestandteile
Herzschwäche und Kreislaufkollaps (auch zur Strophantimischspritze), Leberschäden, als entgiftendes Mittel, Erbrechen und Durchfälle mit starken Flüssigkeitsverlusten, Niereninsuffizienz, Blutungen, Insulinschock, Mastkuren.		Indikation
In gleicher Weise wie Trauben- und Fruchtzucker dosieren, also je nach Lage des Falles 10-20 ccm der 10-40 %igen Lösung mehrmals am Tage intravenös.		Dosierung
Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm 10 % DM 1,75		Handelsform und Preise
Klinikpckg. m. 50 Amp. z. 10 ccm 10 % DM 13,90		
Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm 25 % DM 1,95		
Klinikpckg. m. 50 Amp. z. 10 ccm 25 % DM 15,—		
Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm 40 % DM 2,05		Hersteller
Klinikpckg. m. 50 Amp. z. 10 ccm 40 % DM 16,25		
VEB Jenapharm, Jena		

Glykokoll „Fahlberg“		(42 37 42 00)	A VVOr 02/508
Bestandteile	Acid. aminoacetic. Erg. B. 6		
Indikation	Muskelkrankungen, insbesondere bei progressiver Muskeldystrophie, Myasthenie, Myotonia congenita.		
Dosierung	3 mal täglich 5 g (=1½ gestrichener Eßlöffel) in Mahlzeiten verrührt oder in Getränken gelöst einnehmen.		
Handelsform und Preise	Karton mit 100 g	DM 10,45	
	Karton mit 500 g	DM 41,80	
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		
Glykokoll „Chemidropa“		(43 12 00 00)	A VVP 05
Bestandteile	Acid. aminoacetic. Erg. B. 6		
Indikation	Muskelkrankungen, besonders bei progressiver Muskeldystrophie, Myasthenie, Störungen im Kreatinstoffwechsel, Eiweißmangelschäden, Erschöpfungszuständen.		
Dosierung	Wenn nicht anders verordnet, 3 mal täglich ca. 5 g, in Getränken gelöst oder in Mahlzeiten verrührt, einnehmen.		
Handelsform und Preise	Karton mit 100 g	DM 10,45	
	Karton mit 500 g	DM 41,80	
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk, Chemnitz		
Glykolan-Salbe		(43 29 90 00)	A VVP 05/215
Bestandteile	Glykokoll 10,0, Calciumcarbonat 10,0, Salbengrundlage auf Wollfettbasis 80,0		
Indikation	Heilsalbe zur Gewebeerneuerung.		
Dosierung	Mehrere Male am Tage auf die Wundstellen auftragen; Behandlung bis zur Abheilung gleichbleibend fortsetzen. In jedem Falle ist eine vorsichtige Dosierung angebracht, um den Heilungsprozeß kontinuierlich zu fördern. Ein Gewebeerlust von 1 ccm erfordert etwa 0,1 g Glykokollgabe, die auf mehrere Tage verteilt werden soll.		
Handelsform und Preise	Tube mit ca. 35 g	DM 1,75	
	Klinikpackung mit ca. 500 g	DM 7,64	
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		
Glykopud		(43 29 90 00)	A VVP 05/200
Bestandteile	Glykokoll 10,0, Calciumcarbonat 10,0, Talcum 80,0		
Indikation	Steriler Heilpuder zur Gewebeerneuerung.		
Dosierung	Dosierung wie vorstehend.		
Handelsform und Preise	Schraubglas mit ca. 15 g	DM 1,80	
	Klinikpackung mit ca. 200 g	DM 5,—	
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		

(43 29 90 00)	A VVP 05/216	Glykosal-Tabletten
<p>Glykokoll 50,0, Calc. phosphor. 35,0, Corrig. 15,0 Zur Therapie von Stoffwechselstörungen, vor allem zur Behandlung von Muskeldystrophie, Haemostypticum. Dosierung nach ärztlicher Verordnung. Packung mit 25 Tabl. zu 1 g (1 Tabl.=0,5 g Glykokoll) DM 2,90 Klinikpackung mit ca. 500 Tabl. zu 1 g DM 23,75 VEB Chemidropa-Werk Chemnitz</p>		<p>Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller</p>
(43 23 29 00)	ARp VVP 04/207	Guajektol
<p>Guajacol. 0,075, Natr. salicyl. 0,24, p-Aminobenzoyldiaethylaminoethanol 0,0015, I-Ascorbinsäure 0,0015 Spezificum bei akuten u. chronischen katarrhalisch-entzündlich-infektiösen Erkrankungen d. Respirationstraktes, Asthma bronchiale. 1-2 Amp. täglich. Schachtel mit 5 Amp. zu 1 ccm DM 1,88 Schachtel mit 100 Amp. zu 1 ccm DM 21,86 VEB Pharm. Werk Oranienburg</p>		<p>Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller</p>
(43 22 45 00)	A VVP 14/223	Guttajod
<p>Labile Jodverbindung mit 0,5 mg Jod pro Dragee. Prophylacticum bei Schnupfen, zur internen Jodtherapie, bei Arteriosklerose und Hypertonien, bei Unterfunktion der Schilddrüse. 3 mal täglich 2 Stück; als Prophylacticum 1-2 Stück täglich. Dose mit 30 Dragees DM 0,84 Dose mit 100 Dragees DM 2,65 VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal</p>		<p>Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller</p>
(43 27 21 00)	VVP 14/216	Haematogen „Sicco“
<p>Haemoglobin 50 %, Saccharum 45 %, Aromatica 0,13 % Bei Anaemien, Stoffwechselstörungen, zur Rekonvaleszenz, gegen alle Schwächezustände, besonders bei Lungenkrankheiten, Rachitis. 3 mal täglich 1 Eßlöffel. Flasche mit 250 g DM 1,43 und Spirit.-Zuschiag DM 0,06 VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal</p>		<p>Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller</p>

Haemostypt „Dessau“		(43 45 90 00)	ARp VVP 01/202
Bestandteile	Thrombokinase entbindendes Blutstillungsmittel aus Schlangengiften mit 0,009 mg/ccm Toxin, konserviert, staatl. gepr., 2 Jahre verwendbar.		
Indikation	Parenteral und lokal bei Blutungen nach Verletzungen und Operationen, inneren Blutungen, Blasen- u. Haemorrhoiden-Blutungen, bei pathologischer Blutungsbereitschaft, blutigen Durchfällen und haemorrhagischen Diathesen.		
Dosierung	Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Amp.-Flasche mit 25 ccm	DM 2,05	
	Karton mit 5 Amp. zu 10 cm	DM 4,20	
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau		
Hamamelis-Salbe		(43 29 12 00)	A VVP 10/220
Bestandteile	Extr. Hamam. 10 % 10,0, Echin. ext. 5,0, Saibengrundlage ad 100,0		
Indikation	Bei oberflächlichen Wunden, Haemorrhoiden u. für die Kinderpraxis.		
Handelsform und Preise	Packung mit 30 g	DM 0,80	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Hamamelis-Suppositorien		(43 29 12 00)	A VVP 10/h
Bestandteile	Extr. Hamamel. 10,0, Massa Supp. ad 100,0		
Indikation	Bei Haemorrhoiden.		
Dosierung	Täglich 2-3 Zäpfchen.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 6 Supp.	DM 0,90	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Hamelogran-Salbe		(43 29 12 00)	A S 10/257
Bestandteile	Extract. Hamamel. 20,0, Ol. Jecoris Aselli 27,5, Corrig. 0,25, Saibengrundlage 52,25		
Indikation	Epithelisierende Wund- und Brandsalbe.		
Dosierung	Salbe in dicker Schicht auftragen.		
Handelsform und Preise	Tube mit ca. 20 g	DM 0,65	
	Kruke mit ca. 50 g	DM 1,15	
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		

(43 29 12 00)	A S 10/258	Hametum-Extrakt
Destillat aus Folia Hamamelidis.		Bestandteile
Haemorrhoiden, Varizen, venöse Blutungen, Nasenbluten, äußerlich und innerlich.		Indikation
Innerlich: 3 mal täglich 1/2 Teelöffel voll, bei Blutungen häufiger, bis zu 1/4 stündl. zu nehmen.		Dosierung
Äußerlich: Unverdünnt einzureiben; bei verletzter Haut 1:3 mit Wasser verdünnt zu Umschlägen.		
Flasche mit ca. 30 ccm DM 0,60		Handelsform und Preise
Flasche mit ca. 50 ccm DM 0,95		
Flasche mit ca. 100 ccm DM 1,60		
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/259	Hametum-Fettpuder
Extr. Hamamel. fld. e cort. paratum 0,5, Acid. phenylcarbonic. 1,0, Vasel. 2,0, Zinc. oxyd. 16,0, Ol. Lavand. artif. 0,03, Talc. ad 100,0		Bestandteile
Wundsein der Haut, Hyperhidrosis und Intertrigo.		Indikation
Als Streupuder.		
Streudose ca. 90 g DM 0,55		Handelsform und Preise
Nachfüllbeutel ca. 125 g DM 0,55		
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/260	Hametum-Salbe
Spezialdestillat aus Hamamelis virginiana 25,0, Salbengrundlage.		Bestandteile
Haemorrhoiden, oberflächliche Hautdefekte, Wund- und Kindersalbe.		Indikation
Äußere Haemorrhoiden gut mit der Salbe einfetten, bei inneren Haemorrhoiden Tube mit Kanüle verwenden. Sonst messerrückendick auftragen.		Dosierung
Kruke mit ca. 25 g DM 0,80		Handelsform und Preise
Kruke mit ca. 50 g DM 1,25		
Kruke mit ca. 100 g DM 2,05		
Kruke mit ca. 250 g DM 4,05		
Tube mit ca. 20 g DM 0,75		
Tube mit ca. 35 g DM 1,10		
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller

Hatussin (43 23 14 00) ARp VVP 05/204	
Bestandteile	Auszüge aus Herba Thymi, Plantaginis, Galeopsidis 48,7, Ammon. chlorat. 0,4, Ammon. bromat. 0,6, Bromoform 0,1, Nipagin 0,2, Sacch. crist. 50,0
Indikation	Bronchitis, Pertussis.
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 180 g DM 1,45 Klinikpackung mit ca. 1150 g DM 4,50
Hersteller	VEB Chemidropha-Werk Chemnitz
Helpin (43 27 59 00) A VVP 06/206	
Bestandteile	Sterile Phosphatidemulsion in Verbindung mit wirkungssteigernden Elektrolyten.
Indikation	Roborans, Tonikum.
Dosierung	1-2 Amp. intramuskulär täglich oder übertäglich.
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Amp. DM 2,75 Klinikpackung mit 100 Amp. DM 19,34
Hersteller	VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau
Hepartonyl forte (43 27 26 00) ARp VVS 01/210	
Bestandteile	Hochkonzentrierter Leberextrakt.
Indikation	Zur Behandlung der Anaemia perniciosa und der übrigen Indikationen der Lebertherapie.
Dosierung	Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.
Handelsform und Preise	Schachtel mit 3 Amp. zu 2 ccm DM 8,05 Schachtel mit 6 Amp. zu 2 ccm DM 14,55 Schachtel mit 50 Amp. zu 2 ccm für Kliniken DM 73,25 für Private DM 82,40
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul
Hexamethylenstramin Tabletten 0,5 (43 24 61 00) A VVP 07/511	
Indikation	Cystitis, Pyelitis, Bakteriurie.
Dosierung	3 mal täglich 1 Tablette
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Tabletten DM 0,35
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul

(43 14 90 00)	VVT 02/771	Hoffmannstropfen DAB 6
<p>Spiritus 3 Teile, Aether sulf. 1 Teil. Krampfhaftes Beschwerden, Ohnmachtsanfälle. Jeweils 15-20 Tropfen einzunehmen. Flasche mit ca. 30 ccm DM 0,68 und Spir.-Zuschlag DM 0,17 VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.</p>		<p>Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller</p>
(43 29 11 00)	A S 10/h	Homöopathie
<p>Urtinkturen, Dilutionen, Tabletten, Triturationen, Globuli nach Vorschrift des HAB, Ampullen-Collo-Präparate. Sonderverzeichnis bitte anfordern. VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig</p>		
(43 41 90 00)	ARp VVP 01	Homopuran
<p>Gereinigtes, konzentriertes Retroplazentarseserum, polyvalentes, arteigenes Serum. Mit 0,09% eines chlorierten Phenolhomologen konserviert. Staatl. geprüft, 5 Jahre verwendbar.</p> <p>Zur Umstimmungstherapie bei: Infektionskrankheiten (Masern, Scharlach, Katarrhen, Bron- chitiden). Intoxikationen: Multiple Sklerose, toxische Diphtherie, Ad- nexitiden, Graviditätsstoxikosen, Encephalitis, Nephritis, Peritonitis. Hauterkrankungen: Furunkulose, Akne, Dermatosen, Ekzeme. Organische Krankheiten: Gastritis, Ulcus ventr. et duodeni, angiospastische Zustände, stenokardische Beschwerden; hartnäckigen allergischen Zuständen einschl. Bronchial- asthma. Bei Hyperemesis, Graviditätsdermatosen, Menstruations- störungen, Enuresis noct. Als Eiweißsubstituens bei: Eiweiß- mangelschäden, Resistenz gegen Arznei- und Heilfieber- mittel. Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.</p> <p>Karton mit 5 Amp. zu 2 ccm DM 5,20 VEB Serum-Werk Dessau, Dessau</p>		<p>Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller</p>

Homoseran (43 41 90 00) ARp VVP 01	
Bestandteile	Serumkonserven aus Retroplazentarblut gesunder Mütter, klinisch auf Verträglichkeit geprüft, konserviert, 5 Jahre verwendbar.
Indikation	Zur Auffüllung der Blutstrombahn an Stelle von Vollblut, zur Substitution arteigenen Serumeiweißes, bei Verbrennungen, Nieren- und Leberkrankheiten, alimentärer Dystrophie usw. Zur Prophylaxe und Therapie bei Masern, Scharlach und anderen Infektionskrankheiten. Zur Therapie von Säuglingstoxikosen (auch oral). Zur Umstimmungstherapie bei Furunkulose, Dermatosen, hartnäckigen Ekzemen, Pruritus, Magengeschwüren, Gastritiden, Nephritis, toxischer Diphtherie (neben antitoxischem Immuserum), stenokardischen Beschwerden, Rückenmarksquerschnittslähmungen, multipler Sklerose, hormonalen Störungen, besonders in der Pubertät und im Klimakterium, Enuresis usw.
Dosierung	Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.
Handelsform und Preise	Karton mit 1 Amp. zu 10 ccm DM 1,70 Karton mit 5 Amp. zu 10 ccm für Kliniken DM 6,55 für Private DM 6,90
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau, Dessau

Hypophysis pars anterior-Dragees (43 22 29 00) ARp VVP 07/246	
Bestandteile	Hypophysen-Vorderlappen-Präp. 1 Dragee = 0,3 g Frischdrüse.
Indikation	Gegen hypophysär bedingte Wachstums- und Stoffwechselstörungen, z. B. Zwergwuchs, Infantilismus, Dystrophia adiposogenitalis, Kryptorchismus, Oligo- und Amenorrhoe Jugendlicher, Oligo- und Aspermie.
Dosierung	2-3 mal täglich 1-2 Dragees.
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Dragees DM 4,05
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul

(43 22 61 00)	ARp VVS 01/213	Hypostin
Hypophysen - Hinterlappen - Extrakt. 1,1 ccm Hypostin enthält 3 VE.		Bestandteile
Zur Intramuskulären und intravenösen Injektion bei primärer und sekundärer Wehenschwäche, atonischen Nachblutungen, Darmatonie, Kollaps, Diabetes insipidus. *		Indikation
Zur Einleitung der Geburt 1 ccm i. m., evtl. Wiederholung der Dosis. Die Einzeldosen können auch fraktioniert in 1/2 stündlichen Intervallen injiziert werden.		Dosierung
Zur Behandlung der atonischen Nachblutungen evtl. 1 ccm i. v.		
Zur Behandlung der Darmatonie und der übrigen Indikationen 1-2 ccm i. m.		
Schachtel mit 3 Amp. zu 1,1 ccm . . . DM 1,65		Handelsform und Preise
Schachtel mit 6 Amp. zu 1,1 ccm . . . DM 2,85		
Schachtel mit 20 Amp. zu 1,1 ccm . . . DM 8,20		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 22 61 00)	ARp VVS 01/214	Hypostin forte
Hypophysen - Hinterlappen - Extrakt. 1,1 ccm Hypostin forte enth. 10 VE.		Bestandteile
Indikation und Dosierung wie vorstehend.		Indikation
Schachtel mit 3 Amp. zu 1,1 ccm . . . DM 4,30		Handelsform und Preise
Schachtel mit 20 Amp. zu 1,1 ccm . . . DM 21,40		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 28 11 00)	A VVP 05/347	Ichthyoisalbe 20 % (W. Z.)
Zur Wundbehandlung.		Indikation
Tube mit ca. 20 g DM 0,85		Handelsform und Preise
VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		Hersteller
(43 29 90 00)	ARp VVP 07/259	Indigocarmin 0,4 %
Zur Prüfung der Nierenfunktion.		Indikation
1 Ampulle zur i. v. Injektion		Dosierung
Schachtel mit 5 Amp. zu 5,5 ccm . . . DM 2,45		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 30 Amp. zu 5,5 ccm . . . DM 11,35		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Influvit-Tabletten		(43 29 12 00)	A S 10/261
Bestandteile	Spezialauszug aus: Eupator. perfoliat 3,0, Hom. trit. colloid. stabil. von: Ferrum phosph. 10,0, Hom. Trit. von: Gelsemium 10,0, Kalium phosph. 10,0, Sacch. album ad 100,0.		
Indikation	Grippe und grippöse Katarrhe.		
Dosierung	2 stündlich, in schweren Fällen 1 stündlich, 1-2 Tabletten.		
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 40 Tabletten . . . DM 0,75 Packung mit ca. 80 Tabletten . . . DM 1.20		
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Inhale (z.Zt.beschränktlieferbar)		(43 23 52 00)	A VVP 07/232
Bestandteile	Ol. Pini pumil. 4,0, Menthol. 1,0, Camph. 2,0, Ol. Thymi 2,0, Paraffin. liq. 70,0, Ol. Tereb. rect. 10,0, Ol. ped. Tauri 9,5, Ephedrin-basic. 0,5, Ol. Eucal. 1,0		
Indikation	Zum Inhalieren.		
Dosierung	Unverdünnt mittels Zerstäuber zu vernebeln.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 25 ccm DM 1,40		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Instillo (z.Zt.beschränktlieferbar)		(43 23 62 00)	A VVP 07/233
Bestandteile	Ol. Pini pumil. 0,5, Ephedrin 0,5, Menthol. 0,5, Camph. 0,5, Ol. Eucalypti 0,5, Ol. Ricini 0,5, Paraff. liq. 97,0.		
Indikation	Nasentropfen.		
Dosierung	Einige Tropfen in die Nase einführen.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 10 ccm DM 1,15		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Insulin „Degewop“		(43 22 11 00)	ARp VVP 13/212
Bestandteile	Inselhormon des Pankreas.		
Indikation	Diabetes mellitus.		
Handelsform und Preise	Flasche zu 10 ccm mit 400 IE DM 8,55		
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		

(43 22 12 00)	ARp VVP 13/213	Neo-Insulin „Degewop“
Depot-Insulin mit eiweißfreiem körpereigenem Depot-Prinzip. Diabetes mellitus. Flasche zu 10 ccm mit 400 IE DM 8,55 VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller
(43 22 12 00)	ARp VVP 13/224	P.Z.-Insulin „Degewop“
Protamin-Zink-Insulin Depot-Prinzip. Diabetes mellitus. Flasche zu 10 ccm mit 400 IE DM 8,55 VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller
(43 45 90 00)	ARp VVP 02	Intestolysin
Polyvalente Bakteriophagen. Staatl. gepr. zur Prophylaxe und Therapie bei allen Infek- tionen des Magen-Darm-Kanals. Karton mit 5 Amp. zu je 5 ccm . . . DM 3,20 VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller
(43 28 11 00)	A VVSx 03/206	I.O.-Syn
Synthetisches Schwefelpräparat auf Fettbasis mit etwa 15% or- ganisch-gebundenem Schwefel. Antiphlogisticum Antisepticum . Dermatosen, Entzündungen, Frostschäden, Furunkulose. Glas mit ca. 30 g DM 1,17 Glas mit ca. 50 g DM 1,76 Klinikpackung mit ca. 1000 g für Private DM 27,81 für Kliniken DM 24,72 VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller

Isotonal (43 28 18 00) A VVP 09/200	
Bestandteile	Sterile gepufferte isotonische Lösung der Blutsalze.
Indikation	Als Blutersatzflüssigkeit zur Injektion bei Blutverlusten, Verbrennungen, Austrocknungserscheinungen und Schockzuständen. Kann praktisch in unbegrenzten Mengen infundiert werden.
Handelsform und Preise	Ampulle zu 250 ccm DM 3,50 Ampulle zu 400 ccm DM 4,15
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena
Jecoffin (43 28 31 00) ARp VVP 09/232	
Bestandteile	Jenacain (p - Aminobenzoyldiaethylaminaethanolhydrochlorid DAB 6) 0,02 g, Coffein (1, 3, 7-Trimethyl-2, 6-Dioxypurin DAB 6) 0,015 g wässrige Lösung ad 1 ccm.
Indikation	Zur Heilanalgesie: Zur Schmerzbekämpfung bei rheumatischen Erkrankungen, Neuritis, Neuralgie, Myalgie, Lumbago, Gefäßspasmen und juckenden Hauterkrankungen, Kopfschmerz, Migräne, Asthma bronchiale, Ulcus ventriculi und duodeni.
Dosierung	1-2-5 ccm subkutan oder intramuskulär zur Infiltrierung schmerzhafter Bezirke. Bei intravenöser Anwendung werden 1-2 ccm sehr langsam, im Höchsfalle 5 ccm (etwa 1 ccm pro Minute) injiziert.
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Amp. zu 2 ccm DM 3,00 Packung mit 10 Amp. zu 5 ccm DM 6,00 Klinikpackung mit 100 Amp. zu 2 ccm DM 22,50
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena
Jecortannat (Leberöl-Tannin-Salbe) (43 28 17 00) A VVP 15/221	
Bestandteile	Vasenol-Lipoid-Tannat 18,0, Öl. Jecoris Aselli 18,0, Zinc. oxyd. 3,0, Salbengrundlage 61,0
Indikation	Frische Verbrennungen aller Grade.
Handelsform und Preise	Glasdose mit 100 g DM 3,40 Klinikpackung mit 500 g DM 7,60
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig

(43 28 31 00)	Jenacain zur Lokalanaesthesie
(p-Aminobenzoyldiaethylaminoethanolhydrochlorid DAB 6)	Bestandteile
Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.	Dosierung
1/2 ⁰ /oige Lösung + Adrenalin 0,0005% ARp VVP 09/201	Handelsform und Preise
Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm DM 3,00	
1 ⁰ /oige Lösung + Adrenalin 0,0025% ARp VVP 09/212	
Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm DM 3,60	
2 ⁰ /oige Lösung + Adrenalin 0,005% ARp VVP 09/202	
Packung mit 10 Amp. zu 2 ccm DM 2,60	
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 2 ccm DM 14,65	
2 ⁰ /oige Lösung + Adrenalin 0,0025% (adrenalin schwach)	
ARp VVP 09/238	
Packung mit 10 Amp. zu 2 ccm DM 2,60	
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 2 ccm DM 14,65	
4 ⁰ /oige Lösung + Adrenalin 0,005% ARp VVP 09/203	
Packung mit 10 Amp. zu 2 ccm DM 2,70	
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 2 ccm DM 17,90	
4 ⁰ /oige Lösung + Adrenalin 0,0025% (adrenalin schwach)	
ARp VVP 09/239	
Packung mit 10 Amp. zu 2 ccm DM 2,70	
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 2 ccm DM 17,90	
VEB Jenapharm, Jena	Hersteller

(43 28 31 00) ARp VVP 09/208/209	Jenacain zur Heilanalgesie
Jenacain 0,01 g bzw. 0,02 g, Isotonal ad 1 ccm.	Bestandteile
Zur Grenzstrangblockade, Gewebsinfiltration, bei Schmerz-	Indikation
zuständen aller Art, auch intravenös bei Neuritis, Neuralgie,	
Asthma bronchiale, Ischias, Ulcus ventriculi und Entzündungs-	
schmerz.	
Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.	Dosierung
Packung mit 10 Amp. zu 2 ccm	Handelsform und Preise
1 ⁰ /oige Lösung DM 2,40	
Packung mit 10 Amp. zu 5 ccm	
1 ⁰ /oige Lösung DM 3,60	
Packung mit 10 Amp. zu 2 ccm	
2 ⁰ /oige Lösung DM 2,60	
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 2 ccm	
2 ⁰ /oige Lösung DM 14,65	
Packung mit 10 Amp. zu 5 ccm	
2 ⁰ /oige Lösung DM 4,35	
VEB Jenapharm, Jena	Hersteller

Jenacillin A			
Depot-Penicillin Jenapharm	(43 25 11 00)	A VVP 09/229	
Bestandteile	Kristallines Jenacain-Penicillin G 1 500 000 IE Penicillin G Natriumsalz 500 000 IE zur Herstellung einer wässrigen Suspension.		
Indikation	Zur kombinierten Stoß- und Depotbehandlung bei allen auf Penicillin ansprechenden Infektionskrankheiten		
Dosierung	400 000 IE intramuskulär für Erwachsene (Wirkung hält 12 bis 24 Stunden an).		
Handelsform und Preise	Flasche zu 2 000 000 IE DM 60,00		
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena		
Jenacillin 0			
Depot-Penicillin Jenapharm	(43 25 11 00)	A VVP 09/230	
Bestandteile	Kristallines Jenacain-Penicillin G 3 000 000 IE in 10 ccm Ol. ped. tauri.		
Indikation	Zur Depotbehandlung bei allen auf Penicillin ansprechenden Infektionskrankheiten.		
Dosierung	300 000 IE intramuskulär für Erwachsene (Wirkung hält 24 bis 36 Stunden an).		
Handelsform und Preise	Flasche zu 3 000 000 IE DM 90,00		
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena		
Jobrometten			
	(43 23 27 00)	A VVT 03/225	
Bestandteile	An Eiweiß gebundenes Jod 0,01 g. An Eiweiß gebundenes Brom 0,02 g.		
Indikation	Jod-Depot-Therapeuticum mit zentral-sedativer Wirkung. Bei allen Erkrankungen infolge Jodmangel, Arteriosklerose, Asthma bronchiale.		
Dosierung	3 mal täglich 1-2 Dragees.		
Handelsform und Preise	Packung mit 20 Dragees DM 0,95		
Hersteller	VEB Promassol-Werk, Erfurt		
Jodana-Tinktur			
	(43 28 53 00)	VVP 14/224	
Bestandteile	Komplexe Bromeisenrhodanide 6,2%, methyl. Halogenphenole 2,5% in alkoholischer Lösung.		
Indikation	Oberflächen-Desinfiziens an Stelle von Jodtinktur.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 10 ccm DM 0,48 Flasche mit 50 ccm DM 0,96 Flasche mit 250 ccm DM 3,85 Flasche mit 1000 ccm DM 12,84		
Hersteller	VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		

(43 21 61 00)	VVP 04/204	Jodisal-Salbe
Kal. jodat. 3%, Acid. salicyl. 2,5%, Camphora 5%, Ol. aether. 2,5%, Salbengrundlage ad 100%.		Bestandteile
Bei chronisch-entzündlichen Affektionen verschiedener Art, Pleuritis, Bronchitis, Arthritis. Zur perkutanen Jod-Campher-Salicyl-Therapie.		Indikation
Die betroffenen Stellen gut einreiben und abdecken.		
Tube mit ca. 50 g DM 1,15		Handelsform und Preise
VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/263	Jorondellen
Perlen mit 0,05 mg Jod, 0,5 mg Kal. jodat., 0,01 mg Oleum Eucal., 0,03 mg Menthol. (n. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Bier †)		Bestandteile
Zur allgem. Jodtherapie, Struma, Arteriosklerose, Schnupfen und Erkältungskrankheiten.		Indikation
Bei beginnendem Schnupfen stündl. 1 Perle im Munde zergehen lassen. Zur allgemeinen Jodtherapie täglich 1 Perle nehmen.		Dosierung
Packung mit ca. 32 Perlen DM 0,55		Handelsform und Preise
Packung mit ca. 90 Perlen DM 1,30		
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 23 13 00)	A VVT 02/203	Junicosan
Extr. Juniperi conc. 5%, Sir. Amyli 25,5%, Kal. sulfogujacol. 5%, Saccharum 30,5%, Aromatica 0,15%, Aqua dest. ad 100%.		Bestandteile
Bei akuten und chronischen katarrhalischen Erkrankungen.		Indikation
Erwachsene täglich 3-6, Kinder 1-3 Teelöffel voll unverdünnt.		Dosierung
Flasche mit ca. 155 g DM 1,25		Handelsform und Preise
VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür		Hersteller
(43 21 19 00)	ARp VVA 01/230	Kalypnon
Aethylcrotylbarbitursäure.		Bestandteile
Hypnoticum.		Indikation
Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		Dosierung
Schiebeschachtel m. 10 Tabl. zu 0,25 g DM 1,65		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 100 Tabl. zu 0,25 g DM 10,55		
VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		Hersteller

Kamilliquid		(43 29 39 00)	A VVP 07/234
Bestandteile	Kamillen-Fluidextrakt mit 1 ⁰ / ₄ Chlorthymol.		
Indikation	Mildes Desinfiziens zum Gurgeln und Spülen.		
Dosierung	Unverdünnt zu Pinselungen, 1 Teelöffel auf 1 Glas Wasser zum Gurgeln und zu Spülungen.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 50 ccm	DM 1,85	
	+ Spir.-Zuschlag	DM 0,20	
	Klinikpackung mit 1000 ccm	DM 16,00	
	+ Spir.-Zuschlag	DM 4,41	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Kampfer-Spiritus DAB 6		(43 14 90 00)	VVT 02/772
Bestandteile	Camphora 10 0/0, Spiritus 70 0/0 (90 Vol. 0/0), Aqua 10 0/0		
Indikation	Einreibung bei Neuralgie u. Rheumatismus, Verbandflüssigkeit bei noch geschlossenen Frostschäden.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 50 ccm	DM 0,90	
	+ Spir.-Zuschlag	DM 0,23	
	Flasche mit ca. 100 ccm	DM 1,34	
	+ Spir.-Zuschlag	DM 0,46	
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		
Karlsbader Salz		(43 26 44 00)	VVSA 01/202
Bestandteile	Sal. Carolin. factit. DAB 6 pulv.		
Indikation	Laxativum, Cholagogum.		
Dosierung	Als Antacidum: 5-10 g in 250 g Wasser, als Laxativum: 10 g pro dosl.		
Handelsform und Preise	Faltschachtel mit 100 g	DM 0,75	
	(Für Abgabe in loser Form bitte Sonderverzeichniss anfordern)		
Hersteller	VEB Eumarhal-Werk Bernburg		

(43 28 11 00)	A VVP 15/204-206	Karwendolan 10 %, 20 %, 50 %
<p>Karwendol 10,0, 20,0 bzw. 50,0, Vasenol-Lipoid-Salbengrundlage ad 100,0.</p> <p>In schwächeren Konzentrationen: Oberflächige Dermatosen und Wunden, Impetigo contagiosa, Ekzeme, Furunkulose, Arthritiden.</p> <p>In höheren Konzentrationen: Karbunkel, Lymphangitis, Lymphadenitis, Tendovaginitis, Erysipel, Mastitis.</p> <p>Dose mit 30 g 10% DM 0,50 Klinikpackung mit 1 kg 10% DM 3,60 Dose mit 30 g 20% DM 0,70 Klinikpackung mit 1 kg 20% DM 5,20 Dose mit 30 g 50% DM 0,90 Klinikpackung mit 0,5 kg 50% DM 4,70</p> <p>VEB Vasenol-Werk, Leipzig</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 22 92 00)	A VVP 15/200	Karwendol-Globuli 10 %
<p>1 Glob. = 0,25 g Karwendol in 2,5 g Gelatine-Glycerin.</p> <p>Zur Therapie des vaginalen Fluors, bei Kolpitis, Adnexitis, Parametritis usw.</p> <p>Packung mit 10 Stück DM 0,70 Klinikpackung mit 100 Stück DM 3,60</p> <p>VEB Vasenol-Werk, Leipzig</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 24 19 00)	A VVP 15/202-203	Karwendol-Puder 5 % u. 10 %
<p>Karwendol 5,0 bzw. 10,0, Vasenol-Lipoid-Pudergrundlage ad 100,0.</p> <p>5%: Dermatosen, chronische Ekzeme, Pruritus, Epidermophytien, Pityriasis rosea.</p> <p>10%: Wie oben und zur Wundreinigung.</p> <p>Streudose mit 50 g 5% DM 1,15 Klinikpackung mit 1 kg 5% DM 6,00 Streudose mit 50 g 10% DM 1,40 Klinikpackung mit 1 kg 10% DM 7,00</p> <p>VEB Vasenol-Werk, Leipzig</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>

Karwendol-Suppositorien 10 %		(43 26 72 00)	A VVP 15/201
Bestandteile	1 Suppos. = Karwendol 0,25 g, Anaesthesin 0,02 g, Extr. Belladonnae 0,1 mg, Suppos.-Masse 2,23 g.		
Indikation	Haemorrhoidalleiden, Analfissuren, Oxyuren, Prostatitis, Periproktitis, Parametritis und zur Unterstützung der Therapie bei vaginalem Fluor, Kolpitis und Adnexitis.		
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Stück DM 0,95 Klinikpackung mit 100 Stück DM 5,00		
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig		
Kephalosan		(43 21 33 00)	A VVP 14/217
Bestandteile	Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon 41,67%, Analg. coff. citr. 41,44%.		
Indikation	Bei Erkältungskrankheiten, Grippe, Neuralgien, Zahn- und rheumatischen Schmerzen, Muskelkater.		
Dosierung	3 mal 1 Stück täglich.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 10 Tabletten DM 0,53 Röhrchen mit 25 Tabletten DM 1,05		
Hersteller	VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		
Kindernährzucker „Schwan“		(43 27 44 00)	VVM 01/205
Bestandteile	Dextrin 73%, Maltose 18%, Glucose ca. 2,5%, H ₂ O ca. 5%.		
Indikation	Diäteticum für ernährungsgestörte Säuglinge und Kleinkinder.		
Dosierung	Dosierung gem. d. jeder Packung beiliegenden Anweisung.		
Handelsform und Preise	Packung mit 250 g DM 1,70 Packung mit 500 g DM 3,00 lose per kg DM 5,90		
Hersteller	VEB Lactacida, Niederstriegis/Sa.		
Klimaktoplant		(43 29 12 00)	ARp S 10/264
Bestandteile	Cimicifuga Ø 0,5, Fucus ves. Ø 10,0, Ignatia Ø 0,5, Sanguinaria Ø 1,0, Lachesis D5 10,0, Sepia Colloo D2 10,0, Tablettenmasse q. s. ad 100,0.		
Indikation	Praeklimax und klimakterische Vasoneurosen.		
Dosierung	3—4 mal täglich 1—2 Tabletten über einen längeren Zeitraum nehmen.		
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 80 Tabl. zu 0,25 g DM 1,20		
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		

(43 26 53 00)	A VVOr 02/391	Kohle-Tabletten „Fahlberg“
85% Carbo medicin., 15% Trockenpektin.		Bestandteile
Chronische und akute dyspeptische Störungen, infektiöse und toxische Darmerkrankungen, Diarrhoe.		Indikation
Nach Bedarf täglich mehrmals 2—3 Tabletten nehmen und mit Wasser, Kaffeeq o. ä. hinunterspülen.		Dosierung
Schachtel mit 50 Tabl. zu 0,3 g . . . DM 1,00		Handelsform und Preise
VEB Fahlberg-List, Magdeburg		Hersteller
(43 27 59 00)	A VVP 07/236	Kola „Gehe“
Schmackhafte Kola-Täfelchen, Coffeingehalt 0,03 g pro Stück.		Bestandteile
Tonikum.		Indikation
Bei Bedarf 1—3 Tabletten.		Dosierung
Schachtel mit 40 Stück DM 1,80		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 28 52 00)	F 01/201	Kresomerlat
30% Alkylphenole, 40% Paraffinsulfonat, 30% Lösungsvermittler.		Bestandteile
Desinfektion von Wäsche, Stuhl und Urin, Fußböden und Wände der Krankenzimmer und Massenunterkünfte. Außerdem zur Stalldesinfektion bei Geflügel, kleinen und großen Haustieren.		Indikation
Flasche mit 100 ccm DM 0,90		Handelsform und Preise
Flasche mit 500 ccm DM 2,65		
lose in Fässern zu 50, 100 und 200 kg		
VEB Farbenfabrik.Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld		Hersteller

Kyugutt (DRWZ)		(43 25 43 00)	A VVT 03/216
Bestandteile	Spigelia D4, Scilla D4, Adonis D3, Crataeg. D1 5,0, Valerian. Ø 12,5, Camph. D2 5,0, Sprit. ad 100.		
Indikation	Crataegus-Herztonikum für das alternde oder nervöse Herz, zur Vorbereitung für die Digitalis-Therapie.		
Dosierung	3 mal 10—15 Tropfen pro die.		
Handelsform und Preise	Tropfflasche mit ca. 20 g DM 1,15 Klinikpackung mit 200 g DM 7,45 Klinikpackung mit 1000 g DM 31,60		
Hersteller	VEB Promassol-Werk, Erfurt		
Lactalbin-Salbe		(43 28 16 00)	VVS 01/211
Bestandteile	Oleum Pedum Tauri 20%, Lac. rec. 20%, Zinc. oxyd. 10%, Salben-grundlage 50%.		
Indikation	Milcheiweißsalbe. Gegen Unterschenkel- und Decubitalgeschwüre, Ekzeme, Dermatitis, Intertrigo, Milchschorf, Frischverletzungen der Haut.		
Handelsform und Preise	Glasdose mit 30 g DM 1,30 Klinikpackung mit 1000 g DM 20,30		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Lactobaryt „A“		(43 28 61 20)	A VVor 02/214
Bestandteile	96,578% BaSO ₄ , 3,0% Zucker, 0,012% Saccharin-Krist., 0,010% Vanillin, 0,4% Trockenpektin.		
Indikation	Zur Röntgendiagnose der Speiseröhre, des Magens und des Darms.		
Dosierung	Das Mischverhältnis bleibt im allgemeinen dem Arzt überlassen. Für orale Anwendung zur Schleimhautdarstellung der Speiseröhre, des Magens und Dünndarms wird eine Mischung von Lactobaryt „A“ (aromatisiert) mit Wasser etwa im Verhältnis 1+1 empfohlen. Zu einer normalen Untersuchung werden 150 g Lactobaryt mit 150 ccm Wasser angerührt. Für Prallfüllung eine Anreibung von Lactobaryt mit der doppelten Menge Wasser.		
Handelsform und Preise	Packung mit 150 g DM 1,34 Packung mit 2 kg DM 8,40 Packung mit 5 kg DM 18,85		
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		

(43 28 61 20)	A VVOr 02/215	Lactobaryt „N“
96,6% BaSO ₄ , 3,0% Zucker, 0,4% Trocken-Pektin.		Bestandteile
Vornehmlich zur Röntgendiagnose des Darms oder zur Prallfüllung.		Indikation
Das Mischungsverhältnis bleibt im allgemeinen dem Arzt überlassen. Für rektale Anwendung zur Schleimhautdarstellung des Dickdarms eine Mischung von Lactobaryt „N“ mit etwa der doppelten Menge Wasser. Eine Untersuchung = 150 g Lactobaryt mit etwa 300 ccm Wasser.		Dosierung
Für orale Anwendung zur Schleimhautdarstellung der Speiseröhre, des Magens und Dünndarms Lactobaryt mit Wasser im Verhältnis 1+1. Eine Untersuchung = 150 g Lactobaryt mit 150 ccm Wasser.		
Für Prallfüllung, oral oder rektal, eine Anreibung mit Lactobaryt mit etwa der doppelten Menge Wasser.		
Lactobaryt „N“ (Normal) enthält im Gegensatz zu Lactobaryt „A“ kein Aroma.		
Packung mit 150 g	DM 1,34	Handelsform und Preise
Packung mit 2 kg	DM 8,40	
Packung mit 5 kg	DM 18,85	
VEB Fahlberg-List, Magdeburg		Hersteller
(43 29 12 00)	A VVP 10/278	Lacuprin
Acid. hydrochlor. 25% 2,0, Zinc. oxydat. 1,39, Acid. lact. 7,1, Echinacin extern 16,3, Sacchar. 32,54, Aqua ad 100,0		Bestandteile
Gegen Anginen, intraorale Ulcerationen und Entzündungen, eitrige Rhinitis, infizierte Wunden, Phlegmone, Furunkel. Zur lokalen Behandlung von Di-Bazillenträgern.		Indikation
Dosierung lt. Spezialanweisung.		Dosierung
Flasche mit 50 ccm	DM 2,20	Handelsform und Preise
Flasche mit 500 ccm	DM 16,05	
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Lanat-Tabletten		(43 25 41 00)	ARp VVP 05/217
Bestandteile	Wirkstoffe der Digitalis lanata. (1 Tabl. = ca. 200 FD)		
Indikation	Cardiacum.		
Dosierung	Die perorale Medikation erfolgt in der Regel nach den Mahlzeiten auf vollen Magen, da die Verträglichkeit dann am besten ist. Im Beginn der Lanat-Behandlung ist zumeist eine etwas größere Gabe (ca. 600 FD) pro Tag als erforderlich anzusehen, während bei fortlaufender Medikation nach einigen Tagen auf ca. 400 FD zurückgegangen werden kann. Für Lanat gelten sämtliche Erfordernisse, die bei der Therapie mit den Purpureawirkstoffen zu beobachten sind, in analoger Weise.		
Handelsform und Preise	Packung mit 20 Tabl. zu 0,3 g . . . DM 1,15 Packung mit 200 Tabl. zu 0,3 g . . . DM 4,55 Klinikpackung mit 500 Tabl. DM 8,70		
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		
Lanat-Tropfen		(43 25 41 00)	ARp VVP 05/218
Zusammensetzung, Indikation und Dosierung wie vorstehend.			
Handelsform und Preise	Tropfflasche mit ca. 25 ccm (1 ccm = ca. 200 FD) DM 1,60 Tropfflasche mit ca. 75 ccm DM 2,88 Klinikpackung mit ca. 400 g DM 10,16		
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		
Lanat-Zäpfchen		(43 25 41 00)	ARp VVP 05/219
Zusammensetzung und Indikation wie vorstehend.			
Dosierung	In der rektalen Applikation, bewährt bei Herzinsuffizienz mit Stauungsercheinungen d. Verdauungstraktes, empfiehlt sich die Ordination von 2 mal täglich 1 Zäpfchen.		
Handelsform und Preise	Packung mit 5 Zäpfchen zu 2,3 g (1 Zäpfchen=ca. 200 FD) DM 0,88 Packung mit 10 Zäpfchen zu 2,3 g . . . DM 1,45 Klinikpackung mit 50 Zäpfchen zu 2,3 g DM 3,76		
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		

(43 29 12 00)	ARp S 10/229	Leandin
	Oleander-Glykosid-Lösung (250 FD/ccm).	Bestandteile
	Angina pectoris, Coronar-Insuffizienz, Praecordialangst, Herzviten mit schweren Decompensationen (Oedeme, Dyspnoe, Dilatation).	Indikation
	3 mal tägl. 15-20 Tropfen, d. h. insgesamt etwa 280-375 FD. (40 Tropfen=1 ccm). Höhere Dos. bis maximal etwa 450 FD (= 72 Tropfen) täglich in besonders schweren Fällen.	Dosierung
	Flasche mit ca. 20 ccm DM 1,70	Handelsform und Preise
	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig	Hersteller
(43 28 17 00)	A VVS 01/802	Lebertransalbe 30 %
	Ol. Jecoris aselli 30,0, Salbengrundlage ad 100,0	Bestandteile
	Gegen Furunkulose, Ekzeme, zur Wundbehandlung.	Indikation
	Dose mit 30 g DM 1,00	Handelsform und Preise
	Klinikpackung mit 1000 g DM 14,00	
	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul	Hersteller
(43 27 59 00)		Lecilade „Bernburg“
	Reines Pflanzenlecithin „Bernburg“ (ca. 13 %) m. Traubenzucker (20 %) in feiner Gebäckmasse mit Pflanzenfetten.	Bestandteile
	Roborans.	Indikation
	Rollen mit 10 Tabl. (netto ca. 40 g) . . . DM 0,55	Handelsform und Preise
	VEB Eumarhal-Werk Bernburg	Hersteller
(43 27 59 00)	VVSA 01/201	Lecithin-Dragees „Bernburg“
	Reines Pflanzenlecithin „Bernburg“ mit Zucker in Drageeform.	Bestandteile
	Tonikum und Roborans.	Indikation
	Schachtel mit 50 Dragees m. je ca. 0,3 g Reinlecithin „Bernburg“ DM 1,10	Handelsform und Preise
	Schachtel mit 100 Dragees m. je ca. 0,3 g Reinlecithin „Bernburg“ DM 2,00	
	VEB Eumarhal-Werk Bernburg	Hersteller

Lepitoin (43 26 39 00) ARp VVT 03/219	
Bestandteile	Diphenylhydantoin zu 0,1 g pro Tabl.
Indikation	Aufhebung des Delirium epilepticum, Ausschaltung der Dementia epileptica, Chorea minor., Trigeminus-Neuralgie.
Dosierung	Täglich 3 mal 0,1-0,2 g nach den Mahlzeiten. In resistenten Fällen während fünf Wochentagen stoßweise Verabfolgung von 0,05 bis 0,1 streng individuell abgestimmt, Trigeminus-neuralgie täglich 0,6 g.
Handelsform und Preise	Glas mit 50 Tabl. zu 0,1 g DM 1,75 Klinikpackung mit 50 Tabl. DM 12,00
Hersteller	VEB Promassol-Werk, Erfurt
Lerminol-Einreibung (43 29 12 00) A S 10/265	
Bestandteile	Spezialauszüge von: Apis 1,25, Rhus toxic. 10,0, Arniflor 20,0, Coniferenextraktöl 7,5, Camphora 0,75, Spirit. saponat. ad 100,0.
Indikation	Rheuma, Lumbago, Ischias, Neuralgien, Verstauchungen.
Dosierung	Die schmerzenden Stellen 2-3 mal täglich einreiben und warm einpacken.
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 50 ccm DM 1,20 Flasche mit ca. 150 ccm DM 2,75
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig
Liquitalis (43 25 41 00) ARp VVP 07/238/239	
Bestandteile	Titriertes Digitalis-Präparat (1 ccm [30 Tropfen] oder 1 Zäpfchen = 0,1 g Droge = 200 FD).
Indikation	Cardiotonicum und Diureticum.
Dosierung	Zur Stoßtherapie: 3-4 mal täglich 30 Tropfen (oder 3 mal täglich 1 Zäpfchen). Erhaltungsdosis: 3 mal täglich 6-12 Tropfen (oder täglich 1 Zäpfchen).
Handelsform und Preise	Tropfen: Flasche mit 10 ccm . . . DM 0,90 Flasche mit 20 ccm . . . DM 1,70 Klinikpackung mit 0,450 kg DM 13,70 Zäpfchen: Schachtel mit 6 Stück . . . DM 1,45 Schachtel mit 12 Stück . . . DM 2,20 Klinikpackung mit 60 Stück DM 8,50
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul

(43 24 33 00)	ARp VVS 01/206	Liulan 101
Oleum Pedum Tauri 86%, Bismut. subsalicylic. 10%, Ol. Terebinth. DAB 6 4%, 1 ccm Liulan 101 enthält 0,05 g Bi.		Bestandteile
Wismut-Emulsion für alle Indikationen der Wismut-Therapie.		Indikation
Für Erwachsene: Jeden 3.-5. Tag 1-2 ccm intramuskulär in den oberen äußeren Quadranten des Glutäus. Gesamtdosis 10-20 ccm.		Dosierung
Flasche mit 15 ccm	DM 1,70	Handelsform und Preise
Flasche mit 30 ccm	DM 3,10	
Flasche mit 75 ccm	DM 7,95	
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 24 33 00)	ARp VVS 01/207	Liulan forte
Oleum Pedum Tauri 76%, Bismut. subsalicylic. 20 %, Ol. Terebinth. DAB 6 4%, 1 ccm Liulan forte enthält 0,1 g Bi.		Bestandteile
Wismut-Emulsion für alle Indikationen der Wismut-Therapie.		Indikation
Für Erwachsene: Jeden 3.-5. Tag 1-2 ccm intramuskulär in den oberen äußeren Quadranten des Glutäus. Gesamtdosis 10-20 ccm.		Dosierung
Flasche mit 20 ccm	DM 2,40	Handelsform und Preise
Flasche mit 75 ccm	DM 8,25	
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 21 35 00)	A VVA 01/223	Lopirin
Salicylsäure-Isopropylamid.		Bestandteile
Akuter und chronischer Rheumatismus sowie fieberhafte Infektions- und Erkältungskrankheiten.		Indikation
Bei akutem Gelenkrheumatismus 6 mal täglich 2 Tabletten. Für die übrigen Indikationen 3 mal täglich 1-2 Tabletten. Die Tabletten vor dem Einnehmen in wenig Flüssigkeit zerfallen lassen.		Dosierung
Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,5 g	DM 1,50	Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu 0,5 g	DM 39,75	
VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		Hersteller

Maiera-Herzsalbe		(43 29 12 00)	ARp S 10/266
Bestandteile	Spezialauszug Pflanzlich von: Crataegus 10 FD/ccm 5,0, Valeriana \emptyset 1,0, Amylium nitros. 5,0, Camphora 4,5, Sacch. alb. 10,0, Salbengrundlage ad 100,0.		
Indikation	Zur Injektionstherapie bei Angina pectoris und kardialer Dyspnoe.		
Dosierung	3-4 cm des Tubeninhalts einige Minuten lang in der Herzgegend verreiben.		
Handelsform und Preise	Dose mit ca. 20 g DM 1,05		
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Magenpulver		(43 26 32 00)	A VVP 07/241
Bestandteile	Natr. bicarbonic. 60,0, Magn. carbonic. 8,0, Calc. carbonic. 10,0, Bism. subnitric. 5,0, Natr. chlorat. 3,0, Pepsin 4,0, Natr. sulf. 10,0		
Indikation	Antacidum bei Hyperacidität, Gastritis, Ulcus.		
Dosierung	3 mal täglich nach dem Essen 1 Teelöffel voll in Wasser verrührt.		
Handelsform und Preise	Packung mit 60 g DM 1,05		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Magenpulver mit Belladonna		(43 26 32 00)	ARp VVP 07/242
Bestandteile	Extr. Belladonn. 0,5, Natr. bicarbonic. 59,5, Magn. carbonic. 8,0, Calc. carbonic. 10,0, Bism. subnitric. 5,0, Natr. chlorat. 3,0, Pepsin 4,0, Natr. sulf. 10,0		
Indikation	Schmerzlind. Antacidum bei Hypersecretion, Hyperacidität, Gastritis, Ulcus.		
Dosierung	3 mal täglich 1 gestrichenen Teelöffel voll nach dem Essen in Wasser verrührt nehmen.		
Handelsform und Preise	Packung mit 60 g DM 1,15		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Malzextrakt (Malty) flüssig (ohne Zusatz)		(43 27 41 00)	
Indikation	Roborans.		
Dosierung	3-4 Eßlöffel täglich.		
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 500 g DM 1,18		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		

(43 27 42 00)		Malzextrakt in Pulverform (ohne Zusatz)
Roborans. 3-4 Eßlöffel täglich. Packung mit ca. 125 g	DM 1,34	Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
(43 27 41 00)	VVP 07/337	Malzextrakt (Maltyl) mit Kalk 0,5 %
Roborans. 3-4 Eßlöffel täglich. Packung mit ca. 500 g	DM 1,62	Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
(43 27 41 00)	VVP 07/243	Malzextrakt (Maltyl) mit Lecithin 0,5 %
Roborans. 4-6 Eßlöffel täglich. Packung mit ca. 500 g	DM 1,93	Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
(43 27 44 00)	ARp VVP 07/244	Malto-Sellol (z.Zt.beschränkt lieferbar)
Extr. Malti spiss. 30,0, Ol. Jecor. Aselli 33,0, Natr. monophosph. 0,12, Natr. biphosph. 0,4, Corrig., Aqua dest. ad 100,0. Wohlschmeckendes, malz- und lebertranhaltiges Roborans. Packung mit ca. 250 g	DM 1,97	Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
(43 21 23 00)	A VVP 05/220	Melival
Methylvalerianat 1,0, Destill. Melissaë 79,0, Perkolat aus Rad. Valerianaë 20,0. Sedativum bei vasomotorischen Störungen an Herz u. Magen. Im allgemeinen werden bei nervösen Krankheitszuständen, besonders am Herzen oder im Magen, mehrmals am Tage (etwa 3- bis 4 stündlich) 20-30 Tropfen, in Wasser eingenommen, ausreichend sein. Abends vor dem Schlafengehen empfiehlt sich eine einmalige Dosis von etwa 30 bis 50 Tropfen zur Förderung leichten Einschlafens. Diese etwas höhere Dosierung ist auch bei dysmenorrhöischen Beschwerden, Brechreiz oder Erbrechen angezeigt. Tropfflasche mit ca. 50 ccm Klinikpackung mit ca. 450 g	DM 1,67 9,80	Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
VEB Chemidroph-Werk Chemnitz		

Melven 20% u. 40%		(43 25 45 00)	ARp VVS 01/209/216
Bestandteile	Intravenös injizierbares Honigpräparat.		
Indikation	Zur umfassenden Herz- und Kreislauftherapie.		
Dosierung	Tägl. 10-20-30 ccm Melven 20% oder 40% je nach Schwere der Erkrankung. In besonderen Fällen können die Gaben noch erhöht werden.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 5 Amp. zu 10 ccm 20%	DM 3,55	
	Schachtel mit 5 Amp. zu 10 ccm 40%	DM 4,05	
	Schachtel mit 50 Amp. zu 10 ccm 20%	DM	
	Schachtel mit 50 Amp. zu 10 ccm 40%	DM	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Menthol-Eucalyptus-Dragees		(43 23 52 00)	VVP 07/217
Bestandteile	Ol. Eucalypti 0,00155, Ol. Salviae 0,00025, Menthol 0,00105 g pro Dragee.		
Indikation	Gegen Katarrhe der oberen Atmungsorgane.		
Dosierung	Öfters am Tage 1 Tablette langsam im Munde zergehen lassen.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 50 Stück	DM 0,45	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Menthymiln		(43 23 12 00)	VVP 14/219
Bestandteile	Extr. Thymi 19,5%, Extr. Menthae 2,8%, Thymol 0,007%, Sacchar. 48,4%.		
Indikation	Gegen Katarrhe der Atemwege, Grippe, Pertussis.		
Dosierung	Erwachsene 4 mal täglich 1 Tee- bis Eßlöffel, Kinder 4 mal täglich 1 Teelöffel voll.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 225 g	DM 1,34	
Hersteller	VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		
Mergentheimer Salz		(43 26 44 00)	VVSA 01/203
Bestandteile	Gemisch der wichtigsten Wirkstoffkomponenten der Mergentheimer, Karlsquelle: Natr. chlorat., Natr. sulf., Magn. sulf.		
Indikation	Purgativum, Cholagogum.		
Dosierung	1-2 mal täglich 1 Teelöffel auf 300 g Wasser.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 100 g	DM 1,15	
Hersteller	VEB Eumarhal-Werk Bernburg		

(43 22 45 00)	ARp VVT 03/572/573	Methylthiouracil (Strumacil) 0,1 u. 0,025 g
Bei mittleren und schweren Hyperthyreosen, zur Senkung des Grundumsatzes, zur Vorbereitung der Basedowoperation nach Plummer, Colitis ulcerosa. Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		Indikation
Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,1 g DM 1,85 Klinikpackung mit 250 Tabl. zu 0,1 g DM 15,00 Glas mit 100 Tabl. zu 0,025 g DM 2,25		Dosierung Handelsform und Preise
VEB Promassol-Werk, Erfurt		Hersteller
(43 21 62 00)	VVP 04/201	Methylsal
Methylum salicylic. 25%, Chloroform 20%, Ol. veget. 55%. Antirheumaticum, Antineuralgicum zur externen Anwendung. Schmerzende Stellen 2 mal täglich gut einreiben.		Bestandteile
Flasche mit ca. 50 ccm DM 1,14		Indikation
VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		Dosierung
		Handelsform und Preise
		Hersteller
(43 26 21 00)	A VVP 13/220	Mezym
Fermente des Pankreas, standardisiert nach Lipase-, Amylase- und Protease-Einheiten.		Bestandteile
Meteorismus, Dyspepsien, chronische Pankreatitiden, Gastroenteritiden, Darmentgasungen vor Operationen und Röntgenaufnahmen, Verhütung postoperativer Blähungsbeschwerden.		Indikation
3-4 mal täglich 2 Dragees kurz nach dem Essen nehmen. Die Dragees müssen unzerkaut geschluckt oder mit etwas Flüssigkeit genommen werden. Für Kinder 2-3 mal täglich 1-2 Dragees. Die absolute Unschädlichkeit und ausgezeichnete Verträglichkeit des Mezymb lassen das Präparat selbst bei kleinen Kindern indiziert erscheinen.		Dosierung
Zur Entgasung vor Operationen oder Röntgenaufnahmen empfiehlt es sich, 2-3 Tage lang vor dem Eingriff täglich 3 mal 2 Dragees zu geben.		
Glas mit 50 Dragees zu je 0,05 g DM 1,90 Klinikpackung mit 250 Dragees zu je 0,05 g für Private DM 8,25 für Kliniken DM 6,85		Handelsform und Preise
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller

Migranden		(43 29 12 00)	A S 10/267	
Bestandteile	Spezialauszüge Panstabil von: Gelsem. 0,15, Bellad. 0,1, Sanguinar. 1,0, Iris versivolor. Ø 7,5, Spigelia Ø 1,0, Sacchar. ad 100,0.			
Indikation	Bei Migräne.			
Dosierung	1-2 Tabletten nach Bedarf.			
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 80 Tabl. zu 0,25 g . . .			DM 1,20
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig			
Milax		(43 26 42 00)	A VVP 06/223	
Bestandteile	Mineralölemulsion mit 1,5% Phenolphthalein.			
Indikation	Stuhlregulierendes Mittel.			
Dosierung	2-4 Teelöffel voll, evtl. mehr.			
Handelsform und Preise	Flasche mit 120 ccm			DM 1,70
	Klinikpackung mit 1000 g			DM 9,47
Hersteller	VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau			
Millefolan		(43 29 62 00)	A VVT 02/205	
Bestandteile	Herba Millefol. 18,2, Flor. Arnicae 1,8, Flor Chamomill. 1,8, Spiritus 60 Vol.-% ad 100,0.			
Indikation	Desinfiziens und Mittel gegen Verdauungsstörungen.			
Dosierung	Äußerlich zu Waschungen und Spülungen: 1 Eßlöffel voll auf 1/2-1 l Wasser. Innerlich: 10-15 Tropfen mehrmals täglich in Wasser oder Tee. Als Gurgelmittel: 1 Teelöffel voll auf 1 Glas Wasser.			
Handelsform und Preise	Flasche mit 50 ccm			DM 1,30
	+ Spir.-Zuschlag			DM 0,10
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.			
Milzbrand-Serum „Dessau“		(43 41 90 00)	VVP 01	
Bestandteile	Antiinfektiöses Immuserum von Pferd, Hammel und Rind, konserviert, 5 Jahre verwendbar.			
Indikation	Zur Serum-Therapie des Milzbrandes.			
Dosierung	Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung			
Handelsform und Preise	Ampulle zu 10 ccm			DM 2,20
	Ampulle zu 20 ccm			DM 4,05
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau			

(43 29 41 00)	VVP 01	Milzbrand-Serum, präzipitierendes
Zur Diagnose.		Indikation
Flasche mit 5 ccm	DM 11,55	Handelsform und Preise
VEB Serum-Werk Dessau		Hersteller
(43 25 21 00)	F 01	Miotisal
Natrium chloratum purum mit 1,66% p-Nitrophenoldiaethylphosphoricum.		Bestandteile
Glaukom.		Indikation
Augentropfen 1:6000=1%ige Miotisal-Lösung. Miotisal 0,1 g, Aqua dest. steril ad 10,0 g. Lösungen stets frisch und mit kaltem Wasser bereiten! Temperaturen über 40° C sind zu vermeiden! Nur auf ärztliche Verordnung. Täglich 2-3 mal 1-2 Tropfen in den Bindehautsack einträufeln. Wirksamkeit der frisch angefertigten Augentropfen 6-8 Wochen.		Dosierung
Packung mit 5X1 g	DM 30,15	Handelsform und Preise
VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld		Hersteller
(43 21 49 00)	ABV VVP 09/574/575	Morphinum hydrochloricum
Morphinum hydrochloric. 0,01 g bzw. 0,02 g, Atropin. sulfuric.		Bestandteile
Souveränes Schmerzstillungsmittel bei allen Schmerzzuständen.		Indikation
0,01-0,02 g subkutan, im Höchstfall bis zu 3 Ampullen täglich. Nur für Erwachsene.		Dosierung
Packung mit 10 Ampullen zu 1 ccm 0,01 g	DM 1,80	Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 50 Ampullen zu 1 ccm 0,01 g	DM 7,70	
Packung mit 10 Ampullen zu 1 ccm 0,02 g	DM 2,00	
Klinikpackung mit 50 Ampullen zu 1 ccm 0,02 g	DM 8,65	
VEB Jenapharm, Jena		Hersteller

Morphinum hydrochloricum c. Atropin. sulfuric.	
	(43 21 49 00) ABV VVP 09/579/581
Bestandteile	Morphinum hydrochloric. 0,01 g bzw. 0,02 g, Atropin. sulfuric. 0,0005 g, Aqua bidest. ad 1 ccm.
Indikation	Schmerzstillungsmittel bei Darmspasmen, Gallen- und Ureterkoliken, Asthma bronchiale, besonders bei Spasmen der glatten Muskulatur.
Dosierung	1 ccm subkutan. Im Höchstfalle bis zu 3 Ampullen täglich. Nur für Erwachsene.
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Ampullen zu 1 ccm 0,01 g DM 1,90 Klinikpackung mit 50 Ampullen zu 1 ccm 0,01 g DM 8,15 Packung mit 10 Ampullen zu 1 ccm 0,02 g DM 2,10 Klinikpackung mit 50 Ampullen zu 1 ccm 0,02 g DM 9,15
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena
Morphinum hydrochloricum c. Scopolamin. hydrobrom.	
	(43 21 49 00) ABV VVP 09/585/587
Bestandteile	Morphinum hydrochloric. 0,01 g bzw. 0,02 g, Scopolamin. hydrobrom. 0,0003 g bzw. 0,0005 g, Aqua bidest. ad 1 ccm.
Indikation	Schmerzstillungsmittel und zur Narkosevorbereitung.
Dosierung	1 ccm subkutan. Im Höchstfalle bis zu 3 Ampullen täglich. Nur für Erwachsene.
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Ampullen zu 1 ccm 0,01 g DM 1,90 Klinikpackung mit 50 Ampullen zu 1 ccm 0,01 g DM 8,15 Packung mit 10 Ampullen zu 1 ccm 0,02 g DM 2,10 Klinikpackung mit 50 Ampullen zu 1 ccm 0,02 g DM 9,15
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena

(43 23 72 00)	VVA 02/201	Mucidan-Ohrspülung
Kal. sulfocyanat. 50,0, Formaldehyd 5,0, Gelatinae 1,0, Ol. Chamomill. 0,1, Aqua dest. 43,9.		Bestandteile
Subakute und chronische Otitiden, Tubenrezidive, Kieferhöhleneiterungen.		Indikation
Verdünnung 1:40 (1 Teelöffel auf 1 Trinkglas warmen Wassers).		Dosierung
Flasche mit 50 ccm DM 2,10		Handelsform und Preise
VEB Kali-Chemie „Rhenania“, Berlin-Niederschöneweide		Hersteller
(43 23 59 00)	VVA 02/200	Mucidan-Tinktur
Kal. sulfocyanat. 20,0, Formaldehyd 11,0, Gelatinae 2,0, Spir. Vini 15,0, Ol. aeth. 1,0, Aqua dest. 51,0.		Bestandteile
Gurgelmittel bei Anginen, Pharyngitis, Stomatitis, Alveolarpyrrhoe.		Indikation
Ca. 10 Tropfen auf 1/2 Trinkglas Wasser. Für Pinselungen 1:3 verdünnen.		Dosierung
Spritflasche mit 20 ccm DM 1,15		Handelsform und Preise
Spritflasche mit 100 ccm DM 3,82		
VEB Kali-Chemie „Rhenania“, Berlin-Niederschöneweide		Hersteller
(43 25 51 00)	A VVP 10/249	Myko liquid
Steriles Kulturfiltrat aus Penicillin-Oberflächenkultur, eingestellt auf einen Penicillingehalt von 250 IE/ccm. Enthält alle vom Pilz produzierten Begleitstoffe.		Bestandteile
Pyodermien, zu Wundspülungen, Conjunctivitis, Sinusitis.		Indikation
Unverdünnt zu Umschlägen, Spülungen, Tamponaden und zur Spraybehandlung.		Dosierung
Flasche mit ca. 20 ccm DM 1,10		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
43 26 14 00)	VVP 07/596	Natrium bicarbonicum Tabletten 0,5
Sodbrennen, Hyperacidität.		Indikation
Mehrmals täglich 1-2 Tabletten.		Dosierung
Röhrchen mit 20 Tabl. DM 0,20		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 1000 Tabl. DM 3,35		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Bestandteile

Natrium chlorat. 10 %/o		(43 25 40 00)	A VVP 07/599
Indikation	Intravenös als Haemostypticum bei Blutungen innerer Organe, der Haut und Schleimhäute.		
Handelsform und Preise	Für den Sprechstundenbedarf des Arztes. Schachtel mit 10 Amp. zu 10,5 ccm DM 2,45 Schachtel mit 50 Amp. zu 10,5 ccm DM 9,30 Schachtel mit 100 Amp. zu 10,5 ccm DM 17,20		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Natrium citricum		(43 22 70 00)	A VVP 07/603/604
Indikation	Zur Durchführung der diagnostischen Blutsenkungs-Reaktion.		
Handelsform und Preise	Für den Sprechstundenbedarf des Arztes. Schachtel mit 10 Amp. zu 1,1 ccm . . . DM 1,50 Klinikpackung mit 100 Amp. zu 1,1 ccm 3,8% DM 9,70		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Natrium salicylicum		(42 17 34 00)	A VVP 04/221
Tabletten (z.Zt.beschränkt lieferbar)			
Indikation	Specificum gegen Rheumatismus, Antipyreticum.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Tabl. DM 0,35		
Hersteller	VEB Pharm.-Werk Oranienburg		
Neo-Arsoluin		(43 24 31 00)	A VVOr 02/217
0,15 0,3 0,45 0,6 g			
Bestandteile	Natriumsalz der 3,3'-Diamino-4,4'-dioxarsenobenzol-Methylen-Sulfoxylsäure.		
Indikation	Lues sämtlicher Stadien, ferner Lungengangrän mit Spirillen und Spirochäten, Pemphigus, Lichen ruber planus, Plaut-Vincent'sche Angina, Alveolarpyorrhoe und Mundgeschwüre, sowie bei einer Reihe von Tropenkrankheiten.		
Dosierung	Intravenöse Injektion. Die Behandlung soll nur durch einen Arzt ausgeübt werden, der die Technik vollkommen beherrscht und alle Vorsichtsmaßnahmen gewissenhaft beachtet.		
Handelsform und Preise	Einzelampulle 0,15 g DM 1,05 Klinikpackung mit 20 Ampullen 0,15 g pro % Amp. DM 85,90 Einzelampulle 0,3 g DM 1,40 Klinikpackung mit 20 Ampullen 0,3 g pro % Amp. DM 116,60 Einzelampulle 0,45 g DM 1,65 Klinikpackung mit 20 Ampullen 0,45 g pro % Amp. DM 134,90 Einzelampulle 0,6 g DM 1,90 Klinikpackung mit 20 Ampullen 0,6 g pro % Amp. DM 153,50		
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		

(43 24 33 00)	ARp VVP 06/205	Neobigrol
10%ige Wismut-Öl-Suspension, 1 ccm = 0,06 Bi. Lues aller Stadien, Angina. 1 ccm 2—3 mal wöchentlich. i. v.		Bestandteile
Packung mit 15 ccm DM 2,00		Indikation
Flasche mit 100 ccm DM 8,14		Dosierung
VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau		Handelsform und Preise
(43 25 44 00)	ARp VVP 06/200/201	Neospiran
Orthophthalsäuredidiaethylamid. Atmungsstimulans und Kreislauf-tonikum. Je nach schwere des Falles 1 Ampulle evtl. wiederholt bzw. 1—2 Tabletten 3 mal täglich.		Bestandteile
Packung mit 3 Amp. zu 2 ccm 5%ig DM 0,99		Indikation
Packung mit 25 Amp. zu 2 ccm 5%ig DM 5,51		Dosierung
Packung mit 50 Amp. zu 2 ccm 5%ig DM 9,35		Handelsform und Preise
Packung mit 2 Amp. zu 20 ccm mit 20% Traubenzucker 0,5%ig DM 1,38		
Packung mit 12 Amp. zu 20 ccm mit 20% Traubenzucker 0,5%ig DM 6,05		
Packung mit 10 Tabl. Neospiran 0,1, Coffein 0,02, Ephedrin 0,01 DM 1,94		
Packung mit 100 Tabl. Neospiran 0,1, Coffein 0,02, Ephedrin 0,01 DM 14,50		
Packung mit 3 Amp. zu 0,5 ccm für Kinder 3%ig DM 0,94		
Packung mit 25 Amp. zu 0,5 ccm für Kinder 3%ig DM 5,26		
VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau		Hersteller
(43 24 69 00)	ARp VVSx 03/225	Neo-Vagital
Diphenyldisulfidbiguanid 2%, Dienoestroidiacetat 0,002%, Sacchar. lact. 10%, Mass. tabl. effervesc. ad 100%.		Bestandteile
Zur Behandlung von spezifischem und unspezifischem Fluor. 2—3 mal täglich, vor allem vor dem Schlafengehen, 1 Tablette möglichst tief in die Scheide einführen. In sehr schweren Fällen kann die Dosierung erhöht werden. Zwischenspülungen sind nur in Ausnahmefällen anzuwenden.		Indikation
Packung mit 20 Tabl. zu 0,5 g DM 1,93		Dosierung
Packung mit 300 Tabl. zu 0,5 g für Kliniken DM 22,25		Handelsform und Preise
für Private DM 25,03		
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		Hersteller

Nervinum	(43 29 12 00)	A VVP 10/231
Bestandteile	Equiset. Ø, Melissa Ø, Mentha pip. Ø, Chamom. Ø, Hyperic. Ø, Artemis. Ø, Lobel. Ø, aa 0,01, Natr. bromat., Kal. bromat. aa 0,1, Tinct. Valerianae simplex DAB 6 0,61, Iris Ø 0,05, Spir. vini et Corrig. ad 100,0	
Indikation	Pflanzl. Nervinum und Sedativum, besonders bei neurovegetativer Dystonie, Schlaflosigkeit.	
Dosierung	3 mal täglich 1 Likörglas.	
Handelsform und Preise	Flasche mit 100 ccm DM 1,40 Flasche mit 200 ccm DM 2,20 Flasche mit 500 ccm DM 4,20	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul	
Neutralon	(43 26 11 00)	A VVP 13/205
Bestandteile	Synthet. Aluminiumnatriumsilikat.	
Indikation	Hyperacidität, Hypersekretion, ulcus ventriculi et duodeni.	
Dosierung	3 mal täglich nach den Mahlzeiten 1 gestrichenen Teelöffel voll in 1 Glas Wasser zu nehmen.	
Handelsform und Preise	Karton mit 50 g DM 1,05 Karton mit 400 g DM 6,80	
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof	
Neutralon c. Belladonna	(43 26 11 00)	ARp VVP 13/201
Bestandteile	Synthet. Aluminiumnatriumsilikat + 0,5% Extr. Belladonnae. Indikation und Dosierung wie vorstehend.	
Handelsform und Preise	Karton mit 50 g DM 1,05 Karton mit 400 g DM 7,20	
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof	
Nikotinsäureamid Jenapharm	(43 27 63 00)	A VVP 09/236/237
Bestandteile	1 Ampulle enthält 0,1 g Nikotinsäureamid, 1 Tablette enthält 0,2 g Nikotinsäureamid.	
Indikation	Pellagra mit Vorstadien, Dermatosen, Hydroa, Hautallergien, Glossitis, Stomatitis, Enteritis, Colitis, Obstipationen.	
Dosierung	3 mal täglich 1 Tablette oder 1-2 mal täglich 1 Ampulle subkutan oder intramuskulär.	
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Amp. zu 1 ccm . . . DM 3,00 Röhrchen mit 10 Tabletten DM 3,00	
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena	

(43 25 29 00)	A Rp F 01/212	Nikozid-Wolfen (in Vorbereitung)
Iso-nicotinsäure-hydrazid	Chemotherapeuticum gegen die Tuberkulose Nur nach ärztlicher Verordnung!	Bestandteile
Glas mit 100 Tabl. zu 0,1 g		Indikation
Glas mit 1000 Tabl. zu 0,1 g		Dosierung
VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld		Handelsform
		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/268	Nisylen
Spezialauszug von Eucalyptus 0,4, Hom. Dil. von: Aconitum 12,0, Bryonia 11,0, Eupatorium perfoliatum 17,0, Viola tricolor. 11,0, Gelsem. 11,0, Phosphor 11,0, Alkohol ad 100,0.		Bestandteile
Prophylacticum und Therapeuticum bei Grippe und grip-pösen Katarrhen.		Indikation
Mehrmals täglich bis zu 1 stündlich ca. 10 Tropfen in Was-ser nehmen.		Dosierung
Flasche mit ca. 10 ccm DM 0,65		Handelsform und Preise
Flasche mit ca. 30 ccm DM 1,65		
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 25 43 10)	ARp VVP 13/219	Nitro-Tabletten „Schering“
Triaethanolamin-Trinitrat als Additionsverbindung.		Bestandteile
Dauerbehandlung der Angina pectoris, angiospastische Zustände.		Indikation
Zur Dauerbehandlung der Angina pectoris: 3—6 mal täglich eine Tablette mit etwas Flüssigkeit unzerkaut zu nehmen. Diese Dosierungsweise kann auch bei allen anderen In-dikationsgebieten Anwendung finden. Sollte es bei Angina pectoris zu akuten Anfällen kommen, dann können 4—6 —8 Tabletten auf einmal gegeben werden. Etwa auftretende Überdosierungserscheinungen (leichter Kopfschmerz, Nau-sea) verschwinden nach Reduktion der Dosis sofort.		Dosierung
Packung mit 50 Tabl. zu je 1 mg DM 1,20		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu je 1 mg		
für Private DM 13,90		
für Kliniken DM 12,35		
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller

1-Nor-Adrenalin		(43 13 19 00)	ARp VVP 09/242
Jenapharm			
(in Vorbereitung)			
Bestandteile	o-Dioxyphenylaethanolamin 0,001 g im ccm.		
Indikation	Kollaps, besonders nach chirurgischen Operationen, als gefäßverengerndes Mittel bei der Lokalanästhesie mit Jenacain anstelle von Adrenalin, bei Schockzuständen, Versagen des Kreislaufs infolge von Infektionen und Vergiftungen; örtlich zur Stillung von Blutungen.		
Dosierung	Subkutan oder intramuskulär 0,3—1 ccm mehrmals am Tage; zur Dauertropfinfusion 1 Ampulle auf 250—400 ccm physiologischer Kochsalzlösung, Einlaufgeschwindigkeit etwa 10—30 Tropfen pro Minute und mehr; als Zusatz zu Jenacain für Lokalanästhesie in derselben Dosierung wie Adrenalin. Die toxische Dosis beträgt 1-2 mg.		
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Amp. zu 1 ccm . . . DM 2,50 Klinikpackung mit 50 Amp. zu 1 ccm . . . DM 10,20		
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena		
Normacol		(43 26 41 00)	A VVP 13/204
Bestandteile	Pflanzliches Stuhlregelmittel.		
Indikation	Habituelle und chronische Obstipation.		
Dosierung	Im allgemeinen 2 mal täglich nach den Mahlzeiten oder auch nur abends 1—2 gehäufte Teelöffel mit Wasser oder Marmelade unzerkaut hinunterschlucken.		
Handelsform und Preise	Karton mit 100 g DM 1,45 Karton mit 250 g DM 2,85		
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		
Noviform-Salbe		(43 23 43 00)	A VVA 01/222
Bestandteile	5% Noviform (Tetrabrombrenzkatechinwismut).		
Indikation	Entzündliche und infektiöse Augenkrankheiten, wie Conjunctival-Erkrankungen, Ulcus corneae, Blepharitiden, Ekzeme usw.		
Handelsform und Preise	Kruke mit 5 g DM 0,80 Kruke mit 50 g für Private DM 3,40 für Kliniken DM 2,75		
Hersteller	VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		

(43 22 21 00)	ARp VVP 02/206/207/219	Oestrasid, Oestrasid forte und Oestrasid fortissimum
3,4 - Di(p - Acetoxyphenyl) - hexadien-, 2,4 Dienoestroidiacetat. Peroral voll wirksames Oestrogen. 1 Tabl.=0,2, 0,5 und 2,0 mg Wirkstoff.	Bestandteile	
Zur Anwendung innerhalb aller Indikationen der Follikelhor- montherapie.	Indikation	
Dosierung für:	Dosierung	
Oestrasid, Oestrasid forte und Oestrasid fortissimum-Tabl. Oestrasid, Oestrasid forte zur intramuskulären Injektion		
Genitale Hypoplasie:		
täglich 3 mal 1 Tabl. einfach (0,2 mg) oder forte (0,5 mg)		
oder wöchentlich 2 Injektionen einfach (1,0 mg)		
Primäre und sekundäre Amenorrhoe:		
täglich 1-3 Tabl. fortissimum (2,0 mg)		
oder wöchentlich 2-3 Injektionen forte (3,0 mg)		
Polymenorrhoe:		
täglich 3 mal 1-3 Tabl. einfach (0,2 mg)		
Dysmenorrhoe:		
täglich 1 Tabl. fortissimum (2,0 mg)		
Klimakterium:		
täglich 3 mal 1 Tabl. forte (0,5 mg)		
Ulcus ventriculi et duodeni:		
täglich 3 mal 1-2 Tabl. einfach (0,2 mg)		
oder wöchentlich 2-3 Injektionen einfach (1,0 mg)		
Durchblutungsstörungen:		
täglich 2-3 Tabl. einfach (0,2 mg)		
oder bzw. in Verbindung mit Oestrasid-Salbe		
Mamma Carcinom:		
Prostata Carcinom:		
täglich 2-3 Tabl. fortissimum (2,0 mg)		
oder in Abständ. v. 2 Tagen Injektion forte (3,0 mg)		
Im Sinne einer einfühlenden Hormontherapie ist je nach Schwere der Symptome und Reaktionslage individuelle Do- sierung empfohlen.		
Röhrchen mit 20 Tabl. einfach . . . DM 1,05 Klinikpackung mit 250 Tabl. einfach . . . DM 4,70 Röhrchen mit 20 Tabl. forte . . . DM 1,60 Klinikpackung mit 250 Tabl. forte . . . DM 7,75 Röhrchen mit 20 Tabl. fortissimum . . . DM 2,30 Klinikpackung mit 250 Tabl. fortissimum DM 14,20	Handelsform und Preise	
VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee	Hersteller	

Oestrasid, Oestrasid forte zur intramuskulären Injektion		(43 22 21 00)	ARp VVP 02/217/218
Bestandteile	3,4-Di-(p-Acetoxyphenyl)-hexadien-,2,4 Dienoestroldiacetat in öliger Lösung.		
Indikation	Zur Anwendung innerhalb aller Indikationen der Follikelhormontherapie.		
Dosierung	Dosierung vorstehend.		
Handelsform und Preise	Packung mit 5 Amp. zu 1 ccm 1 mg . DM 2,45 Packung mit 5 Amp. zu 1 ccm 3 mg . DM 2,95		
Hersteller	VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		
Oestrasid-Salbe		(43 22 21 00)	ARp VVP 02/216
Bestandteile	Dienoestroldiacetat in hautaffiner, gut resorbierbarer Salbengrundlage.		
Indikation	Zur percutanen Follikelhormontherapie.		
Handelsform und Preise	Kruke mit 10 g zu 10 mg DM 1,70 Klinikpackung mit 100 g zu 100 mg .. DM 6,85		
Hersteller	VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		
Oleum camphoratum 10 % u. 20 %		(43 25 40 00)	ARp VVP 07/630/631
Indikation	Herzinsuffizienz, Infektionskrankheiten, Kreislaufschwäche, Pneumonie.		
Dosierung	Jeweils 1 Amp. im.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 10 Amp. zu 1,1 ccm 10 % DM 1,35 Schachtel mit 10 Amp. zu 1,1 ccm 20 % DM 1,60 Schachtel mit 10 Amp. zu 2,2 ccm 10 % DM 1,82 Schachtel mit 10 Amp. zu 2,2 ccm 20 % DM 1,92 Klinikpckg. m. 100 Amp. z. 2,2 ccm 10% DM 13,15 Klinikpckg. m. 100 Amp. z. 5,5 ccm 20% DM 23,00		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		

(43 24 53 00)	ARp VVS 01/642	Oleum Terebinth. Amp. 15 %
Oleum Pedum Tauri 85%, Oleum Terebinth. rect. 15%		Bestandteile
Adnexitis, Rheuma, Prostatitis, Erkrankungen* der Atmungsorgane, Furunkulose, Ekzeme u. andere Hauterkrankungen.		Indikation
Jeden 2. bis 3. Tag 1-2 ccm intramuskulär, in besonderen Fällen auch tägliche Injektion von 1 ccm.		Dosierung
Bei der Furunkulose hat sich auch die prophylaktische Injektion jedesmal bei erstem Beginn des Furunkels sehr bewährt.		
Im übrigen kann je nach der Schwere der Erkrankung individuell dosiert werden.		
Schachtel mit 6 Amp. zu 1 ccm DM 1,80		Handelsform und Preise
Schachtel mit 20 Amp. zu 1 ccm DM 4,50		
Schachtel mit 6 Amp. zu 2 ccm DM 3,10		
Schachtel mit 20 Amp. zu 2 ccm DM 7,75		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 24 53 00)	ARp VVS 01/643	Oleum Terebinth. Amp. 40 %
Oleum Pedum Tauri 60%, Oleum Terebinth. rect. 40%		Bestandteile
Gonorrhoe mit allen ihren Komplikationen, Adnexitis, Rheuma, Prostatitis, Erkrankungen der Atmungsorgane, Furunkulose und andere Hauterkrankungen.		Indikation
Dosierung wie vorstehend.		Dosierung
Schachtel mit 6 Amp. zu 1 ccm DM 2,15		Handelsform und Preise
Schachtel mit 20 Amp. zu 1 ccm DM 5,35		
Schachtel mit 6 Amp. zu 2 ccm DM 3,70		
Schachtel mit 20 Amp. zu 2 ccm DM 9,25		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 29 12 00)	A VVP 10/div.	Oligoplexe
Mischungen von Auszügen frischer Pflanzen auch mit optimal zerteilten Mineralien. Sonderverzeichnis bitte anfordern.		Bestandteile
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 21 69 00)	A VVS 01/212	Opetol (Einreibung)
Methyl. salicyl. 5,0, Spir. sap. 10,0, Ol. Terebinth. 10,0, Camphora 3,0, Oleum Pedum Tauri 10,0, Emulsionsgrundlage 62,0		Bestandteile
Rheuma, Nervenentzündungen, Rippenfellerkrankungen, allgemeine Schmerzen.		Indikation
Flasche mit 50 ccm DM 1,—		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 500 ccm DM 8,60		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Ophthalmicain 0,5 % u. 1 %		(43 28 39 00)	A VVOr 02/226/227
Bestandteile	Falicain 0,5 % bzw. 1,0 %, Natr. chlorid 0,9 %, Aqua dest. ad 100 %, Spuren von Methylenblau.		
Indikation	Oberflächenanaestheticum für ophthalmologische Zwecke. Vor Operationen am Auge auf das Auge tropfen.		
Handelsform und Preise	Pipettenflasche mit 10 ccm 0,5 % DM 1,25 Flasche mit 250 ccm 0,5 % DM 10,94 Pipettenflasche mit 10 ccm 1 % DM 1,29 Flasche mit 250 ccm 1 % DM 11,77		
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		
Opium concentratum Amp. 0,02		(43 21 49 00)	ABV VVP 07/648
Bestandteile	Gesamt-Alkaloide des Opiums in Form salzsaurer Salze. 1ccm= 0,02 g salzsaure Gesamt-Alkaloide, entsprechend 0,01 g Morphin. hydrochloricum.		
Indikation	Narcoticum, Analgeticum.		
Dosierung	Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 10 Amp. zu 1,1 ccm DM 4,05		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Opium concentratum Tabletten 0,01		(43 21 49 00)	ABV VVP 07/649
Indikation	Analgeticum, Spasmolyticum.		
Dosierung	Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Tabletten DM 0,55		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Oral-Penicillin		(43 25 19 00)	ARp VVP 10/302
Bestandteile	Penicillin-Tabl. zur peroralen Anwendung mit je 25 000 IE Penicillin-Calcium pro Tabl.		
Indikation	Bei allen Infektionskrankheiten, deren Erreger eine hohe bis mittlere Penicillin-Empfindlichkeit aufweisen.		
Dosierung	Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 40 Tabl. DM 45,—		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		

(43 21 35 00)	A VVP 04/214/219	Oramid
Salicylsäureamid. Neuartiges, hochwirksames und völlig unschädliches Antipyreticum, Analgeticum und Antirheumaticum zur oralen Anwendung. Bis zu 4 mal täglich 1-3 Tabletten.		Bestandteile
Packung mit 20 Tabl. zu 0,5 g DM 1,20 Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu 0,5 g DM 32,20 Packung mit 10 Tabl. zu 1,0 g DM 1,— Packung mit 100 Tabl. zu 1,0 g DM 6,15 Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu 1,0 g DM 51,66		Indikation
VEB Pharm. Werk Oranienburg		Dosierung
		Handelsform und Preise
		Hersteller
(43 41 90 00)	VVP 01	Oroseran
Natives, keimfreies Pferdeserum, unkonservert. Staatlich gepr. Säuglingsheilkunde: Ernährungsstörungen jeder Art, Dyspepsien schwer-dystrophischer und atrophischer Säuglinge, Intoxikationen, Frühgeburten-Aufzucht. Kinderheilkunde: Infektiöse Durchfallserkrankungen, chronische Ernährungsstörungen. Innere Medizin: Eiweißmangelschäden aller Art. Chirurgie: Schlechte Wundheilungstendenz.		Bestandteile
Dosierung bei Ernährungsstörungen, Intoxikationen: 1. Tag 10 mal 10 ccm, 2. Tag 10 mal 20 ccm, 3. Tag 5 mal 30 ccm, 4. Tag 5 mal 20 ccm oral, vor den Mahlzeiten. Keine Gefahr der Überdosierung. Größere Kinder 1 Eßlöffel. Bei Eiweißmangelerscheinungen 3-5 mal täglich je 2 Eßlöffel.		Indikation
Flasche mit 100 ccm für Kliniken DM 9,45 für Private DM 9,90		Dosierung
VEB Serum-Werk Dessau, Dessau		Handelsform und Preise
		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/269	Otoseden
Zubereitung aus Flores Verbasci und Herba Plantag. je 25 % und Glycerin. anhydr. Akute Mittelohrentzündung, Otagie, Tubenkatarrhe.		Bestandteile
Im allgemeinen 2-3 Tropfen in das kranke Ohr einträufeln.		Indikation
Flasche mit ca. 10 ccm. DM 1,05		Dosierung
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Handelsform und Preise
		Hersteller

Ovo-Transannon		(43 22 24 00)	ARp VVP 07/218
Bestandteile	3,4-Di-p-Acetoxyphenyl-2,4-Hexadien 0,05 mg, Transannon 0,503g.		
Indikation	Zur Behandlung klimakterischer Beschwerden, Amenorrhoe und Oligomenorrhoe und hormonal bedingter Dermatosen.		
Dosierung	3 mal täglich 1 Bohne, in besonders schweren Fällen 3 mal täglich 2-3 Bohnen.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 20 Bohnen (entsprechend je 500 IE) DM 1,90		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Oxyphysin		(43 22 61 00)	ARp VVP 13/221
Bestandteile	Hypophysenhinterlappen-Präparat standardisiert: 1 ccm=3 VE.		
Indikation	Primäre und sekundäre Wehenschwächen, Atonien post partum, Plazentarretention.		
Dosierung	Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Karton mit 3 Amp. zu je 3 VE/1,1 ccm DM 1,65 Karton mit 24 Amp. zu je 3 VE/1,1 ccm für Private DM 10,90 für Kliniken DM 9,10		
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		
Paidont (siehe Zahnungsmittel)			
Pancurmen		(43 26 21 00)	A VVP 14/220
Bestandteile	Pancreas sicc. 37%, pflanzl. Diastase 15%, Curcumafarbst. 1,7%.		
Indikation	Chronischer Meteorismus, Blähbauch, Angina pectoris (gastrocardialer Symptomenkomplex), Gastritiden, Cholangitis, Enteritis sowie Pancreasschwäche und dyspeptische Zustände verschiedener Art. Zur Operationsvorbereitung bei Gallenleiden, für die Übergangszeit nach Entfernung der Gallenblase.		
Dosierung	2-3 Dragees unzerkaut zu den Hauptmahlzeiten.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 30 Dragees DM 1,76		
Hersteller	VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		
PA-Puder		(43 24 19 00)	ARp VVT 03/217
Bestandteile	20 % p-Aminophenylsulfonamid, 80 % Sacchar. lactis.		
Indikation	Schwangerschaftsdermatiden, Ulcus cruris, Colpitis, Vaginitis, vaginal. Inclusionen, nässender Nabel bei Neugeborenen.		
Handelsform und Preise	Streudose mit 10 g DM 1,45 Großpackung mit 50 g DM 5,85 Klinikpackung mit 250 g DM 22,35		
Hersteller	VEB Promassol-Werk, Erfurt		

(43 24 19 00)	ARp VVT 03/218	PA-Salbe
p-Aminophenylsulfonamid 10% in neutraler wasserfreier Salbengrundlage.		Bestandteile
Infizierte Ekzeme, Dekubitus, Hautschutzmittel bei absondernden TBC-Fisteln, Verbrennungen, Trichophytia profunda.		Indikation
Packung mit 30 g DM 1,70		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 250 g DM 10,35		
Klinikpackung mit 500 g DM 19,75		
Klinikpackung mit 1000 g DM 38,—		
VEB Promassol-Werk, Erfurt		Hersteller
PAS „Wolien“		(siehe Wofapas)
(43 28 12 00)	A VVP 15/222	Pastaderm
Bism. subgallic. 10,0, Zinc. oxyd.-Talc. 50,0, neutr. Vaselineöle 20,0, Ad. Lan.-Salbengrundlage 20,0.		Bestandteile
Gut verträgliche Paste für die erkrankte Haut bei Ekzemen, Pyodermien, Dermatitis, Neurodermitiden, Dermatomykosen.		Indikation
Klinikpackung mit 1 kg		Handelsform
VEB Vasenol-Werk, Leipzig		Hersteller
(43 25 19 00)	ARp VVP 10/299	Penicillietten
Penicillin-Sulfonamid-Tabl. mit je 500 IE Penicillin-Calcium und 0,05 g p-Aminobenzolsulfonacetamid-Natrium.		Bestandteile
Lokalbehandlung bakteriell bedingter Affektionen der Mund- und Rachenschleimhaut.		Indikation
2 stündlich 1 Tabl. langsam im Munde zergehen lassen, ebenso nach jedem Essen und Trinken 1 Tabl. Abends vor dem Schlafengehen 2 Tabl. in gleicher Weise.		Dosierung
Röhrchen mit 10 Tabl. DM 1,55		Handelsform und Preise
Röhrchen mit 20 Tabl. DM 2,75		
Klinikpackung mit 200 Tabl. DM 15,35		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 25 11 00)	ARp VVP 10/298	Penicillin — ad Injektionem
Penicillin-Calcium.		Bestandteile
Durch penicillinempfindliche Erreger bedingte Infektionen.		Indikation
Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		Dosierung
Flaschen mit Durchstichkorken		Handelsform und Preise
mit 200 000 IE DM 4,50		
mit 500 000 IE DM 11,25		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

**Penicillin-Calciumsalz
Jenapharm
z. Injektion** (43 25 11 00) A VVP 09/225/226

Bestandteile	Calciumsalz des Penicillins.
Indikation	Zur Injektionsbehandlung von Allgemein- und Lokalinfektionen, die durch penicillinempfindliche Erreger verursacht werden.
Dosierung	In Abständen von 3-4 Stunden 200-500 000 IE für Erwachsene, meist intramuskulär. Diese Dosis kann in schweren Fällen auch überschritten werden. Eine gewisse Depotwirkung läßt sich durch Lösen des Penicillins in 2 %iger Jenacain-Adrenalin-Lösung erzielen.
Handelsform und Preise	Flasche zu 200 000 IE DM 4,50 Flasche zu 500 000 IE DM 11,25
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena

**Penicillin-Calciumsalz
Jenapharm
zur Lokalbehandlung** (43 25 11 00) A VVP 09/222/223/240/224

Bestandteile	Calciumsalz des Penicillins.
Indikation	Zur örtlichen Behandlung von Infektionen, die durch penicillinempfindliche Erreger hervorgerufen werden, vorzugsweise in der Kleinchirurgie und Zahnheilkunde.
Dosierung	Die lokale Behandlung erfolgt durch Injektion, Instillation, Spülung, Tamponade mit den aus den Trockenampullen hergestellten Penicillin-Lösungen. Die Lösungen werden mit kaltem, sterilem, destilliertem Wasser oder physiologischer Kochsalzlösung hergestellt. Das Penicillin läßt sich auch ohne Bedenken in Jenacain-Adrenalin lösen, wenn wegen bestehender Schmerzen gleichzeitig eine lokalanaesthetische Wirkung erwünscht ist.
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Amp. zu 500 IE DM 2,70 Klinikpackung mit 50 Amp. zu 500 IE DM 9,90 Packung mit 3 Amp. zu 1000 IE + 3 Amp. Lösungsmittel DM 2,10 Packung mit 10 Amp. zu 1000 IE DM 4,55 Klinikpackung mit 50 Amp. zu 1000 IE DM 15,85 Packung mit 3 Amp. zu 5000 IE DM 5,55 Flasche zu 5000 IE DM 2,10
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena

(43 25 13 00)	A VVP 09/228	Penicillin-Salbe Jenapharm
Enthält im Gramm Salbe 1000 IE Penicillin-Calciumsalz in Lanettesalbe als Grundlage mit stabilisierenden Zusätzen.		Bestandteile
Zur örtlichen Behandlung von Infektionen, die durch penicillinempfindliche Erreger hervorgerufen werden und zur Abdeckung infektionsgefährdeter Wundgebiete.		Indikation
Messerrückendick auftragen und, falls erforderlich, mit Schutzverband versehen.		Dosierung
Packung mit 7-8 g=ca. 7000 IE DM 1,40 Klinikpackung mit ca. 30 g=ca. 30 000 IE DM 4,—		Handelsform und Preise
VEB Jenapharm, Jena		Hersteller
(43 25 12 00)	A VVP 09/227	Penicillin-Wundpuder Jenapharm
Enthält im Gramm Puder 1000 IE Penicillin-Calciumsalz in reiner Laktose als Pudergrundlage.		Bestandteile
Zur lokalen Behandlung infizierter und infektionsgefährdeter Wunden.		Indikation
Aufstreuen oder Einstäuben ausreichender Mengen. Mit destilliertem Wasser gelöst für Instillationen brauchbar.		Dosierung
Packung mit 5 g=5000 IE DM 1,40 Klinikpackung mit 50 g=50000 IE DM 10,25		Handelsform und Preise
VEB Jenapharm, Jena		Hersteller
(43 25 45 00)	A VVP 06/217/218/219	Pentadrin
p-Methylaminoäthanolphenoltartrat.		Bestandteile
Peripher angreifendes Gefäßstimulans zur Behandlung der akuten und chronischen Kreislaufschwäche, als Analepticum bei Kreislaufkollaps, bei Infektionskrankheiten (Grippe, Diphtherie, Pneumonie, Ruhr, Typhus), Vergiftungen, Herzinsuffizienz, Hypotonie, Coronarerkrankungen, Asthenie, Lungenödem, Bronchialasthma, Heuschnupfen, zur Vorbereitung vor Operationen, zur Prophylaxe der Thrombose, zur Förderung der Rekonvaleszenz nach inneren Krankheiten u. chirurgischen Eingriffen.		Indikation
3-5 mal täglich 20-40 Tropfen, bzw. 1-2 Tabl., bzw. 1 Amp. Evtl. wiederholen.		Dosierung
Packung mit 6 Amp. zu 1,5 ccm 4 % DM 1,65 Klinikpckg. mjt 50 Amp. zu 1,5 ccm 4 % DM 8,02 Klinikpckg. m. 100 Amp. z. 1,5 ccm 4 % DM 14,37 Packung mit 10 g Tropfen 10 % DM 1,65 Packung mit 25 g Tropfen 10 % DM 3,40 Klinikpckg. mit 100 g Tropfen 10 % DM 8,80 Klinikpckg. mit 500 g Tropfen 10 % DM 43,11 Packung mit 20 Tabl. zu 0,1 g Pentadrin DM 2,22		Handelsform und Preise
VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau		Hersteller

Pentephen (43 23 29 00) ARp VVP 13/225	
Bestandteile	Extr. hypophys. 0,03 VE, l-Ephedrin. hydrochl. 0,005 g, p-methylaminoethanolphenoltartrat (Pentadrin) 0,025 g.
Indikation	Antasthmaticum.
Dosierung	0,5-1 ccm pro dosi, in schweren Fällen gleichzeitig 1 ccm s. c. oder i. m. und 0,5-1 ccm langsam i. v. Die intravenöse Applikation des Präparates sollte dringenden Fällen vorbehalten bleiben und muß stets langsam erfolgen. Kranken mit deutlichen Kreislaufschäden und hypertonischen Arteriosklerotikern ist Pentephen intravenös besonders vorsichtig zu geben.
Handelsform und Preise	Packung mit 3 Amp. zu je 1,1 ccm . . . DM 1,05 Klinikpackung mit 24 Amp. zu je 1,1 ccm für Private DM 6,55 für Kliniken DM 5,45
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof
Pepsacid (43 26 19 00) VVZ 01/200	
Bestandteile	80 % Betainhydrochlorid, 20 % Pepsin, doppelt stark oder ggf. entsprechende Menge höherer Konzentration.
Indikation	Mangelhafte Sekretion der Magensäure und des Pepsins, Appetitlosigkeit, akute Dyspepsie, gastrogene Diarrhoe, Subacidität bei Ikterus und Gicht.
Dosierung	1/4 Teelöffel Pulver evtl. bis zur vierfachen Menge. 1-4 Tabl. à 0,5 g in 1/2 Glas Wasser aufgelöst, während oder nach der Mahlzeit nehmen, Kinder nehmen die Hälfte.
Handelsform und Preise	Packung mit 5 g Pulver DM 1,06 Röhrchen mit 10 Tabl. zu 0,5 g DM 1,17 Klinikpackung mit 300 Tabl. zu 0,5 g DM 21,05
Hersteller	VEB Gärungschemie Dessau, Dessau

(43 21 80 00)	A VVA 01/208	Peremesin
Kolloidlösliche Ceroxalat-Komplexverbindung. Geschmackfreie Tabl. zu 0,1 g, entsprechend 0,05 g Ceroxalat, narkoticum- und alkaloidfrei, völlig ungiftig. DRP 621 309.		Bestandteile
Erbrechen (Emesis und Hyperemesis gravidarum), Nausea (See-, Luft-, Auto-, Eisenbahnkrankheit), dismenorrhöisches Erbrechen, habituelles und Grippe-Erbrechen, Bestrahlungskater, Erbrechen Tuberkulöser, klimakterische Beschwerden, otogener Schwindel.		Indikation
1/2 Stunde vor dem Aufstehen bzw. vor Antritt der Reise 1-3 Tabletten. Gleiche Dosis je nach Bedarf in beliebigem Zeitabschnitt wiederholen.		Dosierung
Zur Verhütung des Bestrahlungskaters: 2 Tabletten 2 Stunden vor der Bestrahlung bzw. Radiumeinlage, 2 Tabletten kurz nach der Bestrahlung, 2 Tabletten 2 Stunden später, 2 Tabletten in 2-3 stündigem Abstand während der Radiumeinlage.		
Schiebeschachtel mit 10 Tabl. zu 0,1 g DM 0,90 Röhrchen mit 25 Tabl. zu 0,1 g DM 1,75		Handelsform und Preise
VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		Hersteller
(43 27 26 00)	ARp VVP 13/203	Pernaemyl forte
Hochwirksames Leberpräparat.		Bestandteile
Perniciöse Anaemie, Intoxikationen, Anaemien nach Blutverlusten.		Indikation
Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.		Dosierung
Packung mit 3 Amp. zu je 2 ccm DM 8,05 Klinikpackung mit 24 Amp. zu je 2 ccm für Private DM 41,20 für Kliniken DM 36,65		Handelsform und Preise
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller
(43 24 14 00)	A VVSx 03/207	Perscabit-Liniment
Sulfur. praec. 20,0%, Benzylbenzoat 1,0%, Halogenoxydiphenylmethan 0,2%, Lin. lan. 78,8%.		Bestandteile
Parasitäre Dermatosen, insbesondere Scabies.		Indikation
Perscabit wird an drei aufeinanderfolgenden Abenden eingerieben, wobei alle Hautfalten besonders gründlich zu behandeln sind. Am vierten Abend wird die Kur möglichst mit einem warmen Seifenbad beendet; notfalls genügt eine Körperreinigung auch durch Abwaschen mit warmem Wasser		Dosierung
Flasche mit ca. 150 g DM 2,40 Klinikpackung mit ca. 850 g für Private DM 9,82 für Kliniken DM 8,17		Handelsform und Preise
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		Hersteller

Perscabit-Salbe		(43 27 26 00)	A VVSx 03/207
Bestandteile	Sulfur praec. 10 0/0, 8-Naphthol 3,0 0/0, Halogenoxydiphenylmethan 1,0 0/0, Benzylbenzoat 0,74 0/0, Ungt. lanetti 85,26 0/0.		
	Indikation und Dosierung wie vorstehend.		
Handelsform und Preise	Glas mit ca. 150 g	DM 2,74	
	Klinikpackung mit ca. 850 g		
	für Private	DM 11,54	
	für Kliniken	DM 9,61	
Hersteller	VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		
Pervalen		(43 28 52 00)	A VVP 01/206
Bestandteile	Gewebsfreundliche Lösung aus 1,25 0/0 chlorierten Phenolhologenen, 15,5 0/0 höheren Alkoholen, 7,25 0/0 n-Propylalkohol, 0,6 0/0 Seife und 0,2 0/0 Duftstoffen.		
Indikation	Bei Dermatomykosen, Pyodermien, Ekzemen (bes. seborrhoische und sekundär infizierte Ekzeme), zur Antiseptik und Umgebungsdesinfektion bei Furunkeln und Abszessen.		
Dosierung	1 mal täglich unverdünnt auftragen mittels Wattebausch oder Mulläppchen. Feuchtschlag nicht statthaft. Nicht einreiben. Reinigung der erkrankten Hautstelle durch veget. Öl oder Paraffin, liqu. (nicht Wasser). Bei Furunkulose und Hautabszessen häufigere Anwendung.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 100 g	DM 1,80	
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau		
Pervitin		(43 21 48 00)	ABV VVP 14/200/201
Bestandteile	1-Phenyl-2-methylamino-propanhydrochlorid.		
Indikation	Kreislaufwirksames und psychisches Stimulans bei Hypotonie, Depressionen, Narkolepsie und in der Rekonvaleszenz, Heufieber, Rhinitis, Asthma bronchiale, Vergiftungen mit Schlafmitteln, Opiaten, CO ₂ , Enuresis nocturna und bei sonstigen allergischen Erkrankungen.		
Dosierung	Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 30 Tabl. zu 60 mg (5 0/0)	DM 1,76	
	Schachtel mit 6 Amp. zu 1 ccm (1,5 0/0)	DM 2,12	
	Klinikpackung m. 100 Amp. zu 1 ccm (1,5 0/0)		
Hersteller	VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		

(43 25 19 00)	ARp VVP 10/303	Pevaletten
Penicillin-Calcium 2000 IE, N-Sulfanylcarbamid-Calcium 0,1 g, Sacchar. lact. ad 0,5 g pro Tablette.		Bestandteile
Uterine Infektionen endogener und exogener Genese, besonders bakteriell bedingter Fluor und Kolpitis, fieberhafter Abort und frische Salpingitis. Zur Prophylaxe vaginaler Infektionen und zur Vorbehandlung von Portio-Karzinomen vor Radiumeinlagen.		Indikation
Alle 12-24 Stunden 1-2 Tabletten in die Scheide einzulegen.		Dosierung
Röhrchen mit 10 Tabl. DM 2,10		Handelsform und Preise
Röhrchen mit 20 Tabl. DM 3,75		
Klinikpackung mit 200 Tabl. DM 25,90		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 21 33 00)	A VVP 14/204	Phenan
Phenacetin 45%, Phenyldimethylpyrazolon 27%, Coffein 9%, Massa ad 100%.		Bestandteile
Bei Neuralgie, Migräne, rheumatischen Beschwerden, Infektionskrankheiten wie Grippe, Pneumonie usw.		Indikation
3 mal 1 - 2, für Kinder $\frac{1}{2}$ - 1 Tablette täglich.		Dosierung
Röhrchen mit 10 Tabl. DM 0,71		Handelsform und Preise
Röhrchen mit 20 Tabl. DM 1,18		
VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		Hersteller
(43 21 16 00)	ARp VVT 03/226	Philodorm
Cyclohexenyläethylbarbitursäure 0,2 g pro Tablette.		Bestandteile
Schlaflosigkeit aller Art, Erregungs- und Angstzustände, manisch-depressive Störungen, Neurosen, Hysterie, Tremor.		Indikation
$\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ Tabletten. Max.-Einzeldosis 0,4 g, Max.-Tagesdosis 1,2 g. Kinder $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ Tablette.		Dosierung
Packung mit 6 Tabletten DM 0,75		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 250 Tabletten DM 15,40		
VEB Promassol-Werk, Erfurt		Hersteller

Physiologische Kochsalzlösung 0,9 %/o		(43 25 45 00)	A VVP 07/748
Indikation	Subkutan bzw. intravenös bei schweren Wasserverlusten und Blutungen, Erschöpfungszuständen, besonders des Herzens.		
Dosierung	Für den Sprechstundenbedarf des Arztes.		
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Amp. zu 10,5 ccm	DM 2,75	
	Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10,5 ccm	DM 18,15	
	Packung mit 1 Amp. zu 250 ccm	DM 3,90	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Picurin II		(43 29 12 00)	A S 10/239
Bestandteile	Spezialauszug Panstabil von: Cereus grandiflorus 75 FD/ccm 6,0, Baryum carbonic. colloid. stabil in hom. Trit. 10,0, Ammonium vanadic. D3 10,0, Arnica D3 10,0, Sacchar. ad 100,0.		
Indikation	Bei Arterienverkalkung.		
Dosierung	3 stündlich 1 Tablette - auch bei vorgeschritt. Arteriosklerose zu nehmen.		
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 40 Tabl. zu 0,25 g	DM 1,05	
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Picurin III		(43 29 12 00)	A S 10/240
Bestandteile	Atropinum sulfuricum D5 10,0, Kal. phosph. D5 10,0, Calc. fluor. colloid. stabil. in hom. Trit. 10,0, Barium carbonic. colloid. stabil. in hom. Trit. 10,0, Sacchar. ad 100,0.		
Indikation	Bei Arterienverkalkung.		
Dosierung	In hartnäckigen Fällen von Arteriosklerose alle 3 Stunden 1 Tablette nehmen, evtl. 2 stündlich. Nach Besserung Stärke II wieder verwenden.		
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 40 Tabl. zu 0,25 g	DM 1,05	
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Placentol		(43 22 29 00)	A VVSx 03/213
Bestandteile	Extr. plac. v. recent. parat. 25,0 g, Ungt. lanetti ad 100,0. (1 g Placentol entspricht 1 g Frischplacenta).		
Indikation	Zur Lokalthherapie hormonell bedingter Störungen (z. B. klimakterische Dermatosen, unregelmäßige Zyklen, Angioneurosen und deren Folgezustände, Enuresis nocturna).		
Dosierung	Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Tube mit ca. 35 g	DM 4,79	
Hersteller	VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		

(43 29 12 00)	A S 10/241	Plantival-Dragees
Spezialauszüge conc. von: Avena sativa 10,0, Cannabis sat. 10,0, Passiflora 20,0, Valeriana 20,0, Lupulus 20,0, Sacchar. ad 100,0.		Bestandteile
Sedativum bei nervöser Erregbarkeit, nervösen Schlafstörungen und Föhnerkrankung.		Indikation
Morgens und mittags 1-2 Dragees vor den Mahlzeiten, abends je nach Bedarf 2-4 Dragees nehmen.		Dosierung
Packung mit ca. 50 Dragees zu 0,2 g DM 1,00		Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/242	Plantival Liquidum
100,0 Perkolat aus 10,0 Rad. Valerian. mit Spezialauszug Panstabil von: Avena sativa 40,0, Cannab. sat. 40,0, Passifl. 19,0, Aether 1,0.		Bestandteile
Sedativum bei nervöser Erregbarkeit, nervösen Schlafstörungen und Föhnerkrankung.		Indikation
3 mal täglich ca. 10 Tropfen in etwas Wasser nehmen; nach Bedarf abends oder nachts in stärkerer Dosis.		Dosierung
Flasche mit ca. 10 ccm DM 0,85		Handelsform und Preise
Flasche mit ca. 30 ccm DM 2,05		
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller
43 29 12 00)	A VVP 10/229, 230, 295	Plenosol 0, I u. II
Spezialauszug von Viscum album. Spezialanweisung beachten!		Bestandteile
Arthrosis deformans, Periarthritis humero-scapularis, Spondylosis deformans, Epicondylitis, Morbus Bechterew u. bei inoperablem Karzinom.		Indikation
Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.		Dosierung
Stärke 0 Packung mit 6 Amp. (200 Nekrose-Einheiten) . DM 1,75		Handelsform und Preise
Stärke I Packung mit 6 Amp. (2000 Nekrose-Einheiten) . DM 6,95		
Stärke II Packung mit 3 Amp. (20 000 Nekrose-Einheiten) DM 4,95		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Präzipitierendes Serum „Dessau“ (43 29 41 00) VVP 01	
Indikation	Zur forensischen und lebensmittelchemischen Untersuchung nach Uhlenhuth gegen Menschen-, Hühner-, Pferde-, Rinder-, Schaf- und Ziegenweiß. Abgabe je nach Vorräten.
Handelsform und Preise	Fläschchen mit 1 ccm DM 5,40
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau
Probronchin (43 23 14 00) A VVP 06/215	
Bestandteile	Calc. ammoniumsulfocresolicum 5%ig in sirupöser, aromatisierter Zuckerlösung.
Indikation	Zur Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane.
Dosierung	Erwachsene 2 Teelöffel bis 1 Eßlöffel, Kinder die Hälfte.
Handelsform und Preise	Flasche mit 120 g DM 1,55 Flasche mit 180 g DM 2,25
Hersteller	VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau
Pro-Expit (43 23 15 00) A VVA 01/210	
Bestandteile	Tabletten zu 0,6 g, enthaltend 0,1 g Adhaegon, ein physikalisch expektorierend wirkendes Proteinderivat. Alkaloid-, narkotikum- und alkoholfrei. Zuckerhaltig.
Indikation	Akute und chronische Bronchitiden, Lungenemphysem und Asthma bronchiale, Bronchiektasien und Lungenabszesse, schlecht lösende Pneumonien, tuberkulöse Erkrankungen der Lungen, soweit es sich darum handelt, eine leichtere Expektoration und Provokation von Sputum zu erzielen. Auf Grund der Zusammensetzung im allgemeinen nicht gegen Reizhusten wirksam.
Dosierung	Nach Bedarf mehrmals täglich 1 Tablette im Munde zergehen lassen.
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,6 g DM 1,00 Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu 0,6 g DM 26,55
Hersteller	VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden

(43 22 23 00)	ARp VVP 13/230/231	Proluton
Progesteron. Gynäkologische Blutungen, habitueller und drohender Abort, Dysmenorrhoe. Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.		Bestandteile Indikation Dosierung
Packung mit 3 Amp. zu je 5 mg/ccm DM 6,55 Packung mit 15 Amp. zu je 5 mg/ccm für Private DM 27,05 für Kliniken DM 24,— Packung mit 3 Amp. zu je 10 mg/ccm DM 11,80 Packung mit 15 Amp. zu je 10 mg/ccm für Private DM 48,55 für Kliniken DM 43,15		Handelsform und Preise
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller
(43 23 15 00)	VVT 03/212	Promassol-Dragees
Extr. Thym. 0,4, Extr. Gram. 0,4, Menthol 0,1, Ol. aether. 0,06, Sacch. ad 100. Husten und Heiserkeit. Schachtel mit ca. 50 g DM 0,75		Bestandteile Indikation Handelsform und Preise
VEB Promassol-Werk, Erfurt		Hersteller
(43 29 90 00)	VVT 03/206	Promassol-Salbe (Hautschutzsalbe)
Vaseletta 99,6, Ol. rosmar. 0,4. Zur Verhütung von Hautschäden. Kruke mit ca. 50 g DM 1,30 Klinikpackung mit 1000 g DM 14,70		Bestandteile Indikation Handelsform und Preise
VEB Promassol-Werk, Erfurt		Hersteller
(43 26 45 00)	A VVT 03/222	Promassolax
Diacetyl-bis-oxyphenylisatin 0,015 g pro Tabl. Mildes und sicher wirkendes Laxans. Vor dem Schlafengehen 1/2-2 Tabletten. Bei hartnäckigen Obstipationen bis zu 4 Tabletten.		Bestandteile Indikation Dosierung
Packung mit 20 Tabl. DM 0,65 Klinikpackung mit 400 Tabl. DM 6,85		Handelsform und Preise
VEB Promassol-Werk, Erfurt		Hersteller

Prontosil-Tabletten (43 25 21 00) ARp F 01/203	
Bestandteile	4-Sulfonamid-2', 4'-diaminoazobenzol.
Indikation	Angina, Erysipel, unspezifische Urethritis, Zystitis und alle anderen durch Streptokokken hervorgerufenen Erkrankungen Coli-Infektionen der Harn- und Gallenwege.
Dosierung	Tagesdosis 2 g bis max. 5 g täglich auf 3-4 Einzelgaben verteilen, 4 mal täglich wird 1 Tablette in reichlich Wasser, Tee oder Milch zum Zerfall gebracht und unter Umrühren rasch getrunken. Nach dem 3. Behandlungstag ist es zweckmäßig, die Tagesdosis um etwa 25% zu reduzieren. Längere Kuren dürfen nur unter ärztlicher Kontrolle unternommen werden.
Handelsform und Preise	Packung mit 20 Tabl. zu 0,5 g Prontosil DM 2,55 Klinikpackung mit 250 Tabl. zu 0,5 g Prontosil DM 22,20 Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu 0,5 g Prontosil DM 79,75 Packung mit 10 g Substanz Prontosil pulv. für die Rezeptur AEP DM 1,43 Klinikpackung mit 100 g Substanz Prontosil pulv. für die Rezeptur AEP DM 13,95
Hersteller	VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld
Prostagutt (43 29 12 00) A S 10/243	
Bestandteile	Spezialauszug aus: Rad. Urtic. 30,0, Populus tremuloides 60,0, Acid. picrin. D3 1,0, Alkohol 60% ad 100,0.
Indikation	Leichte bis mittlere Formen von Prostatahypertrophie, Dysurie und sekundäre Cystitis.
Dosierung	3 mal täglich ca. 10 Tropfen 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten nehmen.
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 10 ccm DM 1,15 Flasche mit ca. 30 ccm DM 2,75
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig
Provenoplex (43 29 12 00) A VVP 10/228	
Bestandteile	Lycopodium, Calc. fluorat. aa 0,08, Spart. scopar. Teep 25,0, Cupressus Teep 20,0, Frct. Hippocast. 8,0, Cort. Hamamel., Cort. Viburni opuli aa 3,0, Flor. Arnicae 2,0, Sacchar. et Massa ad 100,0.
Indikation	Bei chronischen Thrombosen, Varizen, Trombophlebitis.
Dosierung	3 mal täglich 2 Tabletten.
Handelsform und Preise	Packung mit 20 Tabl. DM 0,95
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul

(43 23 29 00)	A VVP 07/204	Pulmogeran-Salbe
Ol. Eucalypt. 0,2, Ol. Thymi 2,0, Ol. Pin. pumil. 2,0, Ol. Rosmar. 0,4, Ol. Terebinth. rect. 2,0, Salbengrundlage 93,4		Bestandteile
Bei allen katarrhalischen Erkrankungen der Atmungsorgane, hartnäckiger Bronchitis, krampfartigen Hustenanfällen, Keuchhusten und zur Erleichterung für Asthmatiker.		Indikation
Beiderseits des Brustbeines einreiben.		Dosierung
Tube mit 20 g DM 1,10		Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 500 g DM 16,25		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 25 42 00)	A VVA 02/773/774	Purostrophan (g-Strophanthin „Güstrow“)
1/4 bzw. 1/2 mg g-Strophanthin in 1 ccm physiol. Kochsalzlösung.		Bestandteile
Alle Formen von Herzinsuffizienz, insbesondere akute be- drohli. und digitalisrefraktäre Fälle, Angina pectoris, Co- ronarsclerose.		Indikation
Intravenöse Injektion nach ärztlicher Vorschrift.		Dosierung
Packung mit 5 Amp. zu 1 ccm Stärke I DM 1,15		Handelsform und Preise
Packung mit 10 Amp. zu 1 ccm Stärke I DM 2,10		
Packung mit 50 Amp. zu 1 ccm Stärke I DM 6,75		
Packung mit 5 Amp. zu 1 ccm Stärke II DM 1,35		
Packung mit 50 Amp. zu 1 ccm Stärke II DM 8,20		
VEB Kali-Chemie „Rhenania“, Berlin-Niederschöneweide		Hersteller
(43 25 42 00)	A VVA 02/210	Purostrophan liquidum „perlingual“
20 ccm baktericider Lösung von g-Strophanthin „Güstrow“ in Kapillartropfflasche, 12 Tropfen = 1 mg g-Strophanthin.		Bestandteile
Peroral: Zur Erhaltung erreichter Kompensation zur Kreis- laufunterstützung bei fieberhaften und Infektionskrankheiten. Hebung der Diurese.		Indikation
3 mal täglich 20-25 Tropfen.		Dosierung
Tropfflasche mit 20 ccm DM 2,15		Handelsform und Preise
Tropfflasche mit 100 ccm DM 8,55		
VEB Kali-Chemie „Rhenania“, Berlin-Niederschöneweide		Hersteller

Pyolysin (43 24 19 00) A VVP 01/216	
Bestandteile	Lokal immunisierendes antagonistisch wirkendes Filtrat aus Streptokokken-, Staphylokokken-, Coli- und Pyocyaneum-Bouillonkulturen konserviert, 2 Jahre verwendbar. Staatl. geprüft.
Indikation	Zur Lokalbehandlung und Immunisierung gegen Wundinfektionen, Furunkel, Pyodermie, Impetigo, Erysipel, Ulcus cruris, sekundär infizierte Ekzeme, Mastitis, Vulvitis, Wunden, Osteomyelitis, Empyem, Bauchfellentzündung, bei haemorrhoidalen Reizzuständen.
Dosierung	Akut: unverdünnt, bei subakuten und chronischen Fällen und bei fortschreitender Heilung 1:1 bis 1:4 mit abgekochtem Wasser verdünnt. Bei tiefen und großflächigen Wunden unverdünnt. Verwendung auch zu Berieselungen, Spülungen und als Gurgelmittel. 1 bis mehrmals täglich.
Handelsform und Preise	Amp.-Flasche mit 20 ccm DM 1,00 Karton mit 5 Amp.-Flaschen mit je 20 ccm DM 4,70 Flasche mit 100 ccm für Private DM 4,00 für Kliniken DM 3,25
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau

Pyolysin-Salbe (43 24 19 00) A VVP 01/214	
Bestandteile	25,0 % Pyolysin flüssig, 6,9 % Zinkoxyd, 0,5 % Acid. salicylic., 3,0% Ol. Ped. Tauri, 64,6% Salbengrundlage c. aq.
Indikation	Zur Lokalbehandlung von Pyodermien und Wundinfektionen, Furunkeln, Folliculitis, Impetigo, Mastitis, Ulcus cruris, sekundär infizierten Ekzemen, haemorrhoidalen Reizzuständen, Insektenstichen.
Dosierung	Einreibungen, Verbände, 1 bis mehrmals täglich.
Handelsform und Preise	Kruke mit 10 g DM 0,75 Kruke mit 20 g DM 1,30 Kruke mit 100 g für Private DM 4,20 für Kliniken DM 3,40
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau

(43 26 52 00)	A VVP 07/220	Pyrantine
Thymol 0,05, Acid. salicylic. 0,1, Ol. Menth. pip. 0,05, Ol. Caryophyll. 0,05, Tinct. Jodi DAB 6 0,25, Acid. boric. piv. 0,12, Bolus alba 39,38, Glycerin. DAB 6 60,0		Bestandteile
Antiphlogisticum.		Indikation
Äußerlich zu Umschlägen.		Dosierung
Dose mit 300 g DM 2,30		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 45 90 00)	ARp VVP 02	Pyrasid und Pyrasid forte
Heilfiebertherapeuticum aus spezif. Typhusstämmen.		Bestandteile
Zur Heilfiebertherapie der Neuro-Lues, Gonorrhoe, Typhus abdominalis, Asthma bronchiale, Lähmungen nach Polyo-myelitis anterior, sowie entzündliche Krankheiten in der Gynäkologie.		Indikation
In etwa 3 tägigen Abständen i. v. mit 0,2-0,6 beginnend je nach Alter und zu erzielendem Effekt.		Dosierung
Packung mit 5 Amp. zu 1 ccm DM 5,70		Handelsform und Preise
Packung mit 5 Amp. zu 1 ccm forte DM 7,50		
VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		Hersteller
(43 28 19 00)	VVP 05/230	Pyrolenin liquid.
Thymol 0,223, Acid. formic. 0,3, Pyrolenin 0,06, Spir. 35 % ad 100,0. (Pyrolenin=Pyridin 61,7%, Safrol 37,0%, Ol. Tereb. 1,3%).		Bestandteile
Schmerz- und blutstillendes, stark antiseptisches Spezificum zur Behandlung von Verbrennungen, Verbrühungen, Schnitt-, Riß- und Quetschwunden sowie z. Beschleunigung der Granulationsbildung bei schlecht heilenden Wunden.		Indikation
Flasche mit 30 ccm DM 0,66		Handelsform und Preise
Flasche mit 100 ccm DM 1,85		
Flasche mit 250 ccm DM 4,25		
Flasche mit 500 ccm DM 7,70		
Klinikpackung mit 1000 ccm DM 12,40		
VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		Hersteller

Redskin (z.Zt.beschränkt lieferbar)		(43 29 12 00)	A VVP 10/227
Bestandteile	Acid. formic. pur. 5,8, Aether acetic. DAB 6, Carbon. tetrachlorat. aa 43,35, Ol. Sinapis artif. 2,0, Chloroform DAB 6 5,5.		
Indikation	Gegen rheumatische und neuralgische Affektionen, ferner zur Ableitung bei Angina pectoris, Pleuritis und anderen entzündlichen Prozessen.		
Dosierung	Dosierung nach Spezialanweisung.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 10 ccm DM 0,65		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Reducto		(43 23 22 00)	A VVP 14/203
Bestandteile	Chininsalze 9,5 ‰, Kaliumjodid 3,56 ‰		
Indikation	Prophylacticum geg. Erkältungskrankheiten, Angina, Grippe Zur Behandlung der Thyreotoxicosen vor und nach Schilddrüsenresektionen.		
Dosierung	3 mal täglich 1-2 Tabl. in einem Schluck Wasser nehmen.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 10 Tabl. DM 0,55 Röhrchen mit 25 Tabl. DM 1,12		
Hersteller	VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		
Regulaxier-Tabletten		(43 26 42 00)	A VVT 02/214
Bestandteile	Phenolphthalein 20 ‰, Vanillin 0,25 ‰, Saccharum 65 ‰, Bindemittel ad 100 ‰		
Indikation	Abführmittel.		
Dosierung	Erwachsene 1/2-1 Tabl., Kinder die Hälfte, vor dem Schlafengehen oder morgens nüchtern zerkaut schlucken.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 12 Tabl. zu 0,6 g DM 0,40		
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		
Reinlecithin „Bernburg“ m. Zucker Faszikelform		(43 27 59 00)	VVSA 01/201
Bestandteile	Reines Pflanzenlecithin „Bernburg“ mit Zucker, verformt zu Faszikeln. Lecithinanteil ca. 1,5 g pro Stück.		
Indikation	Tonikum und Roborans.		
Handelsform und Preise	Karton mit 42 Faszikeln DM 2,30 Karton mit 80 Faszikeln DM 4,40		
Hersteller	VEB Eumarhal-Werk Bernburg		

(43 27 59 00)	VVSA 01/200	Reinlecithin „Bernburg“ o. Zucker, Faszikelform
Reines Pflanzenlecithin „Bernburg“, ungezuckert, verformt zu Faszikeln. Lecithinanteil ca. 2 g pro Stück.		Bestandteile
Tonikum und Roborans (bes. für Diabetiker).		Indikation
Karton mit 32 Faszikeln DM 2,—		Handelsform und Preise
Karton mit 60 Faszikeln DM 3,65		
VEB Eumarhal-Werk Bernburg		Hersteller
(43 26 72 00)	A VVOr 02/223	Rektalfalicain (Suppositorien)
88,9 % Lasupol, 4,44 % Falicain, 4,44 % Oleum Pedum Tauri, 2,22 % Bism. subgallic.		Bestandteile
Haemorrhoiden, Anal-Fissuren, Anal-Rhagaden, Pruritus ani und zur Unterstützung peroraler Wurmkuren.		Indikation
Je 1 Supp. morgens und abends nach dem Stuhlgang einführen.		Dosierung
Schachtel mit 12 Supp. DM 1,94		Handelsform und Preise
VEB Fahlberg-List, Magdeburg		Hersteller
(43 21 61 00)	A VVA 02/203	Rheuma-Fluid
Acid. formic. 1,4, Ol. Eucalypt. 0,4, Methyl. sal. 0,5, Thymol 0,1, Spir. vin. 67,5, Aqua dest. 30,1		Bestandteile
Bei Muskel-, Gelenk- und Nervenschmerzen.		Indikation
Zum Einreiben.		Dosierung
Flasche mit 50 ccm DM 1,25		Handelsform und Preise
und Sprit-Zuschlag DM 0,23		
Flasche mit 100 ccm DM 2,10		
und Sprit-Zuschlag DM 0,45		
VEB Kali-Chemie „Rhenania“, Berlin-Niederschöneweide		Hersteller

Rheumatox		(43 21 63 00)	A VVV 01/204
Bestandteile	Methyl. salicyl. 1,0, Ol. Eucalypti 1,0, Ol. Rosmarini 1,0, Acid. salicyl. 1,5, Extr. Hyperici 15,0, Salbengrundlage (Cera Lanetti, Vaselinum, Aqua) 80,5		
Indikation	Neuritis, Arthritis, Ischias, Rheuma, Gicht.		
Dosierung	Man bringt eine ausreichende Menge auf die schmerzende Körperstelle und reibt sie durch kräftiges Massieren in die Haut ein. Danach befeuchtet man die Finger mit etwas Wasser und setzt das Massieren noch eine Zeit lang fort.		
Handelsform und Preise	Glasdose mit 50 g DM 1,30		
Hersteller	VEB Aetherea, Leipzig		
Rhinitin-Emulsion		(43 23 61 00)	A VVT 03/207
Bestandteile	Ephedrin hydrochl. 1,4, Menthol 0,175, Acid. boric. 2,0, Emulsion ad 100,0		
Indikation	Schnupfen, Nasenkatarrhe, Heuschnupfen.		
Handelsform und Preise	Pipettenflasche mit 10 ccm DM 1,—		
Hersteller	VEB Promassol-Werk, Erfurt		
Rhinitin-Emulsion mild		(43 23 61 00)	A VVT 03/208
Bestandteile	Ephedrin hydrochl. 1,4, Acid. boric. 2,0, Emulsion ad 100,0		
Indikation	Bei Rhinitiden in der Kinderpraxis.		
Handelsform und Preise	Pipettenflasche mit 10 ccm DM —,95		
Hersteller	VEB Promassol-Werk, Erfurt		
Rhinogeran-Nasensalbe		(43 23 62 00)	A VVP 07/208
Bestandteile	Ephedrin 0,5, Ol. Eucalypti 0,2, Camphora synth. 0,4, Ol. Thymi 0,4, Ol. Pini pumil 1,0, Salbengrundlage 97,5		
Indikation	Bei Katarrhen der Nasenschleimhaut, besonders der Kinder.		
Dosierung	In die Nase einführen.		
Handelsform und Preise	Tube mit 10 g DM 0,77		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		

(43 23 62 00)	A VVP 07/207	Rhinogeran- Nasensalbe verstärkt mit Menthol
Menthol. 0,5, Ephedrin. 0,5, Camphora synth. 0,4, Ol. Thymi 0,4, Ol. Eucalypti 0,2, Ol. Pini pumil. 1,0, Salbengrundlage 97,0		Bestandteile
Bei Katarrhen der Nasenschleimhaut Erwachsener.		Indikation
Tube mit 10 g	DM 0,80	Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 24 19 00)	A VVP 02/208	Rhinolyt
Antivirus-Emulsion mit Mentholzusatz 0,2 %		Bestandteile
Bei katarrhalischen Erkrankungen der oberen Luftwege.		Indikation
Flasche mit 10 g	DM 1,—	Handelsform und Preise
VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		Hersteller
(43 27 69 00)	A VVP 10/293/294	Rutabion
Reines krist. Rutin (Quercetin-Rutinosid).		Bestandteile
Bei gesteigerter Kapillarbrüchigkeit und erhöhter Mem- brandurchlässigkeit, Ödembereitschaft, Gefäßschäden bei Hypertonie, Blutungsneigung verschiedener Genese, Krank- heitserscheinungen hyperergischer Natur, seröse Entzün- dungen, toxische Diphtherie und akute Glomerulonephritis.		Indikation
3-4 mal täglich 0,05-0,1 g bzw. 1-2 Amp. i. m. oder i. v.		Dosierung
Packung mit 10 Tabl. zu 0,05 g	DM 1,20	Handelsform und Preise
Packung mit 20 Tabl. zu 0,05 g	DM 1,85	
Packung mit 10 Tabl. zu 0,1 g	DM 1,75	
Packung mit 20 Tabl. zu 0,1 g	DM 3,05	
Packung mit 6 Amp. zu 2,2 ccm (1 Amp.=0,1 g Rutin)	DM 3,60	
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Rutanol 20		(43 26 56 00)	A VVP 05/221/226	•
Bestandteile	Bismut. subnitric. 15,0, Cinis plant. 20,0, Alum. hydric. 10,0, Terra silic. 15,0, Calc. carbonic. 10,0, Calc. biphosphoric. 5,0, Magnes. carbonic. 15,0, Magnes. peroxydat. 10,0			
Indikation	Bei Magen- und Darmleiden, besonders Ulcus ventr. et duodeni.			
Dosierung	Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, 2-3 mal täglich kurze Zeit vor den Hauptmahlzeiten etwa 1/2 Teelöffel voll Pulver oder 1 Tabl. einnehmen und etwas Flüssigkeit nachtrinken oder die entsprechende Pulvermenge vorher mit der Flüssigkeit (lauwarmes Wasser, Kamillentee, Kaffee) anrühren. Je nach dem Grad einer evtl. auftretenden abführenden Wirkung kann die Dosis verringert oder erhöht werden.			
Handelsform und Preise	Packung mit 25 g Pulver DM 1,40 Packung mit 30 Tabl. zu 0,5 g DM 1,30			
Hersteller	VEB Chemidroph-Werk Chemnitz			
Sacutil-Borglycerincreme		(43 28 16 00)	VVP 05/207	
Bestandteile	Acid. boric. plv. 2,0, Glycerin 4,0, Adeps lan. anhydr. 18,0, Paraff. liq. 15,0, Parf. 0,5, Emulgat. 9,0, Ceresin. 5,0, Aqua dest. 46,5			
Indikation	Hautschutz bei rissiger und spröder Haut.			
Handelsform und Preise	Tube mit ca. 35 g DM 0,88			
Hersteller	VEB Chemidroph-Werk Chemnitz			
Sacutil-Kindercreme		(43 28 16 00)	VVP 05/224	
Bestandteile	Glykokoll 1,0, Acid. boric. 2,0, Zinc. oxydat. 20,0, Talcum 10,0, Salbengrundlage auf Wollfettbasis 67,0			
Indikation	Kinderwundbehandlung.			
Handelsform und Preise	Tube mit ca. 35 g DM 1,17 Klinikpackung mit ca. 500 g DM 5,60			
Hersteller	VEB Chemidroph-Werk Chemnitz			
Sacutil-Kinderpuder		(43 28 19 00)	VVP 05/225	
Bestandteile	Glykokoll 1,0, Acid. boric. 1,0, Zinc. oxydat. 10,0, Talcum 88,0			
Indikation	Kinderwundbehandlung.			
Handelsform und Preise	Streudose mit ca. 100 g DM 1,12 Klinikpackung mit ca. 1000 g			
Hersteller	VEB Chemidroph-Werk Chemnitz			

(43 28 31 00)	ARp VVP 09/233	Sanaestin
<p>Jenacain (p-Aminobenzoyldiaethylaminoethanol - hydrochlorid DAB 6) 0,1 g, Acid. phenylaethylbarbituric. 0,05 g, Atropin. sulfuric. 0,0003 g in 10 ccm Lösung.</p> <p>Zur Heilanalgesie: Asthma bronchiale, Ulcus ventriculi et duodenti, allergische Hauterkrankungen, periphere Durchblutungsstörungen aller Art, Neuralgie, Neuritis, Migräne u. andere Schmerzzustände.</p> <p>Mit kleinen Mengen von 2-3 ccm die individuelle Verträglichkeit am Patienten feststellen. Dann 5-10 ccm sehr langsam intravenös (etwa 1 ccm pro Minute).</p> <p>Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm DM 6,50</p> <p>VEB Jenapharm, Jena</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 21 61 00)	A VVT 02/207	Salva nos
<p>Ol. aetherea 2,5 %, Camphor. 0,5 %, Spirit. 85 Vol.-%, Aqua dest. ad 100,0 %</p> <p>Gliederschmerzen, Verstauchungen, Ischias und Nervenschmerzen.</p> <p>Einreibung.</p> <p>Flasche mit ca. 40 ccm DM 1,20 und Sprit-Zuschlag DM 0,11</p> <p>VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 26 71 00)	A VVP 05/222	Sanal-Haemo-Salbe
<p>Allylthiocarbamid 1,0, Natr. salicylic. 3,0, p-Aminobenzoesäureaethylester 5,0, Zinc. oxydat. 10,0, Camphora 1,0, Balsam. peruvian. 2,0, Salbengrundlage auf Wollfettbasis 78,0</p> <p>Schmerzhafte Haemorrhoiden.</p> <p>Die Salbe wird auf Körpertemperatur erwärmt und mehrmals täglich, insbesondere abends, in die Afteröffnung eingestrichen oder mit der Kanüle eingeführt.</p> <p>Tube mit Spezialkanüle mit ca. 35 g DM 1,35</p> <p>VEB Chemidropa-Werk Chemnitz</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 26 72 00)	A VVP 05/223	Sanal-Haemo-Zäpfchen
<p>Allylthiocarbamid 1,0, Natr. salicylic. 1,5, p-Aminobenzoesäureaethylester 2,5, Zinc. oxydat. 5,0, Suppobasin 90,0</p> <p>Schmerzhafte Haemorrhoiden.</p> <p>1 Zäpfchen abends nach kurzem Benetzen mit Wasser einführen.</p> <p>Packung mit 5 Stück zu 2,3 g DM 0,88 Packung mit 10 Stück zu 2,3 g DM 1,35</p> <p>VEB Chemidropa-Werk Chemnitz</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>

Sanopin		(43 23 52 00)	A VVV 01/203
Bestandteile	Ol. Eucalypti 10,0, Ol. Pini pumil 5,0, Ol. Pini silvestr. 4,0, Ol. Pini sibiric. 25,0, Ol. templinum 1,0, Ol. terebinthinae 30,0, Terpinolum 25,0		
Indikation	Bronchitis, Asthma, Laryngitis.		
Dosierung	Unter Verwendung eines Inhalators. Falls ein Inhalator nicht vorhanden, gibt man 5-10 Tropfen in eine Schale und übergießt sie mit einem halben Liter kochenden Wasser.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 25 g DM 2,15		
Hersteller	VEB Aetherea, Leipzig		
Santa Flora		(43 29 12 00)	A VVP 10/226
Bestandteile	Arnica e flor. Ø 12,6, Ephedra vulg. Ø 2,5, Grindelia Ø 1,8, Lobelia Ø, Camphora synth. D 3 aa 0,4, Ipecacuanha Ø, Belladonna Ø aa 0,12, Tartar. stibiat. 0,04, Stramonium Ø 0,02, Craetaegus Ø 82,0		
Indikation	Bei Asthma bronchiale, bes. im Kindesalter; spastischer Bronchitis und Tracheobronchitis.		
Dosierung	3 mal täglich 15 Tropfen, im Anfall 40 Tropfen auf etwas Zucker. Auch zur Inhalation geeignet.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 30 ccm DM 1,70 Flasche mit 500 ccm DM 16,90		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Santonin „Schering“		(43 26 61 00)	ARp VVP 13/765/766
Bestandteile	Anthelminticum aus Artemisia maritima.		
Indikation	Bei Askariden (Spulwürmer).		
Dosierung	Auf Grund der Toxizität des Santonin muß sich der Patient genau nach den Dosierungsvorschriften des Arztes richten. Wir empfehlen für Kuren mit Santonin „Schering“ folgende Dosen: Der Erwachsene nimmt am 1. Tag 3 mal 2 Tabl. à 25 mg notfalls am 1. Tag 3 mal 4 Tabl. à 10 mg am 2. Tag 2 mal 2 Tabl. à 25 mg notfalls am 2. Tag 2 mal 4 Tabl. à 10 mg Ein zehnjährig. Kind nimmt am 1. Tag 3 mal 2 Tabl. à 10 mg, am 2. Tag 2 mal 2 Tabl. à 10 mg Ein 3-4-jähriges Kind nimmt am 1. Tag 3 mal 1 Tabl. à 10 mg, am 2. Tag 2 mal 1 Tabl. à 10 mg Für dazwischenliegende Lebensalter ist die Dosis entsprechend zu variieren. Die gesüßten Tabl. können zerkaut oder mit wenig Wasser geschluckt werden.		
Handelsform und Preise	Kinderpackung mit 10 Tabl. zu je 10 mg DM 0,85 Originalpackg. mit 10 Tabl. zu je 25 mg DM 1,65		
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		

(43 24 19 00)	A VVP 14/209	Scaben
<p>Paraff. liq. 81,0, Benzylbenz. 12,16, Acid. benzoic. 0,68, β-Naphthol 0,85, Methyl. salicyl. 3,38, Aether 2,03</p> <p>Bei nervösem Hautjucken u. parasitären Hauterkrankungen. Warmes Bad des ganzen Körpers mit kräftiger Abseifung. Einreiben des ganzen Körpers mit Scaben, innerhalb 24 Std. 3 mal (besonders zu behandeln sind Hände, Füße, Achseln, Gesäß, Geschlechtsteile). Die Einreibung muß an den beiden folgenden Abenden wiederholt werden.</p> <p>An dem der letzten Einreibung folgenden Tag ein warmes Reinigungsbad nehmen. Bett- und Leibwäsche nach der Kur wechseln und gründlich mit Seifenwasser kochen.</p> <p>Flasche mit 100 g DM 1,50</p> <p>VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 45 90 00)	ARp VVP 02	Scarla-Toxoid
<p>Staatl. geprüfter Scharlach-Streptokokkentoxoid.</p> <p>Depotimpfstoff zur aktiven Immunisierung gegen Scharlach. 1 ccm enthält 20 000 HE.</p> <p>Karton mit 2 Amp. zu 1 ccm DM 2,31</p> <p>VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 21 49 00)	ABV VVP 09/231	Scomodrin
<p>Scopolamin. hydrobromic. 0,0005 g, Morphin. hydrochloric. 0,01 g, Ephedrin. hydrochloric. 0,025 g.</p> <p>Zur Vorbereitung bei der Narkose und Lokalanästhesie, bei motorischen und psychischen Erregungszuständen und als Schmerzstillungsmittel, zur Erzeugung von Dämmer Schlaf. Zur Erzielung schnellster Wirkung intravenös 0,5-1 ccm sehr langsam injizieren, sonst meist subkutan.</p> <p>Packung mit 10 Amp. zu 1 ccm DM 4,30</p> <p>Klinikpackung mit 50 Amp. zu 1 ccm DM 17,80</p> <p>VEB Jenapharm, Jena</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 21 49 00)	ARp VVP 07/769	Scopolamin. hydrobrom. Amp. 0,0005
<p>Scopolamin. hydrobrom. 0,0005 g, n/10-Salzsäure 0,0011 g, Aqua dest. 1,09 g pro Amp.</p> <p>Zur Beruhigung.</p> <p>Im allgemeinen 1 Amp. langsam subkutan injizieren.</p> <p>Packung mit 10 Amp. zu 1,1 ccm DM 1,40</p> <p>VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>

Secatropin-Tabletten (z. Zt. beschränkt lieferbar)		(43 25 43 00)	ARp VVP 07/225
Bestandteile	Bellatotal 0,0001 g, Extr. Sec. corn. spiss. (1,5% Ergotin) 0,022 g, Acid. phenyläthylbarbitur. 0,02 g pro Tabl.		
Indikation	Bei nervöser Übererregbarkeit, neurovegetativen Störungen, Hyperthyreose.		
Dosierung	Individuell täglich 2-5 Tabl. über den Tag verteilt.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 25 Tabl. zu 0,2 g DM 1,85 Glas mit 100 Tabl. zu 0,2 g DM 5,30		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Siccoform		(43 23 51 00)	VVP 14/205
Bestandteile	Paraformaldehyd 1,2 %, Acid. citr. 0,8 %, Saccharum 95,5 %		
Indikation	Bei Rachen- und Kehlkopfkatarrhen, prophylaktisch bei Angina, Grippe und Erkältungskrankheiten.		
Dosierung	Stündlich 1-2 Tabl. langsam im Munde zergehen lassen.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 50 Tabl. DM 1,02		
Hersteller	VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		
Silargetten		(43 23 55 00)	A VVA 01/212
Bestandteile	Schwerlösliche Pastillen mit 10 % Silargel-Heyden (Chlorsilber-Kieselsäure-Gel).		
Indikation	Das moderne Prinzip der Adsorptiv-Desinfektion der Mund- u. Rachenhöhle bei Diphtherie, Grippe, Anginen, Scharlach, Pharyngitis, Nasopharyngitis, Laryngitis, Stomatitis, Gingivitis, nach Tonsillektomien usw. Besonders geeignet für die Kinderpraxis.		
Dosierung	Zur Prophylaxe und Therapie. Stündlich 1-2 Silargetten langsam im Munde zergehen lassen.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit ca. 40 Stück DM 0,95 Klinikpackg. mit 500 g (ca. 1000 Stück) DM 16,65		
Hersteller	VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		
Siliphen (Wundstreupulver)		(43 28 19 00)	A VVP 15/219
Bestandteile	Phenol-Campher n. Chlumsky 1,0, Urea 11,0, Acid. silicic. colloid. et crist. 88,0		
Indikation	Bei therapieresistenten Wunden, Osteomyelitiden, Decubitus, Ulcus cruris.		
Handelsform und Preise	Glas mit 50 g DM 2,05 Klinikpackung mit 250 g DM 3,20		
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig		

(43 29 12 00)	A VVP 10/225	Sinusitan
Mangan. peroxyd., Mangan. metallic., Stib. sulfurat. nigr. D 1, Hydrarg. chrom. oxyd. D 1 aa 0,015, Mangan. chlorat., Kal. jodat. D 1 aa 0,01, Cuprum metallic. D 1 0,1, Saccharum et Massa ad 100,0		Bestandteile
Bei Sinusitis Ozaena, chronischer Rhinitis.		Indikation
3-4 mal täglich 1 Tabl.		Dosierung
Packung mit 30 Tabl.	DM 1,70	Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 23 29 00)	A VVP 14/206	Siran
Kal. sulfogujacolicum 3 ‰, Extr. Thymi 0,5 ‰, Thymol 0,002 ‰, Ol. Menthae 0,04 ‰, Ephedrin hydrochlorid 0,159 ‰, Sacchar. 48,0 ‰, Aqua dest. ad 100,0 ‰		Bestandteile
Bei katarrhalischen Erkrankungen der Atmungsorgane, akute und chronische Bronchitiden, Lungenerkrankungen im Anfangsstadium, Grippe.		Indikation
Erwachsene täglich 3-4 Teelöffel, Kinder täglich 1-3 Kaffeelöffel.		Dosierung
Flasche mit 185 g	DM 1,50	Handelsform und Preise
VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		Hersteller
(43 23 29 00)	A VVP 14/207	Siran-Pastillen
Kal. sulfogujacolicum 5 ‰, Ephedrin hydrochlorid 0,3 ‰, Succ. liquirit. 3 ‰, Sacchar. 76 ‰, Massa ad 100,0 ‰		Bestandteile
Bei katarrhalischen Erkrankungen der Atmungsorgane, akute und chronische Bronchitiden, Grippe.		Indikation
4-5 mal täglich 2 Pastillen langsam auf der Zunge zergehen lassen.		Dosierung
Röhrchen mit 25 Pastillen	DM 0,80	Handelsform und Preise
VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		Hersteller
(43 23 29 00)	A VVP 14/208	Siran-Tropfen
Kalium sulfogujacolicum 5 ‰, Extr. Thymi 15 ‰, Saponin 0,3 ‰, Succ. liquirit. 0,5 ‰, Ephedrin hydrochlorid 0,75 ‰, Sacchar. 52 ‰, Aqua dest. ad 100,0 ‰		Bestandteile
Bei Husten, Bronchopneumonie, Asthma bronchiale, Grippehusten, Reizhusten.		Indikation
3 mal täglich 15-20 Tropfen auf Zucker verdünnt; Kinder die Hälfte.		Dosierung
Flasche mit 20 g	DM 0,71	Handelsform und Preise
VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		Hersteller

Spalt-Tabletten		(43 21 33 00)	A VVP 11/200
Bestandteile	Phenacetin 0,2, Dimethyloxichinin 0,1, Dimethylamino-phenyl-dimethylpyrazolon 0,05, Phenylglykolsäurebenzylester 0,05, Coffein 0,05, Ephedrin 0,003		
Indikation	Analgeticum und Antipyreticum, bei periodischem Unbehagen, Alkoholabusus, fieberhaften Erkrankungen.		
Dosierung	1-2 Tabl. ganz oder in Wasser gelöst nehmen. (Bei leerem Magen schnellere Wirkung).		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 10 Tabl. DM 0,65		
Hersteller	VEB Pharm. Werk Pankow, Berlin-Pankow		
Speton		(43 24 41 00)	VVP 14/202
Bestandteile	Natr. p-toluolsulfonchloramid 0,5 %, Dioxybernsteinsäure 10,5 %, Natr. hydrocarb. 11 %, Sacch. lact. 46,5 %		
Indikation	Gynaekologisches Desinfiziers und Antisepticum, anticonceptionelles Mittel.		
Dosierung	Vor Gebrauch Tabl. kurz zuvor anfeuchten, tief in d. Scheide einführen. Bei Spülungen 2 Tabl. in 1/2 Ltr. Wasser auflösen.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 12 Tabl. DM 2,54		
Hersteller	VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		
Staphylo tropin „Weißensee“		(43 41 10 00)	ARp VVP 02
Bestandteile	Staphylokokkenvakzine mit immunisationsfördernden Organextrakten, konserviert, 2 Jahre verwendbar. Staatl. geprüft.		
Indikation	Alle durch B-Staphyl. bedingten Erkrankungen der Haut und ihrer Anhangsgebilde.		
Dosierung	In etwa 3 tägigen Abständen i. m. oder i. v. je 1 ccm mit steigender Keimzahl.		
Handelsform und Preise	Karton mit 5 Amp. zu je 1 ccm mit 50, 100, 200, 350 und 500 Mill. Keimen/ccm DM 4,35		
Hersteller	VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		

(43 41 10 00)	VVP 01	Staphysol „Dessau“
Gereinigtes Staphylokokkentoxid zur Immunisierung bei Staphylokokken-Infektionen.		Bestandteile
Acne vulgaris, Furunkulose, Karbunkel (Aussaatprophylaxe), Schweißdrüsenabszesse, rezidivierende Hordeola, Impetigo contagiosa staphylogener schwerer Form, Folliculitis barbae, Osteomyelitis (evtl. Kombinationsbehandlung mit Penicillin), staphylogene Phlegmonen und Entzündungen, staphylokokkeninfizierte Empyeme u. Fisteln, Kieferzysten, Prophylaxe bei Gefahr der Bildung weiterer Zahngranulome.		Indikation
1. Inj. 0,25 ccm, 2. Inj. 0,5 ccm, 3. Inj. 0,75 ccm, 4. und weitere Inj. 1 ccm für den allgem. Gebrauch streng sbk. (nicht subfascial).		Dosierung
Amp.-Flasche mit 3 ccm DM 2,85		Handelsform und Preise
VEB Serum-Werk Dessau		Hersteller
(43 25 42 00)	ARp VVP 07/773/774	g-Strophanthin 0,25 u. 0,5 mg
Cardiotonicum zur i. v. Injektion.		Indikation
Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.		Dosierung
Schachtel mit 10 Amp. zu 0,25 mg : 1,1 ccm DM 2,10		Handelsform und Preise
Schachtel mit 30 Amp. zu 0,25 mg : 1,1 ccm DM 4,40		
Klinikpackung mit 50 Amp. zu 0,25 mg : 1,1 ccm DM 6,85		
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 0,25 mg : 1,1 ccm DM 13,40		
Schachtel mit 10 Amp. zu 0,5 mg : 1,1 ccm DM 2,45		
Schachtel mit 30 Amp. zu 0,5 mg : 1,1 ccm DM 5,20		
Klinikpackung mit 50 Amp. zu 0,5 mg : 1,1 ccm DM 8,25		
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 0,5 mg : 1,1 ccm DM 15,70		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

k-Strophanthin 0,25 u. 0,5 mg		(43 25 42 00)	ARp VVP 07/777/778
Indikation	Cardiotonicum zur i. v. Injektion.		
Dosierung	Dosierung nach ärztlicher Verordnung.		
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Amp. zu 0,25 mg : 1,1 ccm DM 2,10 Klinikpackung mit 100 Amp. zu 0,25 mg : 1,1 ccm DM 11,90 Packung mit 10 Amp. zu 0,5 mg : 1,1 ccm DM 2,45 Klinikpackung mit 100 Amp. zu 0,5 mg : 1,1 ccm DM 14,25		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Strophantose		(43 25 42 00)	ARp VVA 02/208/209
Bestandteile	$\frac{1}{4}$ bzw. $\frac{1}{2}$ mg g-Strophanthin in 10 ccm 20%iger steriler Calorose-Lösung.		
Indikation	Alle Fälle cardialer Insuffizienz, Herzklappenfehler, Herzmuskel-Erkrankungen, Angina pectoris, bei schlechter Diurese.		
Dosierung	Je bedrohlicher der Zustand des Herzens ist, um so kleiner soll die Dosis sein. In der Regel sind zu Behandlungsbeginn nicht höhere Dosen als 1 Ampulle mit 0,25 mg zu wählen. Die Injektion soll nicht vor Ablauf von 24 Stunden wiederholt werden.		
Handelsform und Preise	Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm Stärke I $\frac{1}{4}$ mg DM 2,50 Klinikpackung mit 50 Amp. zu 10 ccm Stärke I $\frac{1}{4}$ mg DM 17,44 Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm* Stärke II $\frac{1}{2}$ mg DM 2,85 Klinikpackung mit 50 Amp. zu 10 ccm Stärke II $\frac{1}{2}$ mg DM 18,67		
Hersteller	VEB Kali-Chemie „Rhenania“, Berlin-Niederschöneweide		

(43 26 30 00)	ARp VVP 07/780/782	Strychnin. nitricum 0,001 u. 0,003 g
<p>Als allgemeines Tonikum, besonders bei Infektionskrankheiten, Lähmungen, Atonie der Blase und des Magen-Darm-Traktus, Enuresis nocturna.</p> <p>Zur sbk. Injektion nach ärztlicher Verordnung.</p> <p>Schachtel mit 10 Amp. zu 1,1 ccm . . . DM 1,05 Klinikpackung mit 100 Amp. zu 1,1 ccm . . . DM 6,56</p> <p>VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul</p>		<p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 28 21 00)	ARp VVS 01/215	Styptan
<p>Spezifische Wirkstoffe des Rückenmarks.</p> <p>Lungen- und Magenblutungen, Blutungen des Urogenitalsystems, Blutungen aus Mund, Nase, Ohr, postoperative Blutungen, gynaekologische Blutungen, haemorrhagische Zustände.</p> <p>1-3 ccm intramuskulär oder intravenös. Diese Menge kann bei Bedarf innerhalb 24 Stunden noch einmal gegeben und 24 Stunden nach der letzten Injektion wiederholt werden. Styptan ist langsam zu injizieren. In der chirurgischen und gynäkologischen Praxis wird empfohlen, wenn möglich die Injektion 3-6 Stunden vor dem geplanten Eingriff vorzunehmen.</p> <p>Schachtel mit 6 Amp. zu 1 ccm . . . DM 5,30 Schachtel mit 20 Amp. zu 1 ccm . . . DM 14,60</p> <p>VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 29 12 00)	A S 10/271	Styptigutt Haemostypticum „Schwabe“
<p>Wirkstoff-Konz. aus Bursa pastor. und Millefol, standardisiert und biologisch getestet.</p> <p>Menorrhagien und Metrorrhagien der verschiedensten Genese nicht malignen Charakters, z. B. Endometritis, juvenile Blutungen, Wochenbettblutungen usw.</p> <p>3 mal täglich oder mehrmals nach Bedarf je 20-40 Tropfen zwischen den Mahlzeiten, evtl. auch unbedenkl. höh. Dosen.</p> <p>Flasche mit ca. 20 ccm DM 1,15</p> <p>VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>

Sufrogel (43 24 52 00) A VVA 01/219	
Bestandteile	Suspension von dispersem Schwefel in Gelatine mit 0,3% S.
Indikation	Zur parenteralen Schwefeltherapie chronischer Gelenkerkrankungen: Arthritis deformans, Polyarthritis rheumatica, chronische Versteifung der Wirbelsäule; chronische Ischias. Zur Fiebertherapie metaluetischer Erkrankungen des Nervensystems (an Stelle der Malariaabehandlung).
Dosierung	Individuelle und vorsichtige Dosierung (intramuskulär). Bei Arthritis und Ischias: Anfangsdosis 0,1 ccm, später steigend bis auf 0,3 ccm, bei Ausbleiben jeglicher Reaktion 0,5 ccm, in Ausnahmefällen 1 ccm. Bei Metalues 10-12 Injektionen zu 1-2 ccm in Abständen von 2-4 Tagen.
Handelsform und Preise	Schachtel mit 3 Amp. zu 1 ccm . . . DM 1,35 Schachtel mit 3 Amp. zu 5 ccm . . . DM 2,85 Klinikpackung mit 50 Amp. zu 1 ccm . . . DM 12,35
Hersteller	VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden

Sulfaguanidin „Wolfen“ (43 25 29 00) ARp F 01/207	
Bestandteile	p-Aminobenzolsulfonyl-guanidin, Chemotherapeuticum.
Indikation	Bazilläre Ruhr, ruhrartige Durchfälle, Sommerdiarrhöen, unspezifische Gastroenteritis, chronische Dyspepsie, chronische Enteritis, Proctitis, Vor- und Nachbehandlung bei Darm-Operationen.
Dosierung	Mittlere Tagesdosis 14 Tabletten bei 70 kg Körpergewicht.
Handelsform und Preise	Packung mit 20 Tabl. zu 0,5 g . . . DM 3,80 Packung mit 50 Tabl. zu 0,5 g . . . DM 8,15 Klinikpackung mit 300 Tabl. zu 0,5 g . . . DM 41,25
Hersteller	VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld

L

(43 25 21 00)	ARp VVSx 03/208/209	Sulfanilamid
<p>p-Aminophenylsulfonsäureamid.</p> <p>Bakterielle Infektionen.</p> <p>Zur Therapie: Wichtig ist es, die Behandlung sofort mit hohen Dosen - Stoßtherapie - zu beginnen. Man verabreicht je Tag 4-6 g (8-10 Tabl.) zweckmäßig auf 4-5 und mehr Einzeldosen verteilt und setzt die Medikation, besonders in dringlichen Fällen, auch des Nachts fort.</p> <p>Die Tabl. werden mit reichlich Wasser und möglichst nicht auf leeren Magen genommen, Säuglinge erhalten 3-4 mal täglich 1/4-1/2 Tabl., Kleinkinder (2. bis 5. Lebensjahr) 3-4 mal täglich 1/2-1 Tabl., Kinder im 6. bis 14. Lebensjahr täglich 1-2 Tabl., variiert je nach Körpergewicht.</p> <p>Es ist zu empfehlen, während der Behandlungsdauer für erhöhte Flüssigkeitszufuhr (z. B. Wasser oder Suppen) zu sorgen, den Genuß von alkoholischen Getränken und Nikotin zu vermeiden.</p> <p>Zur rektalen Anwendg. werd. 2-4 g als Klysma in 50-80 ccm eines etwa 40° warmen Stärkeschleimes gegeben. - Zur Vermeidung von Rezidiven breche man die Behandlung nicht zu früh ab; andererseits ist es angezeigt, längere Medikationen nur unter laufender ärztlicher Kontrolle und Überwachung des Blutbildes vorzunehmen. Sulfanilamid läßt sich auch gut zu Suppositorien verarbeiten. Nach Überdosierungen können im allgemeinen bei Sulfonamiden übliche Nebenwirkungen auftreten (z. B. Cyanose, Unruhe, Hypertonus der Muskeln, erhöhte Blutsenkung, Linksverschiebung im Blutbild usw.). Bei der Applikation, die unter ärztlicher Kontrolle zu erfolgen hat, sind besonders konstitutionell bedingte Unterschiede der Patienten, Schwere des Krankheitsbildes und allergisch bedingte Reaktionen zu berücksichtigen.</p> <p>Sulfanilamid-Pulver pur. subtt.: Rein oder in Mischung als Pulver, Puder u. a.</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p>
<p>Packung mit 20 Tabl. zu 0,5 g DM 1,71</p> <p>Klinikpackung mit 300 Tabl. zu 0,5 g</p> <p>für Kliniken DM 19,11</p> <p>für Private DM 21,51</p> <p>Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu 0,5 g</p> <p>für Kliniken DM 63,47</p> <p>für Private DM 71,41</p> <p>Packung mit 250 g Pulver</p> <p>Packung mit 500 g Pulver</p>		<p>Handelsform und Preise</p>
<p>VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben</p>		<p>Hersteller</p>

Sulfathiazol-Wolfen	
(in Vorbereitung)	(43 25 29 00) ARp F 01/211
Bestandteile	p-Aminobenzolsulfonamidothiazol.
Indikation	Hochwirksames Sulfonamid zur Therapie von bakteriellen Infektionserregern, insbesondere von Pneumokokken, Meningokokken, Staphylokokken, Streptokokken und Gonokokken, Pneumonie, Wundinfektionen, Gonorrhoe, Schweißdrüsenabszesse, Phlegmonen und andere mit hohem Fieber verlaufende eitrige Entzündungen.
Dosierung	Nur auf ärztliche Verordnung! Durchschnittliche Tagesdosis 12 Tabletten für 70 kg Körpergewicht auf 3-4 Einzeldosen verteilen.
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,5 g DM 2,75 Glas mit 250 Tabl. zu 0,5 g DM 23,05 Glas mit 1000 Tabl. zu 0,5 g DM 89,50 Ampullen in Vorbereitung.
Hersteller	VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld
Sulfoderm-Puder	
	(43 24 11 00) A VVA 01/213
Bestandteile	Heilpuder, der eine physikalische Einheit von Pudergrundlage und kolloidem Schwefel (1%) - kein Gemenge - darstellt. Hautfarben, parfümiert, reizlos. DRP 438 985.
Indikation	Zur kosmetisch vollkommenen Therapie bei Seborrhoea oleosa des Gesichts und des Haarbodens, Pyodermien, Akne, Pityriasis, Intertrigo, Impetigo. Unauffällige, kontinuierliche Behandlung ohne Berufsstörung.
Dosierung	Sulfoderm mehrmals am Tage und auch abends dünn einpudern. (Die ununterbrochene Anwendung ist besonders wichtig für die Therapie der Akne.) Die Behandlung der Kopfhaut erfolgt in gleicher Weise; der überschüssige Puder läßt sich dabei leicht aus dem Haar ausbürsten.
Handelsform und Preise	Dose mit 25 g DM 1,40 Klinikpackung mit 500 g DM 17,75
Hersteller	VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden

(43 24 15 00)	A VVSx 03/214	Sulfo-Perscatol
<p>Dichlordiphenyltrichlormethylmethan 2,5%, Tetrahydronaphthalin 5,0%, Sulfur praec. colloid. 6,0%, Linim. lanetti 86,5%.</p> <p>Parasitäre Dermatosen, insbesondere Scabies.</p> <p>Kur möglichst durch warmes Vollbad einleiten. An 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen den ganzen Körper gründlich und gleichmäßig einreiben, wobei alle Hautfalten besonders gründlich zu behandeln sind. Nach hinreichender Einwirkungszeit der zweiten Einreibung (mindestens 2 Tage) erfolgt wiederum ein warmes Bad mit gründlicher Reinigung. Bett- und Leibwäsche gesondert halten und sofort desinfizieren.</p> <p>Flasche mit ca. 100 g DM 2,00 Klinikpackung mit ca. 1000 g DM 11,50</p> <p>VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 29 12 00)	A S 10/244	Sulfur Collo (D 4, D 6)-Injektionen
<p>Kolloider Schwefel in Aqua bidestillata (D4); in Ringerlösung (D6).</p> <p>Zur Fieberbehandlung bei rheumatischen Erkrankungen, zur Provokation latenter oder therapieresistenter Infektionen, Furunkulose, alle Indikationen der unspezifischen Reiztherapie.</p> <p>Injektionen von 1 ccm subkutan oder intramuskulär bzw. intravenös.</p> <p>Packung mit 6 Amp. (1,1 ccm) DM 0,95 Packung mit 12 Amp. (1,1 ccm) DM 1,50</p> <p>VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(43 29 12 00)	A S 10/245	Sulfur Collo (D 3, D 4, D 6)-Tabletten
<p>Kolloider Schwefel in Trituration mit Milchzucker.</p> <p>Akne, Pyodermien, Furunkulose, Karbunkel, Schweißdrüsenabszesse, Ekzeme.</p> <p>3-4 mal täglich 1-2 Tabletten im Munde zergehen lassen.</p> <p>Packung mit ca. 100 Tabl. zu 0,1 g DM 0,75</p> <p>VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>
(siehe Collo-Präparate)		Sulfur Collo in flüssiger Form

Tachystin-Jenapharm		(43 27 00 00)	ARp VVP 09/241
Bestandteile	0,5%ige ölige Lösung des Dihydratachysterins.		
Indikation	Tetanie infolge Versagens der Epithelkörperchen, zur Hebung des Serum-Calciumspiegels.		
Dosierung	Innerlich anzuwenden, 10-30 Tropfen täglich, nur unter ständiger ärztlicher Überwachung. Kontrolle des Blutcalciumspiegels erforderlich.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 15 ccm DM 9,85 Klinikpackung mit 100 ccm DM 49,45		
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena		
Tanninum albuminatum Tabl. 0,5		(43 26 59 00)	A VVP 07/787
Indikation	Antidiarrhoicum		
Dosierung	3-4 mal täglich 1-2 Tabl.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Stück DM 0,70		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Targesin		(43 24 71 00)	G 03/203
Bestandteile	Komplexe Diacetyltanninsilbereiweißverbindung, Silbergehalt ca. 6%.		
Indikation	Schleimhauterkrankungen aller Art: Gastritis, Ulcus ventriculi et duodeni, Cystitis, Conjunctivitis, Colitis, Gonorrhoe, auch bei Ekzemen. Für die Rezeptur.		
Handelsform	Flaschen mit 25, 50, 100, 250 und 500 g Substanz		
Hersteller	Gödecke & Co., Chem. Fabr. in Verwaltung, Teltow b. Berlin		
Targesin-Salbe		(43 23 43 00)	Ä G 03/204
Bestandteile	Targesin (5%) in neutraler Salbengrundlage.		
Indikation	Bei Conjunctivitis, Rhinitis, Ulcus cruris, Ekzemen, Wundbehandlung.		
Handelsform und Preise	Dose mit 5 g DM 0,95 Dose mit 30 g DM 1,65		
Hersteller	Gödecke & Co., Chem. Fabr. in Verwaltung, Teltow b. Berlin		

(43 26 55 00)	A G 03/206	Targesin-Tabletten
Tabletten mit 0,25 g Targesin.		Bestandteile
Bei Colitis, Dysenterie, Paratyphus B (nicht zur Bereitung von Targesin-Lösungen geeignet).		Indikation
Mittlere Dosis 4 mal täglich 1-2 Tabletten.		Dosierung
Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,3 g . . . DM 2,05		Handelsform und Preise
Gödecke & Co., Chem. Fabr. in Verwaltung, Teltow b. Berlin		Hersteller
(43 23 55 00)	ARp G 03/205	Targophagin
Targesin 0,05, p-Aminobenzoesäureäthylester 0,005, p-Butylaminobenzoyldimethylamioethanolchlorhydrat 0,0015.		Bestandteile
Bei Angina, Pharyngitis, Stomatitis, Gingivitis, Mundschleimhautverletzungen, als Vorbeugungs- und Nachbehandlungsmittel bei Diphtherie.		Indikation
Targophagin soll gelutscht werden, und zwar bei Bedarf 1-2 stündlich über den Tag verteilt bis zu 10 Tabletten.		Dosierung
Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,5 g . . . DM 1,25		Handelsform und Preise
Gödecke & Co., Chem. Fabr. in Verwaltung, Teltow b. Berlin		Hersteller
(43 23 33 00)	ARp VVP 09/220/221	Tebethion
Acetyl-p-aminobenzaldehyd-Thiosemicarbazon.		Bestandteile
Zur Tuberkulosetherapie: Lungentuberkulose, Haut- und Schleimhauttuberkulose, Darmtuberkulose, Lymphknotentuberkulose, Nieren-, Blasen- und Genitaltuberkulose, Knochen- und Gelenktuberkulose, Miliartuberkulose und tuberkulose Meningitis.		Indikation
Als Substanz zur Lokalbehandlung tuberkulöser Kavernen (neuerdings auch zur Rheumatherapie, obwohl hier die Erfolge noch umstritten sind).		
0,025-0,15 g täglich für Erwachsene bei ständiger klinischer Überwachung, beginnend mit 0,025 g oral und intrakavernäl.		Dosierung
Glas mit 5 g Substanz DM 10,65		Handelsform und Preise
Glas mit 100 Tabl. zu 0,05 g DM 10,65		
Klinikpackung mit 1000 Tabl. zu 0,05 g DM 90,00		
VEB Jenapharm, Jena		Hersteller

Teep-Präparate		(43 29 12 00)	A VVP 10/290 bzw. ARp VVP 10/290
Bestandteile	Adsorbate von div. Frischpflanzenbreien an indifferente Träger-substanzen gem. Teep-Verfahren (DRP).		
Indikation	Alle für die einzelnen Arzneipflanzen bekannten Anwen-dungsgebiete. Verzeichnis bitte anfordern.		
Handelsform und Preise	Packung mit 40 Tabl. = ca. 10 g . . . DM 0,70 Klinikpackung mit 500 Tabl. = ca. 130 g DM 5,00		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Teer-Sulfoderm-Puder		(43 24 13 00)	A VVA 01/214
Bestandteile	Sulfoderm-Puder-Heyden mit ca. 6% Steinkohlenteer, hautfarben mit Geruchskorrigens. Antiparasitär - antipruriginös - anti-ekzematös.		
Indikation	Teer-Schwefelbehandlung ohne Belästigung durch Farbe und Geruch: Chronische und akute, ekzematöse und juckende Hautkrankheiten, z. B. Säuglingsekzeme, Neurodermitis und Blasenkrankheiten der Haut, dyshidrotische Ekzeme, Derma-tomykosen; Prurigo, Pruritus, Urticaria.		
Dosierung	Dünn aufstreuen, ggf. mehrmals täglich und auch abends. Teer-Sulfoderm-Puder haftet sehr gut auf der Haut.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 25 g DM 1,75 Klinikpackung mit 500 g DM 18,75		
Hersteller	VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		
Testes siccati Dragées		(43 22 31 00)	A VVP 07/247
Bestandteile	Testikel-Präparat. 1 Dragee = 0,25 g Trockensubstanz.		
Indikation	Infantilismus, Tonikum im Klimakterium virile, z. B. bei rascher Ermüdbarkeit und Erschöpfung, Depressionszu-ständen und anderen neurasthenischen Störungen.		
Dosierung	3 mal täglich 2-4 Stück nach den Mahlzeiten.		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Stück DM 1,45 Glas mit 50 Stück DM 2,75 Klinikpackung mit 500 Stück DM 13,60		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		

(43 22 32 00)	ARp VVP 13/228/229	Testoviron
Testosteronpropionat.		Bestandteile
Männl. Keimdrüseninsuffizienz, Klimakterium virile, Prostatahypertrophie, Hypogenitalismus, Mamma-Karzinom.		Indikation
Packung mit 4 Amp. zu je 10 mg/ccm DM 4,95		Handelsform und Preise
Packung mit 20 Amp. zu je 10 mg/ccm		
für Private DM 18,—		
für Kliniken DM 16,—		
Packung mit 4 Amp. zu je 25 mg/ccm DM 9,90		
Packung mit 20 Amp. zu je 25 mg/ccm		
für Private DM 38,65		
für Kliniken DM 34,35		
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller
(43 22 32 00)	ARp VVP 13/232	Testoviron-Tabletten
Methyl-Testosteron.		Bestandteile
Männl. Keimdrüseninsuffizienz, Klimakterium virile, Impotenz, Prostatahypertrophie.		Indikation
3-4 Stück pro die zur buccalen Anwendung.		Dosierung
Packung mit 20 Tabl. zu je 5 mg . . . DM 3,20		Handelsform und Preise
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller
(43 41 90 00)	ARp VVP.02	Testseren A, B, 0 „Weißensee“
Menschl. Serum der entspr. Blutgruppe bei einem Mindesttiter 1:32.		Bestandteile
Zur Blutgruppenbestimmung vor Transfusionen und zur Vaterschaftsbestimmung.		Indikation
Karton mit je 5 Kapillaren DM 7,95		Handelsform und Preise
Karton mit je 10 Kapillaren DM 13,65		
Karton mit 3 Fläschchen zu je 1 ccm DM 10,20		
VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		Hersteller

**Tetanus-Serum
„Dessau“**

(43 41 40 00) VVP 01

Bestandteile Antitoxisches Immunserum vom Pferd, Rind und Hammel, konserviert, 3 Jahre verwendbar.

Dosierung

Passive Schutzimpfung:

1500-3000 IE im. oder sbc. (1 neue IE=2 alte AE). Wegen der Gefahr des Spättetanus sollte grundsätzlich nur noch die Simultan-Impfung durchgeführt werden.

Simultan-Impfung:

a) ohne Grundimmunität:

1500-3000 IE im. oder sbc. und zugleich ortsgrennt 1 ccm Tetatoxoid sbc. Nachimpfung mit Serum nicht erforderlich. Wiederholungsimpfung mit Tetatoxoid nicht unbedingt erforderlich. Zur Vertiefung des Impfschutzes, kann Impfwiederholung mit 1 ccm Tetatoxoid vom 10. Tage ab erfolgen und dann Impfschutz für mehrere Jahre.

b) Vor Eintritt der Grundimmunität:

Erfolgt Verletzung zwischen dem 1. und 12. Tage nach erfolgter einmaliger Tetatoxoidabgabe bei starkem Infektionsverdacht, übliche Serumgabe und evtl. zur Vertiefung des Impfschutzes vom 10. Tage ab Impfwiederholung mit 1 ccm Tetatoxoid.

Heilbehandlung:

15 000 IE iv. und 2 ccm Tetatoxoid sbc., am gleichen Tage abermals 15 000 IE im., die weiteren Tage 30 000 bis 40 000 IE im. (insgesamt 300 000 bis 400 000 IE und jeden 4. Tag Tetatoxoid - Heilbehandlung nach Winkelbauer).

Handelsform und Preise

Vom Pferd Amp. mit 3 ccm
(1500 neue IE = 3000 AE) DM 1,30
Vom Pferd Amp. mit 5 ccm
(1500 neue IE = 3000 AE) DM 1,65
Vom Pferd Amp. mit 25 ccm
(7500 neue IE = 15 000 AE) DM 4,55
Vom Pferd Amp. mit 10 ccm
(15 000 neue IE = 10 000 AE) DM 4,71
Vom Rind Amp. mit 10 ccm
(1500 neue IE = 3000 AE) DM 1,45
Vom Hammel Amp. mit 10 ccm
(1500 neue IE = 3000 AE) DM 1,45

Hersteller

VEB Serum-Werk Dessau

(43 41 40 00)	VVP 01	Tetatoxoid „Dessau“
Tetanustoxoid-Aluminum-Depotimpfstoff, konserviert, 5 Jahre verwendbar.		Bestandteile
Zur langfristigen aktiven und zur aktiv-passiven Prophylaxe und zur Therapie bei manifestem Tetanus im Form der Sero-Anatoxin-Therapie nach Ramon.		Indikation
Prophylaktisch: Mindestabstand von 4 Wochen je 1 ccm sbk. (Schutzdauer mehrere Jahre). 1 Jahr später 1 ccm sbk. (Schutzdauer wahrscheinlich lebenslänglich). Simultan: Bei verletzten Personen neben Tetanus-Serum je 1 ccm Tetatoxoid sbk. am 1., 14. und 28. Tage (Schutz mehrere Jahre), nach Jahresfrist 1 ccm sbk. (Schutz wahrscheinlich lebenslänglich). Therapeutisch: siehe Tetanus-Serum.		Dosierung
Karton mit 2 Amp. zu je 1 ccm . . . DM 1,55 Ampullenflasche mit 25 ccm für Kliniken DM 9,70 für Private DM 10,20		Handelsform und Preise
VEB Serum-Werk Dessau		Hersteller
(43 25 39 00)	ARp VVSx 03/219	Thiantan-Ampullen
Diaethylaminoethyl-phenothiazin-Hydrochlor. 2 ccm = 0,05 g.		Bestandteile
Heuschnupfen, medikamentöse Unverträglichkeitssymptome, Pruritus, Serumkrankheit, Urticaria.		Indikation
Wenn vom Arzt nicht anders verordnet 1/2-2 Ampullen subkutan oder tief intraglutäal injizieren.		Dosierung
Packung mit 5 Amp. zu 2 ccm . . . DM 4,00 Packung mit 25 Amp. zu 2 ccm für Kliniken DM 12,92 für Private DM 14,53		Handelsform und Preise
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		Hersteller
(43 25 39 00)		Thiantan-Substanz
Diaethylaminoethyl-phenothiazin-Hydrochlor.		Bestandteile
Für die Rezeptur.		
Packung mit 2 g Packung mit 20 g		Handelsform
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		Hersteller

Thiantan-Tabletten		(43 25 39 00)	ARp VVSx 03/220
---------------------------	--	---------------	-----------------

Bestandteile	Diaethylaminoethyl-phenothiazin-Hydrochlor. 1 Tabl. = 50 mg wirksame Substanz.		
Indikation	Heuschnupfen, medikamentöse Unverträglichkeitssymptome, Pruritus, Serumkrankheit, Urticaria.		
Dosierung	Wenn vom Arzt nicht anders verordnet 1/2-1 Tablette (25 bis 50 mg) oder ein Mehrfaches peroral. Die Tabletten sind wegen ihres intensiven Geschmackes und der anaesthesierenden Wirkung mit einem Schluck Wasser möglichst schnell zu nehmen.		
Handelsform und Preise	Packung mit 20 Tabl. zu 0,05 g . . .	DM 3,40	
	Packung mit 250 Tabl. zu 0,05 g		
	für Kliniken	DM 27,69	
	für Private	DM 31,15	
Hersteller	VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		

Thiantetten		(43 25 39 00)	ARp VVSx 03/223
--------------------	--	---------------	-----------------

Bestandteile	Diaethylaminoethyl-phenothiazin-Hydrochlor. 1 Dragee = 15 mg wirksame Substanz.		
Indikation	Für die Kinderpraxis.		
Dosierung	2-3 Dragees auf den Tag verteilt je nach Alter und Allgemeinzustand des Kindes, unter ärztlicher Kontrolle verabreichen. Nebenerscheinungen wie Übelkeit, Müdigkeit, Kopfschmerz können hin und wieder auftreten und sind durch Reduzierung der Dosis zu bekämpfen.		
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Dragees	DM 1,50	
	Packung mit 150 Dragees		
	für Kliniken	DM 6,54	
	für Private	DM 7,86	
Hersteller	VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		

(43 24 11 00)	A VVOr 02/216	Thianthrol-Salbe
Dimethylthianthren u. Nebenkörper 20,0%, Ceresin 25,0%, Lanettewachs 3,9%, Cetiolan 2,6%, Aqua dest. 27,3%, Dextrin 6,65%, Spindelöl 6,65%, p-oxybenzoesäureester 0,2%, Glycerin 7,7%.		Bestandteile
Parasitäre und infektiöse sowie stoffwechselbedingte Hauterkrankungen, Scabies, Favus, Herpes tonsurans, Pyodermien, seborrhoische Ekzeme usw.		Indikation
Auftragen auf die erkrankten Stellen.		Dosierung
Kruke mit 50 g DM 2,35		Handelsform und Preise
VEB Fahberg-List, Magdeburg		Hersteller
(43 26 22 00)	ARp VVS 01/217	Thrombin
Haemostypticum zur lokalen Anwendung.		Indikation
Thrombin wird mittels Tupfer, Tampon oder Zerstäuber auf die blutende Stelle gebracht.		Dosierung
Packung mit 1 Flasche zu 5 ccm DM 1,75		Handelsform und Preise
Packung mit 3 Flaschen zu 5 ccm DM 3,75		
Packung mit 10 Flaschen zu 5 ccm DM 10,60		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 22 41 00)	ARp VVP 07/248	Thyreoidea siccata Dragees
Standardisiertes Schilddrüsenpräparat. 1 Dragee = ca. 0,3 g Frischdrüse = ca. 0,1 mg org. geb. Jod.		Bestandteile
Hypothyreoidismus, Adipositas, Oedeme, nach Thyreoidektomien, zur Jodtherapie mit kleinsten Dosen, z. B. bei Struma hyperplastica Jugendlicher, Dermatosen usw.		Indikation
Individuell, Kurschemata stehen zur Verfügung.		Dosierung
Röhrchen mit 20 Stück, DM 1,05		Handelsform und Preise
Glas mit 50 Stück DM 2,05		
Klinikpackung mit 500 Stück DM 10,10		
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Thyreoidin „Schering“		(43 22 41 00)	ARp VVP 13/222/223																
Bestandteile	Thyreoidea sicca.																		
Indikation	Hypothyreose, Myxödem, Adipositas.																		
Dosierung	<p>Die Höhe der Dosierung richtet sich stets nach dem Einzelfall, wobei man im allgemeinen mit kleinen Dosen (etwa 1-2 mal 0,1 g pro die) beginnen und dann, entsprechend der Wirkung und Verträglichkeit, größere Mengen verordnen wird (bis 3 mal täglich 2 mal 0,1 g).</p> <p>Wo eine schnelle Wirkung erwünscht ist (z. B. schwere myxoedematöse Formen, starke Adipositas usw.), kann die Dosis - unter laufender Kontrolle - auf 3 mal täglich 0,3 g gesteigert werden. Kinder bekommen entsprechend kleinere Dosen.</p> <p>Es ist stets daran zu denken, daß die Wirkung einer einmaligen Gabe von Thyreoidin „Schering“ erst nach 10 bis 18 Stunden einsetzt und mehrere Tage anhält, so daß es bei überhöhten Dosen leicht zu kumulativen Erscheinungen kommen kann. Neben der laufenden Grundumsatzkontrolle empfiehlt es sich, auf Überdosierungssymptome zu achten, die zur Herabsetzung der Dosis bzw. zum Abbrechen der Behandlung Anlaß geben: Tachykardie und Extrasystolie, häufige Schweißausbrüche, unklare Diarrhöen, starker Gewichtsverlust, zunehmende Nervosität, Praekordialangst usw. Die geringste, noch wirksame Dosis ist die beste!</p>																		
Handelsform und Preise	<table> <tr> <td>Glas mit 50 Dragees zu je 0,1 g</td> <td>DM 1,40</td> </tr> <tr> <td>Glas mit 250 Dragees zu je 0,1 g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>für Private</td> <td>DM 5,50</td> </tr> <tr> <td>für Kliniken</td> <td>DM 4,60</td> </tr> <tr> <td>Glas mit 50 Dragees zu je 0,3 g</td> <td>DM 2,25</td> </tr> <tr> <td>Glas mit 250 Dragees zu je 0,3 g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>für Private</td> <td>DM 9,85</td> </tr> <tr> <td>für Kliniken</td> <td>DM 8,20</td> </tr> </table>			Glas mit 50 Dragees zu je 0,1 g	DM 1,40	Glas mit 250 Dragees zu je 0,1 g		für Private	DM 5,50	für Kliniken	DM 4,60	Glas mit 50 Dragees zu je 0,3 g	DM 2,25	Glas mit 250 Dragees zu je 0,3 g		für Private	DM 9,85	für Kliniken	DM 8,20
Glas mit 50 Dragees zu je 0,1 g	DM 1,40																		
Glas mit 250 Dragees zu je 0,1 g																			
für Private	DM 5,50																		
für Kliniken	DM 4,60																		
Glas mit 50 Dragees zu je 0,3 g	DM 2,25																		
Glas mit 250 Dragees zu je 0,3 g																			
für Private	DM 9,85																		
für Kliniken	DM 8,20																		
Hersteller	VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof																		
Tinktusan		(43 29 12 00)	A VVP 10/208																
Bestandteile	Echinacea Ø, Arnica Ø, Symphytum Ø aa 25,0, Clematis Ø 15,0, Plantago Ø 10,0.																		
Indikation	Zur lokalen Behandlung von Prothesendruckstellen und Parodontose.																		
Dosierung	Äußerlich zum Einreiben.																		
Handelsform und Preise	Flasche mit 10 ccm DM 0,95																		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul																		

(43 21 39 00)	AB VVP 06/213, 214, 221	Titretta analgica
<p>Codein, Theobromin, Dimethylaminophenazon. Codeingehalt pro Tablette = 0,025 g Codeingehalt pro Supp. = 0,03 g Codeingehalt pro Supp. für Kinder = 0,005</p> <p>Schmerzen jeder Art und Stärke.</p> <p>1-2 Tabletten (am besten im Wasser zerfallen) bis 3 mal täglich nach der Mahlzeit bzw. 1-2 Supp., ggf. wiederholen.</p> <p>Packung mit 3 Suppos. m. u. o. Belladonna DM 0,82 Packung mit 6 Suppos. m. u. o. Belladonna DM 1,61 Packung mit 100 Suppos. m. u. o. Belladonna DM 17,55 Packung mit 6 Suppos. für Kinder DM 1,04 Packung mit 50 Suppos. für Kinder DM 6,00 Packung mit 10 Tabletten DM 1,58</p> <p>VEB Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>

(43 27 51 00)	A VVP 01/207	Tonasid
<p>Nutritives tonisierendes Oralserum (natives Serum gesunder Schlachttiere mit 19% Disacchariden, 7,5% Monosacchariden, 15% Aethylalkohol, 0,1% Vitamin C, 0,04% Coffein und natürlichen pflanzlichen Bitterstoffen (Albumin/Globulingeh. ca. 5%) und Geschmackskorrigentien.</p> <p>Höchstwertiges Eiweißsubstituens (exogene Aminosäuren in natürlicher komplexer Form), vor und nach Operationen, gegen Eiweißunterernährung und nach Eiweißverlusten, Magen- und Darmstörungen, Resorptionsstörungen in der Rekonvaleszenz, zur Resistenzerhöhung gegen Infekte und Intoxikationen, bei Störungen der Wundheilung.</p> <p>Kinder: 3 mal täglich 1/2-1 Teelöffel Erwachsene: 3-5 mal täglich 1 Teelöffel.</p> <p>Flasche mit 100 g DM 2,25 Flasche mit 1000 g für Private DM 18,85 für Kliniken DM 16,75</p> <p>VEB Serum-Werk Dessau</p>		<p>Bestandteile</p> <p>Indikation</p> <p>Dosierung</p> <p>Handelsform und Preise</p> <p>Hersteller</p>

Tonikum		43 27 51 00)	A VVP 07/200
Bestandteile	Liq. Kal. arsen. 0,12, Extr. Strychni aq. sicc. 0,02, Extr. Faecis 1,0, Extr. Colae fluid. 1,5, Ferr. oxyd. sacch. liq. 6,0, Aethylalk. 94, 7% 7,5, Saccharum 25,0, Aqua ad 100,0.		
Indikation	Blutbildendes Kräftigungsmittel, bes. in der Rekonvaleszenz.		
Dosierung	3 mal täglich 1 Eßlöffel voll.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 250 g DM 2,15		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Tonil		(43 25 29 00)	ARp VVA 01/225
Bestandteile	Chemotherapeutikum. Sulfanilylcarbamid-Calcium mit 1% Bromsalicylsäureisopropylamid-Calcium.		
Indikation	Zur Wundbehandlung in der kleinen und großen Chirurgie sowie bei dermatologischen Affektionen infektiöser Natur.		
Dosierung	Bedecken der Wundflächen und -höhlen mit Tonil durch reichliches Aufstreuen. Bei dermatologischen Affektionen infektiöser Natur aufstreuen des Tonil und mit einem Wattebausch verteilen. Tonil wird vollständig resorbiert!		
Handelsform und Preise	Streudose mit 10 g DM 1,90 Streuflasche mit 100 g DM 14,50		
Hersteller	VEB Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul bei Dresden		
Tonsiotren		(43 29 12 00)	A S 10/246
Bestandteile	Mercurius bijodatus D4 20,0, Belladonna D3 20,0, Kalium bichromic. D4 20,0, Hom. Trit. colloid. stabil. von: Hepar sulf. 4,0, Silicea 20,0, Sacchar. ad 100,0.		
Indikation	Umstimmungsmittel bei Mandelhypertrophie und rezidivierender Mandelentzündung.		
Dosierung	3-4 mal täglich 1-2 Tabletten im Munde zergehen lassen.		
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 40 Tabl. zu 0,25 g DM 0,70 Packung mit ca. 80 Tabl. zu 0,25 g DM 1,20		
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Transannon		(43 22 00 00)	A VVP 07/201
Bestandteile	Calc. lact. 0,32 g, Calc. sulfoichthylol 0,0168 g, Extr. Frangul. sicc. 0,0194 g, Magn. citr. 0,0384 g, Ol. Salviae 0,00096 g pro Bohne.		
Indikation	Specificum gegen klimakterische Beschwerden.		
Dosierung	1. Woche dreimal täglich 2 Bohnen, 2. Woche 2 mal täglich 2 Bohnen, 3. Woche 3 mal täglich 1 Bohne, am besten in 6-wöchentlichen Kuren.		
Handelsform und Preise	Schachtel mit 50 Bohnen DM 1,55 Klinikpackung mit 500 Bohnen DM 11,50		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul		

(43 27 11 00)	A VVP 07/761-763	Traubenzucker- lösung 20, 25 u. 40 %																						
Zur i. v. Traubenzucker-Behandlung von Herz- und Gefäß- Störungen.		Indikation																						
Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.		Dosierung																						
<table border="0"> <tr> <td>Schachtel mit 5 Amp. zu 10,5 ccm 20%</td> <td>DM 1,75</td> </tr> <tr> <td>Schachtel mit 10 Amp. zu 10,5 ccm 20%</td> <td>DM 3,20</td> </tr> <tr> <td>Schachtel mit 50 Amp. zu 10,5 ccm 20%</td> <td>DM 10,30</td> </tr> <tr> <td>Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10,5 ccm 20%</td> <td>DM 19,50</td> </tr> <tr> <td>Schachtel mit 5 Amp. zu 10,5 ccm 25%</td> <td>DM 1,80</td> </tr> <tr> <td>Schachtel mit 10 Amp. zu 10,5 ccm 25%</td> <td>DM 3,30</td> </tr> <tr> <td>Schachtel mit 50 Amp. zu 10,5 ccm 25%</td> <td>DM 11,—</td> </tr> <tr> <td>Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10,5 ccm 25%</td> <td>DM 20,60</td> </tr> <tr> <td>Schachtel mit 10 Amp. zu 10,5 ccm 40%</td> <td>DM 3,50</td> </tr> <tr> <td>Schachtel mit 50 Amp. zu 10,5 ccm 40%</td> <td>DM 12,40</td> </tr> <tr> <td>Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10,5 ccm 40%</td> <td>DM 21,65</td> </tr> </table>		Schachtel mit 5 Amp. zu 10,5 ccm 20%	DM 1,75	Schachtel mit 10 Amp. zu 10,5 ccm 20%	DM 3,20	Schachtel mit 50 Amp. zu 10,5 ccm 20%	DM 10,30	Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10,5 ccm 20%	DM 19,50	Schachtel mit 5 Amp. zu 10,5 ccm 25%	DM 1,80	Schachtel mit 10 Amp. zu 10,5 ccm 25%	DM 3,30	Schachtel mit 50 Amp. zu 10,5 ccm 25%	DM 11,—	Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10,5 ccm 25%	DM 20,60	Schachtel mit 10 Amp. zu 10,5 ccm 40%	DM 3,50	Schachtel mit 50 Amp. zu 10,5 ccm 40%	DM 12,40	Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10,5 ccm 40%	DM 21,65	Handelsform und Preise
Schachtel mit 5 Amp. zu 10,5 ccm 20%	DM 1,75																							
Schachtel mit 10 Amp. zu 10,5 ccm 20%	DM 3,20																							
Schachtel mit 50 Amp. zu 10,5 ccm 20%	DM 10,30																							
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10,5 ccm 20%	DM 19,50																							
Schachtel mit 5 Amp. zu 10,5 ccm 25%	DM 1,80																							
Schachtel mit 10 Amp. zu 10,5 ccm 25%	DM 3,30																							
Schachtel mit 50 Amp. zu 10,5 ccm 25%	DM 11,—																							
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10,5 ccm 25%	DM 20,60																							
Schachtel mit 10 Amp. zu 10,5 ccm 40%	DM 3,50																							
Schachtel mit 50 Amp. zu 10,5 ccm 40%	DM 12,40																							
Klinikpackung mit 100 Amp. zu 10,5 ccm 40%	DM 21,65																							
VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul		Hersteller																						

(43 29 12 00)	A S 10/247	Traumafliid- Haemorrhoidal- Zäpfchen				
Liquor Aluminium subacetici 0,1, Spezialauszüge von: Arnica 0,15, Aesculus 0,5, Collinsonia 1,4, Nux vomica 0,1, Hamamel. virg. 0,05, p-Oxybenzoesäuremethylester 0,2, Massa supposit. ad 100,0.		Bestandteile				
Haemorrhoiden.		Indikation				
Mehrere täglich, vor allem nach der Stuhlentleerung, 1 Zäpfchen einführen.		Dosierung				
<table border="0"> <tr> <td>Packung mit 6 Stück</td> <td>DM 0,95</td> </tr> <tr> <td>Packung mit 12 Stück</td> <td>DM 1,70</td> </tr> </table>		Packung mit 6 Stück	DM 0,95	Packung mit 12 Stück	DM 1,70	Handelsform und Preise
Packung mit 6 Stück	DM 0,95					
Packung mit 12 Stück	DM 1,70					
VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Hersteller				

Traumafid-Lösung		(43 29 12 00)	A S 10/248
Bestandteile	Liquor Aluminium subacetici 2,8, Spezialauszug aus: Arnica 5,5, Destillat aus: Hamamel. virg. 30,0, Hydrogen. perox. 30% 3,3, Alkohol 3,4, Aqua dest. 55,0.		
Indikation	Zur Wundbehandlung, Unterschenkelgeschwüre, entzündl. Prozesse im Nasen-Rachenraum und Fluor albus.		
Dosierung	Als Spül- und Gurgelmittel sowie zu Umschlägen. Im allgemeinen 1-2 Eßlöffel voll auf 1/4 l Wasser.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 100 ccm DM 1,20 Flasche mit ca. 250 ccm DM 2,05		
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Traumafid-Paste		(43 29 12 00)	A S 10/249
Bestandteile	Liquor Aluminium subacetici 1,0, Spezialauszug von: Arnica 1,5, Spezialdestillat von: Hamamel. virg. 7,5, Zinc. oxydat. 22,0, Talcum 22,0, Salbengrundlage ad 100,0.		
Indikation	Sezernierende Entzündungen, Ekzeme, leichtere Verbrennungen, Sonnen- und Gletscherbrand, Wundsein der Kinder.		
Dosierung	Paste messerrückendick auf Verbandmull auftragen.		
Handelsform und Preise	Kruke mit ca. 30 g DM 0,95		
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Traumafid-Salbe		(43 29 12 00)	A S 10/218
Bestandteile	Liquor Aluminium subacetici 0,66, Spezialauszug aus: Arnica 1,0, Spezialdestillat von Hamamel. virg. 6,0, Salbengrundlage ad 100,0.		
Indikation	Reinigende und adstringierende Wundsalbe.		
Dosierung	Salbe messerrückendick auf Verbandmull auftragen.		
Handelsform und Preise	Kruke mit ca. 25 g DM 0,80 Kruke mit ca. 50 g DM 1,45		
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		
Trimitan		(43 25 39 00)	ARp VVP 09/234
Bestandteile	Jede Ampulle enthält: 5 mg Tri (β-chloräthyl)-amiohydrochlorid und 45 mg Natr. chlorat.		
Indikation	Zur Behandlung der Lymphogranulomatose, des Lymphosarkoms, der lymphatischen Leukämie.		
Dosierung	Zur i. v. Injektion. Allgemein 0,05-0,1 mg/kg Körpergewicht, jedoch nicht mehr als 5 mg pro dosi.		
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Trocken-Amp. zu 5 ccm DM 16,25		
Hersteller	VEB Jenapharm, Jena		

(43 29 12 00)	A VVP 10/222	Tropoplex (z. Zt. nicht lieferbar)
Natr. sulf. sicc. 32,0, Magnes. sulf. sicc. 16,0, Cort. Frang. 6,0, Bulb. Scillae 7,5, Rad. Helleb. nigr., Hb. Adonid. aa 2,0, Saccharum, Massa et Corrig. ad 100,0.		Bestandteile
Als Diureticum bei renalem Hydrops, Oedemen und Hydrops infolge Kreislaufinsuffizienz, Ascites.		Indikation
3 mal täglich 1/2-1 Teelöffel.		Dosierung
Packung mit 100 g in verbesserter drasierter Form DM 1,40		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul		Hersteller
(43 23 14 00)	A VVT 01/213	Tryasol-Hustensaft
Triäthanolammoniumchlorid $[(C_2H_4OH)_3 \equiv NHCl]$ 1,25, Extr. Thymi comp. fl. 10,0, Extr. Primul. fl. 1,0, Extr. Plantag. fl. 1,0, Kal. bromat. 0,3, Natr. bromat. 0,3, Sacchar. alb. 60,0, Spirit. 4,0, Nipagin 0,1, Aqua dest. 22,05.		Bestandteile
Bei Husten und Bronchitis, auch Laryngitis. Besonders gute Verträglichkeit bei Kindern.		Indikation
6 mal täglich 1 Teelöffel voll		Dosierung
Flasche mit 130 g DM 1,35 Klinikpackung mit 1000 g DM 5,75		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul		Hersteller
(43 23 16 00)	ARp VVT 01/208	Tryasol-Hustensaft c. Codein
Triäthanolammoniumchlorid $[(C_2H_4OH)_3 \equiv NHCl]$ 1,25, Extr. Thymi comp. fl. 10,0, Extr. Primul. fl. 1,0, Extr. Plantag. fl. 1,0, Kal. bromat. 0,3, Natr. bromat. 0,3, Sacchar. alb. 60,0, Spirit. 4,0, Nipagin 0,1, Codein. phosph. 0,1, Aqua dest. 21,95		Bestandteile
Bei Husten und Bronchitis, auch Laryngitis.		Indikation
4-6 mal täglich 1 Teelöffel voll.		Dosierung
Flasche mit 130 g DM 1,80		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul		Hersteller

Tuberkulin „Dessau“		(43 45 10 00)	VVP 01
Bestandteile	Alttuberkulin-Gemisch aus humanen und bovinen Stämmen hergestellt, konserviert, an einer Kinderklinik klinisch geprüft, nahezu unbegrenzt verwendbar.		
Indikation	Zur Diagnose nach Mendel-Mantoux und Pirquet sowie zur Therapie bei den hierfür geeigneten Tuberkulose-Formen.		
Dosierung	Intrakutane Probe nach Mendel-Mantoux, kutane Probe nach Pirquet.		
Handelsform und Preise	Karton mit 3 Amp. zu 1 ccm	DM 3,30	
	Amp.-Flasche mit 5 ccm	DM 3,40	
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau		
Tuberkulin-Salbe „Dessau“		(43 45 10 00)	VVP 01
Bestandteile	Tuberkulin „Dessau“ in fettfreier, leicht einreibbarer Salbengrundlage, an einer Kinderklinik auf Anzeigesicherheit geprüft.		
Indikation	Zur perkutanen Tuberkulin-Probe nach Moro.		
Handelsform und Preise	Tube mit 3 g	DM 5,45	
	Tube mit 10 g	DM 12,55	
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau		
Tussagutt		(43 23 19 00)	A VVP 05/202
Bestandteile	Ol. Anisi 0,05, Foeniculi 0,25, Eucalypti 0,05, Menthae pip. 0,01, Thymi 0,01, Liqu. Ammoni. caust. 1,0, Tinct. Eucalypti 4,0, Spir. 94,63.		
Indikation	Bronchitis und Tussis.		
Dosierung	3 mal täglich 20-30 Tropfen in heißem Brusttee.		
Handelsform und Preise	Tropfflasche mit ca. 30 ccm	DM 0,93	
	Klinikpackung mit 500 ccm	DM 6,24	
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		
Tussedrin-Hustentropfen		(43 23 19 00)	A VVOr 02/221
Bestandteile	28% Extr. Thymi simplex, 10% Tinct. Foeniculi, 25% Sacchar album, 2% d,l-Ephedrin hydrochlor., 35% Aqua dest.		
Indikation	Husten, Keuchhusten, asthmatische Beschwerden.		
Dosierung	3 mal täglich 10-15 Tropfen, Kinder 3 mal täglich 3-10 Tropfen, auf Zucker einnehmen.		
Handelsform und Preise	Tropfflasche mit 10 ccm	DM 0,95	
Hersteller	VEB Fahlberg-List, Magdeburg		

(43 29 12 00)	A S 10/220	Tussistin Liquidum
Spezialauszug Panstabil von: Aconitum 0,75, Hom. Dil von: Bryonia 10,0, Eucalyptus 17,5, Viola tricolor 5,0, Alkohol 45% ad 100,0 Bronchialkatarrh und Grippe. 3-4 mal täglich ca. 10 Tropfen in etwas Wasser zu nehmen. Flasche mit ca. 10 ccm DM 0,85 Flasche mit ca. 30 ccm DM 2,05 VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/221	Tussistin-Sirup
Spezialauszüge aus: Bryonia 0,2, Drosera 2,0, Rumex 2,0, Thymus vulg. 3,0, Teucrium scorod. 3,0, Fruct. Foenic. 1,2, p-Oxybenzoesäuremethylester 0,1, Sirup. simpl. ad 100,0 Akute und chronische Katarrhe der Atmungsorgane, Reizhusten, Verschleimung. 3-4 mal täglich 1 Eßlöffel, Kinder 1 Teelöffel voll u. U. in Wasser oder Tee. Flasche mit ca. 130 g DM 1,— Flasche mit ca. 300 g DM 1,95 VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/222	Tussistin-Tabletten
Hom. Trit. von: Bryonia 25,0, Inula helen. 2,5, Eucalypt. 5,0, Tartarus emet. 5,0, Hom. Trit. colloid. von Antimonium sulf. aurant. 10,0, Sacchar lactis ad 100,0 Akute und chronische Bronchitis, Krampfhusten. 3 mal täglich 2 Tabl., Kinder 1 Tabl., bei stärkerem Husten bis zu 2 stündlich im Munde zergehen lassen. Packung mit ca. 80 Tabl. zu 0,25 g DM 1,20 VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller
(43 45 60 00)	ARp VVP 02	Tussitropin forte „Weißensee“
Polyvalente Keuchhusten-Vakzine mit 20 Milliarden Keimen/ccm konserviert, 2 Jahre verwendbar. Staatl. geprüft Zur Prophylaxe und Therapie bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen. In Abständen von 2-3 Tagen 0,5-1,0 und 1,5 ccm subkutan oder i. m. Amp.-Flasche mit 3 ccm DM 2,95 VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise Hersteller

Tussylvan	(43 23 12 00)	A VVT 02/220
Bestandteile	Extr. Junip. conc. 5%, Extr. Thymi fl. 7,8%, Sir. Amyli 25,6%, Thy- mol u. Menthol 0,0093%, Sacchar. 27,3%, Aqua dest. ad 100,0%	
Indikation	Bei Reizhusten, Keuchhusten, Grippe und Bronchitis.	
Dosierung	Mehrere Male täglich 1 Teelöffel voll.	
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 155 g DM 1,10	
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.	
Typhus-Paratyphus B-Impfstoff „Dessau“	(43 45 80 00)	VVP 01
Bestandteile	Polyvalente, gut verträgliche Typhus-Paratyphus B-Vakzine mit insges. 1000 Mill. Keimen/ccm, konserviert, 2 Jahre verwendb.	
Indikation	Zur aktiven Schutzimpfung gegen Typhus und Paratyphus B.	
Dosierung	Für Erwachsene und Kinder Impfung in Abständen von je 1 Woche. 1. Impf. 0,5 ccm, 2. Impf. 1 ccm, 3. Impf. 1 ccm sbk. Impfgeräte thermisch entkeimen.	
Handelsform und Preise	Karton mit 3 Amp. zu 1 ccm DM 1,45 Flasche mit 100 ccm für Kliniken DM 4,40 für Private DM 4,60	
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau	
Ulcoterran	(43 29 12 00)	A S 10/223
Bestandteile	Robinia-Spezialauszug 0,3, Argentum-Collo D 3 1,0, Nux vom. D 2 1,0, Anacardium D 2 1,0, Bismut. subnitric. 1,0, Magn. per- oxydat. 3,0, Magn. usta 2,0, Rhiz. rec. Calami 11,5, Heilerde und Kieselgel ad 100,0	
Indikation	Gastritis, Sodbrennen, Ulcus ventriculi et duodeni.	
Dosierung	3 mal täglich 1/2-1 Teelöffel voll in etwas Wasser 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten nehmen.	
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 40 g Pulver DM 1,10 Flasche mit ca. 100 g Pulver DM 2,10	
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig	
Uplex	(43 29 12 00)	A VVP 10/216
Bestandteile	Cinis Fag. silv. 2,5, Carbo animal. 0,13, Carica papaya Ø 0,05, Bismut. subnitric. 7,9, Magnes. peroxydat. 12,5, Magnes. carb. 5,0, Bolus steril ad 100,0	
Indikation	Bei Hyperacidität, Ulcus ventriculi et duodeni, Gastroen- teritis.	
Dosierung	3 mal täglich 1/2 Teelöffel 1/4 Stunde vor der Mahlzeit.	
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 30 g Pulver DM 1,55	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul	

(43 29 12 00)	A VVP 10/215	Uraton
Rubia \emptyset , Berberis \emptyset , Rheum \emptyset , Aurum colloid. D 4, Silicea colloid. D 4, Sulfur colloid. D 4, Lithium salicylic. aa 2,0, Rhus toxicod. D 1 0,25, Chamomilla \emptyset 2,5, Tct. Colchici 1,5, Spirit. Corrig. Aqua dest. ad 100,0		Bestandteile
Bei Arthritis urica, rheumatische und neuralgische Affektionen, uratische Diathese.		Indikation
3 mal täglich $\frac{1}{2}$ Teelöffel in $\frac{1}{4}$ l heißem Wasser.		Dosierung
Flasche mit 30 ccm DM 1,10		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul		Hersteller
(43 24 29 00)	A VVP 07/202	Urocid (z. Zt. beschränkt lieferbar)
Piperazin 0,4, Lith. citr. 5,0, Hexamethylentetramin 6,0 Natr. sulfuric. 20,0, Acid. citr. 34,3, Natr. bicarbonic. 34,3		Bestandteile
Zur Behandlung der harnsauren Diathese.		Indikation
3 mal täglich 1 Teelöffel voll.		Dosierung
Glas mit 100 g DM 1,75		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul		Hersteller
(43 28 69 00)	ARp VVP 13/218/138/239	Uroselectan B
Dinatriumsalz der N-methyl-3,5 dijodchelidamsäure		Bestandteile
Röntgenkontrastmittel der Harnorgane und der Gelenke.		Indikation
Dosierung gemäß besonderer Vorschrift.		Dosierung
Zur intravenösen Urographie (75%)		Handelsform und Preise
Karton mit 1 Amp. zu 20 ccm DM 8,65		
Zur instrument. (retrograden) Urographie (20%)		
Karton mit 1 Amp. zu 20 ccm DM 1,75		
Zur Gelenkdarstellung (35%)		
Karton mit 1 Amp. zu 5 ccm DM 1,55		
VEB Schering Adlershof, Berlin-Adlershof		Hersteller

Uscabin liquidum		(43 24 13 00)	A VVT 03/210
Bestandteile	Teerbasen 1,5 ‰, Aethylendiaminsulfid 0,5 ‰, Aeth. Öle 0,4 ‰		
Indikation	Scabies, Dermatomyosen, Pediculosis, Dermatozoonosen.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 100 g	DM 2,20	
	Klinikpackung mit 1000 g	DM 11,40	
Hersteller	VEB Promassol-Werk, Erfurt		
Vagitral-gonocid		(43 24 69 00)	ARp VVSx 03/212
Bestandteile	Acid. citric. 10 ‰, Acid. boric. 1 ‰, p-Aminophenylsulfonsäureamid 8 ‰, durch cyclische Kohlenwasserstoffreste substituierte Chlorphenole 0,1 ‰, Mass. tabl. effervesc. ad 100 ‰		
Indikation	Leukorrhoe nach gonorrhöischer Infektion.		
Dosierung	Nach klinischen Erfahrungen führe man 2-3 mal am Tage, vor allem abends vor dem Schlafengehen, eine Vagitral-Tabl. möglichst tief in die Scheide ein. In sehr schweren Fällen kann die Dosierung erhöht werden. Zwischenspülungen sind nur in Ausnahmefällen anzuwenden.		
Handelsform und Preise	Packung mit 20 Tabl. zu 0,5 g	DM 2,—	
	Packung mit 300 Tabl. zu 0,5 g		
	für Kliniken	DM 22,67	
	für Private	DM 25,50	
Hersteller	VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		
Vagitral-simplex		(43 24 69 00)	A VVSx 03/210
Bestandteile	Acid. citric. 10 ‰, Acid. boric. 1 ‰, durch cyclische Kohlenwasserstoffreste substituierte Chlorphenole 0,1 ‰, Mass. tabl. effervesc. ad 100 ‰		
Indikation	Zur Behandlung von unspezifischem Fluor.		
Dosierung	Wie vorstehend.		
Handelsform und Preise	Packung mit 20 Tabl. zu 0,5 g	DM 1,50	
	Packung mit 300 Tabl. zu 0,5 g		
	für Kliniken	DM 16,45	
	für Private	DM 18,51	
Hersteller	VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		

(43 24 69 00)	ARp VVSx 03/211	Vagital-trichomonacid
Acid. citric. 10 0/0, durch cyclische Kohlenwasserstoffreste substituierte Chlorphenole 0,5 0/0, Cu-As-Komplex 0,05 0/0, Mass. tabl. effervesc. ad 100 0/0		Bestandteile
Trichomonas-Kolpitis. Wie vorstehend.		Indikation
Packung mit 20 Tabl. zu 0,5 g . . . DM 1,76		Dosierung
Packung mit 300 Tabl. zu 0,5 g		Handelsform und Preise
für Kliniken DM 19,14		
für Private DM 21,54		
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		Hersteller
(43 28 52 00)	A VVP 01/208	Valvanol
3,5 0/0 chlorierte Phenolhomologe, 24 0/0 höhere Alkohole, 8 0/0 Seife, 10 0/0 n-Propanol, 0,2 0/0 Duftstoffe.		Bestandteile
Gewebsfreundliches, materialschonendes Desinfiziens zur Haut-, Instrumenten-, Krankenbett- und Sputum-Desinfektion.		Indikation
Hände 0,5 0/0, Sputum gleiche Teile Sputum und Valvanol, sonstige Desinfektion 2 0/0		Dosierung
Flasche mit 100 g DM 1,25		Handelsform und Preise
Flasche mit 1000 g		
für Kliniken DM 6,90		
für Private DM 8,25		
VEB Serum-Werk Dessau		Hersteller
(43 28 14 00)	A VVP 01/209	Valvanol-Tinktur
Desinfizierende Tinktur aus 2,0 0/0 chlorierten Phenolhomologen 1 0/0 Acid. tannic., 61,4 0/0 n-Propanol in einem flüchtigen, gut netzenden organischen Lösungsmittel.		Bestandteile
Zur Desinfektion des Operationsfeldes und von Injektionsstellen, zur Therapie von Dermatomykosen und zur Antisepsis und Granulationsförderung bei der Wundbehandlung.		Indikation
Abreiben bzw. Bestreichen mittels Mulltupfer 2 mal täglich.		Dosierung
Flasche mit 20 g DM 0,80		Handelsform und Preise
Flasche mit 250 g DM 4,15		
Flasche mit 1000 g		
für Kliniken DM 9,10		
für Private DM 10,90		
VEB Serum-Werk Dessau		Hersteller

Vaopin-Salbe		(43 28 19 00)	A VVP 15/211
Bestandteile	Phenol-Campher n. Chlumsky 6,0, Perubalsam 2,0, Karwendol 5 %, Vasenol-Lipoid-Salbengrundlage 87,0		
Indikation	Bei putriden Gewebsdefekten: Ulcus cruris, Decubitalgeschwüren, beginnender Mastitis, Pernionen, Panaritien, Brandwunden.		
Handelsform und Preise	Dose mit 30 g DM 1,15 Klinikpackung mit 500 g DM 9,60		
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig		
Vaopin-Wundstreupulver		(43 28 19 00)	A VVP 15/212
Bestandteile	Phenol-Campher n. Chlumsky 6,0, Vasenol-Lipoid-Fett-Konzentrat 3,3, Zinkoxyd 4,0, Borsäure 0,7, Silic. colloidal 2,0, Talc. verschied. Arten 84,0		
Indikation	Zur Heilung infektiöser Gewebsprozesse, wundreinigend bei septischen, chirurgischen Erkrankungen, Puritus und zur Nabelpflege des Neugeborenen.		
Handelsform und Preise	Streudose mit 15 g DM 0,60 Streudose mit 50 g DM 1,50 Klinikpackung mit 500 g DM 7,40		
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig		
Varico-Calorose		(43 27 11 00)	VVA 02/205
Bestandteile	50- und 60%ige sterile Invertzuckerlösung.		
Indikation	Zur Varicen- und Haemorrhoidalknoten-Verödung, zur Hydrozelenbehandlung.		
Dosierung	Intravenöse Injektion in den zentralwärts abgebundenen entbluteten Venenabschnitt 5-10 ccm. Stauung 8-10 Min. post Inj. entfernen. Heftpflasterverschluß.		
Handelsform und Preise	Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm 50 % DM 2,25 Packung mit 5 Amp. zu 10 ccm 60 % DM 3,05		
Hersteller	VEB Kali-Chemie „Rhenania“, Berlin-Niederschöneweide		

(43 28 25 00)	ARp VVP 07/203/204	Varicocid
5- und 10 %ige Lösung der Natriumsalze bestimmter Fettsäuren des Lebertrans.		Bestandteile
Zur Verödung von Varicen, Haemorrhoiden und Haemangiomen.		Indikation
Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.		Dosierung
Packung mit 3 Amp. zu 3,3 ccm 5% DM 1,00 Packung mit 5 Amp. zu 3,3 ccm 5% DM 1,40 Packung mit 30 Amp. zu 3,3 ccm 5% DM 5,61 Packung mit 3 Amp. zu 5,5 ccm 5% DM 1,35 Packung mit 5 Amp. zu 5,5 ccm 5% DM 1,90 Packung mit 30 Amp. zu 5,5 ccm 5% DM 7,46 Packung mit 3 Amp. zu 1,1 ccm 10% DM 0,90 Packung mit 5 Amp. zu 1,1 ccm 10% DM 1,50 Packung mit 30 Amp. zu 1,1 ccm 10% DM 5,73 Packung mit 3 Amp. zu 3,3 ccm 10% DM 1,35 Packung mit 5 Amp. zu 3,3 ccm 10% DM 2,10 Packung mit 30 Amp. zu 3,3 ccm 10% DM 8,37 Packung mit 3 Amp. zu 5,5 ccm 10% DM 1,75 Packung mit 5 Amp. zu 5,5 ccm 10% DM 2,75 Packung mit 30 Amp. zu 5,5 ccm 10% DM 11,05		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 61 30 00)	VVP 15/209	Vasenol-Brandbinde
Gewebe 10,0, Vasenol-Lipoid-Salbengrundlage 35,0, Vasenol-Pudergrundlage 55,0.		Bestandteile
Bei Verbrennungen und Verbrühungen 1. und leichten 2. Grades.		Indikation
Packung mit 1 mX10 cm DM 0,45 Packung mit 2 mX10 cm DM 0,70 Packung mit 4 mX10 cm DM 1,10		Handelsform und Preise
VEB Vasenol-Werk, Leipzig		Hersteller
(48 63 30 00)	VVP 15	Vasenol-Fuß-Puder (Vasenoform-Puder)
Vasenol-Lipoid-Pudergrundlg. 97,0, Formalin 2,0, Salicylsäure 1,0		Bestandteile
Schweißfuß und Hyperhidrosis jeglicher Ätiologie, Prophylaktikum und Therapeuticum bei Balanitis und unspezifischen spitzen Condylomen.		Indikation
Streudose mit 81 g DM 0,63 Nachfüllbeutel mit 70 g DM 0,38		Handelsform und Preise
VEB Vasenol-Werk, Leipzig		Hersteller

Vasenol-Hautschutz-Salbe Typ FS		(43 29 90 00)	VVP 15
Bestandteile	Natrium-Laktat-Pufferlösung 39,4, Vasenol-Lipoid-Tannat 19,5, hochmolekulare Kohlenwasserstoffe 9,0, Vaseline 32,1		
Indikation	Schutz vor Hautschädigungen durch Wasser, Säuren, Laugen, Schmutz, Staub, Hitze.		
Handelsform und Preise	Dose mit 500 g DM 3,85 Dose mit 1000 g DM 7,20		
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig		
Vasenol-Hautschutz-Salbe Typ W		(43 29 90 00)	VVP 15
Bestandteile	Hochmolekulare Kohlenwasserstoffe 7,0, Lanettewachs 15,0, Wollfett- und Wollwachsalkohole 1,0, Aqua dest. 77,0		
Indikation	Schutz vor Hautschädigungen durch Öle, Petroleum, Benzin, Lacklöser, Trichloräthylen u. a.		
Handelsform und Preise	Dose mit 500 g DM 3,35 Dose mit 1000 g DM 6,20		
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig		
Vasenol-Kinder-Creme		(43 28 16 00)	VVP 15/217
Bestandteile	Vasenol-Lipoide 12,0, Zinkoxyd 10,0, neutrale Vaselinöle 7,0, Salbengrundlage 71,0.		
Indikation	Vasenol-lipoidhaltige, tiefenwirksame Hautcreme als Schutz gegen Hautreizungen aller Art. Zur täglichen Kinderpflege.		
Handelsform und Preise	Dose oder Tube mit 23 g DM 0,36 Klinikpackung mit 1000 g DM 4,86		
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig		
Vasenol-Körper-Puder (Sanitäts-Puder)		(48 63 29 00)	VVP 15
Bestandteile	Vasenol-Lipoid-Pudergrundlage 98,3, Formalin 0,7, Salicylsäure 0,5, Parfümöle 0,5		
Indikation	Prophylaxe des Wundwerdens, namentlich stark schweißabsondernder Hautgebiete.		
Handelsform und Preise	Streudose mit 81 g DM 0,63 Nachfüllbeutel mit 70 g DM 0,38 Vorratspackung mit 560 g DM 2,11		
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig		

(43 28 17 00)	A VVP 15/207	Vasenol-Leberöl-Paste 25%/o
Ol. Jec. As. 25,0, Zinc. oxyd. 20,0, Talcum 17,0, Vasenol-Lipoid-Salbengrundlage 38,0		Bestandteile
Dermatosen weniger tiefgreifender Art, Ulcus cruris, Combustio I, Decubitus.		Indikation
Dose mit 30 g	DM 0,60	Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 500 g	DM 2,55	
VEB Vasenol-Werk, Leipzig		Hersteller
(43 29 90 00)	VVP 15/215	Vasenol-Öl (Wund- u. Kinder-Öl)
Vasenol-Lipoide 1,25, aether. Öle 0,07, tier. Öle, Ol. Jec. As. 3,25, neutrale Vaselinöle 95,43		Bestandteile
Säuglingspflege, allgemeine sowie besonders schuppene Dermatosen, Brustwarzenpflege, Ölwickel und als Kopplungsmittel in der Ultraschall-Therapie. Pro receptura.		Indikation
Flasche mit 50 g	DM 0,65	Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 500 ccm	DM 2,60	
VEB Vasenol-Werk, Leipzig		Hersteller
(43 28 16 00)	VVP 15/216	Vasenol-Paste
Vasenol-Lipoide 8,5, Glukose 2,0, Zinkoxyd 20,0, Salbengrundlage 69,5		Bestandteile
Bei Hautschäden von Säuglingen und Kindern, oberflächigen Hautaffektionen, vornehmlich nicht seborrhoischer Art und als Deckpaste.		Indikation
Dose mit 29 g	DM 0,50	Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 1000 g	DM 4,45	
VEB Vasenol-Werk, Leipzig		Hersteller
(43 24 11 00)	VVP 15/213	Vasenol-Schwefel-Puder
Vasenol-Cholesterin-Schwefel-Konzentrat 3,0, Vasenol-Lipoid-Pudergrundlage 97,0		Bestandteile
Schwefel-Dermo-Therapie der täglichen Praxis, Comedonen, Akne, Folliculitis, Pruritus. Zur Nachbehandlung von Scabies und Pyodermien.		Indikation
Streudose mit 50 g	DM 0,55	Handelsform und Preise
Klinikpackung mit 1000 g	DM 4,25	
VEB Vasenol-Werk, Leipzig		Hersteller

Vasenol-Tamponadestreifen P		(43 61 50 00)	A VVP 15/208
Bestandteile	Gewebe 15,0, Vasenol-Lipoid-Salbengrundlage 35,0, Vasenol-Pudergrundlage 50,0		
Indikation	Nicht verklebende, Nachblutung verhindernde Tamponade bei Operationen, vorwiegend im Schädelgebiet.		
Handelsform und Preise	Packung zu 1 cm×4 m DM 0,90 Packung zu 2 cm×1,5 m DM 0,45 Packung zu 4 cm×1,5 m DM 0,60 Klinikpackung zu 2 cm×10 m DM 1,77 Klinikpackung zu 4 cm×10 m DM 2,59		
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig		
Vasenol-Tamponadestreifen S		(43 61 50 00)	A VVP 15/208
Bestandteile	Gewebe 40,0, Vasenol-Lipoid-Salbengrundlage 60,0		
Indikation	Nicht verklebende, Nachblutung verhindernde Tamponade in der operativen Chirurgie, Gynäkologie, Otologie und Ophthalmologie.		
Handelsform und Preise	Packung zu 1 cm× 50 cm (Röhrchen zu 5 Stück) DM 0,85 Packung zu 1 cm×100 cm (Röhrchen zu 5 Stück) DM 1,40 Packung zu 2 cm× 50 cm (Röhrchen zu 5 Stück) DM 1,05 Packung zu 2 cm×100 cm (Röhrchen zu 5 Stück) DM 1,85 Packung zu 6 cm× 50 cm DM 0,70 Packung zu 6 cm×100 cm DM 1,05 Packung zu 12 cm× 50 cm DM 0,95 Packung zu 12 cm×100 cm DM 1,60		
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig		
Vasenol-Wund- und Kinder-Puder		(43 29 80 00)	VVP 15/218
Bestandteile	Vasenol-Lipoid-Fettkonzentrat 3,3, Zinkoxyd 4,0, Borsäure 0,7, Silicium colloidal 2,0, Talkumsorten bestimmter Aufsaugfähigkeit 90,0		
Indikation	Zur Pflege der kindlichen Haut, Therapie des Wundseins, Decubitus-Prophylaxe.		
Handelsform und Preise	Streudose mit 100 g DM 0,72 Nachfüllbeutel mit 100 g DM 0,49 Vorratspackung mit 560 g DM 2,25 Doppelvorratspackung mit 1120 g DM 4,05 Klinikpackung mit 5 kg DM 8,50		
Hersteller	VEB Vasenol-Werk, Leipzig		

(43 24 34 00)	ARp VVP 15/210	Vasenolum mercuriale 33%
Hydrarg. 33,0, Vasenol-Lipoid-Salbangrundlage 67,0		Bestandteile
Hg-Therapie der Lues, multiple Sklerose, Thrombose und sympath. Ophthalmie.		Indikation
Grad. Glastube mit 30 g DM 1,30		Handelsform und Preise
VEB Vasenol-Werk, Leipzig		Hersteller
(43 26 69 00)	A VVT 03/214	Viocid
Methyl-para-rosanilin. chlorat. 0,02 g in Dragees mit magenunlös- licher Spezialdecke.		Bestandteile
Unschädliches und höchst wirksames Oxyurenmittel.		Indikation
Erwachsene 3 mal täglich 3 Dragees unmittelbar vor den Mahlzeiten. Kinder erhalten für je 2 vollendete Lebensjahre 1 Dragee als Tagesmenge vor den Hauptmahlzeiten. Kur- dauer 3 Tage, auch bei Kindern. Kur nach 3 Wochen wie- derholen. In hartnäckigen Fällen ist die Kur 7 Tage durch- zuführen.		Dosierung
Glas mit 63 Dragees DM 0,80 Klinikpackung mit 630 Dragees DM 4,65		Handelsform und Preise
VEB Promassol-Werk, Erfurt		Hersteller
(43 21 64 00)		Viperolan-Salbe
Vipera berus-Toxin in optimaler Konzentration (1:100000), Kie- selsäure, schwachsaure Salbangrundlage.		Bestandteile
Neuritis, Arthritis, Ischias, Rheuma, allerg. Haut- und Schleim- hauterscheinungen, Asthma bronchiale, periphere Kreis- laufstörungen.		Indikation
Tube mit 10 g DM 1,50 Klinikpackung mit 150 g DM 15,10		Handelsform und Preise
VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee		Hersteller

Vipracutan	(43 21 64 00)	A VVP 01/211 A VVP 02/211
Bestandteile	Schlangengift-Methylsalicylat-Kampfer-Einreibung in Emulsionsform. 6% Methylsalicylat, 2,1% Kampferwirkstoffe, 0,001% Viperintoxin, 21,8% Ammonseifen und Emulgatoren.	
Indikation	Zur Behandlung rheumatischer und neuralgischer Krankheitszustände, Ischias, Arthritiden, Arthropathien usw.	
Dosierung	In die Haut einreiben bis zum Auftrocknen. Besonders intensive Wirkung nach heißen Bädern oder Schwitzpackungen.	
Handelsform und Preise	Flasche mit 30 g DM 1,50 Flasche mit 50 g DM 2,10	
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau VEB Serum-Werk Weißensee, Berlin-Weißensee	
Viprasid	(43 45 90 00)	ARp VVP 01/210
Bestandteile	Sterile Injektionslösung mit 0,1 mg/ccm Viperintoxingehalt, konserviert, staatlich und klinisch geprüft, 2 Jahre verwendbar.	
Indikation	Zur Behandlung rheumatischer und neuralgischer Erkrankungen, Arthropathien, Lumbago, Ischias, Herpes zoster, gegen Bronchialasthma sowie zur Analgesie bei Karzinomschmerzen und tabischen Krisen.	
Dosierung	Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.	
Handelsform und Preise	Karton mit 5 Amp. zu je 1 ccm DM 5,05 Amp.-Flasche mit 5 ccm DM 4,20	
Hersteller	VEB Serum-Werk Dessau	
Viropect	(43 29 12 00)	A S 10/224
Bestandteile	Spezialauszug aus: Inula helen. 1,0, Cuprum acetic. D3 10,0, Tart. emet. D3 10,0, Sacchar. ad 100,0.	
Indikation	Husten, Keuchhusten.	
Dosierung	Je nach der Stärke der Krankheitserscheinungen 2-3 stündlich eine kleine Messerspitze des Pulvers trocken oder in Flüssigkeit nehmen.	
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 10 g Pulver DM 0,60 Flasche mit ca. 20 g Pulver DM 1,10	
Hersteller	VEB Homöopharm Dr. W. Schwabe, Leipzig	

Vitamin A in öliger Lösung		(43 27 61 00)	ARp VVP 07/813
Bestandteile	1 ccm=50000 IE Vitamin A		
Indikation	Vitamin A-Hypo- und Avitaminosen, z. B. Hemeralopie, Xerophthalmie, Keratomalazie, Epithelschädigungen von Haut und Schleimhaut, Lithiasis, Struma, evtl. mit nachfolgender Thyreoidea-Behandlung.		
Dosierung	Täglich 10 Tropfen.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 10 ccm		DM 4,25
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden		
Vitamin A + D in öliger Lösung		(43 27 71 00)	ARp VVP 07/212
Bestandteile	Vitamin A und Vitamin D in öliger Lösung (45000 IE Vitamin A + 4500 IE Vitamin D in 1 ccm).		
Indikation	Prophylaktisch und therapeutisch bei A- und D- Hypo- und Avitaminosen, z. B. Appetitlosigkeit u. Wachstumsstörungen der Kinder, Rachitis, Spasmophilie, Osteomalazie, Katarre von Magen, Darm u. Atmungsorganen, Tuberkulose, Lymphdrüenschwellungen.		
Dosierung	Prophylaktisch: 5 Tropfen (= 1 Eßlöffel hochwertigem Medizinalebertran)=600 IE Vitamin A+60 IE Vitamin D. Therapeutisch: 15-30 Tropfen täglich.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 15 ccm		DM 5,10
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden		
Vitamin B₁ (Aneurin) Amp. 5, 25 u. 100 mg		(43 27 63 00)	A VVP 07/819/820/821
Indikation	Bei B ₁ -Hypo- und Avitaminosen, z. B. Neuralgien, Neuritiden, Parästhesien, toxischen Polyarthritiden, Ernesis, Herpes zost.		
Dosierung	1 Amp. s. c., i. m. oder i. v. injizieren.		
Handelsform und Preise	Packung mit 10 Amp. zu 1,1 ccm 5 mg		DM 2,90
	Packung mit 3 Amp. zu 1,1 ccm 25 mg		DM 3,15
	Packung mit 3 Amp. zu 2,2 ccm 100 mg		DM 4,75
	Packung mit 10 Amp. zu 2,2 ccm 100 mg		DM 14,10
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden		
Vitamin B₁ (Aneurin) Tabl. 0,003 g		(43 27 62 00)	ARp VVP 07/260
Indikation	Bei leichteren B ₁ -Hypo- und Avitaminosen.		
Dosierung	3 mal täglich 1-2 Tabletten		
Handelsform und Preise	Röhrchen mit 20 Stück		DM —,95
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		

(43 27 68 00)	A VVP 14/853/854	Vitamin K „Pharma“
2-Methyl-1,4-naphthochinon-Natriumbisulfid. Prophylaktisch bei Geburtsvorgängen, therapeutisch bei Hypoprothrombinaemie der Neugeborenen und ihren Folgeerscheinungen, haemorrhagischer Diathese, bei Fettresorptionsstörungen infolge Gallenwegverschlusses, mangelnder Vitamin-K-Synthese infolge Fehlens von Colibazillen im Darm, zur Prophylaxe vor Gallenoperationen, bei Schäden durch die Dicumarol-Therapie. Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung. Packung mit 5 Amp. zu 1 ccm (1 %) . . . DM 1,25 Klinikpckg. mit 25 Amp. zu 1 ccm 1 %) DM 4,40 Röhrchen mit 20 Tabl. zu 0,1 g (10 %) DM 1,01 Klinikpckg. mit 250 Tabl. zu 0,1 g (10 %) DM 6,74		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise
VEB Pharm. Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		Hersteller
(43 29 12 00)	A S 10/226	Vitaplasgen
Calcium fluorat. D 1 0,10, Ferrum sulfur. sicc. 0,10, Siccarom 0,20, Hagebutten-Konz. 150 mg%, Vitamin C 6,67, Möhren-Konz. 100 mg, Carotin 3,45, Hefe (0,8 mg Vitamin B1+2,8 mg Vitamin B2 +0,5 % Ergosterin) 17,0, Kalksalze 8,18, Dextrose 6,70, Molken 4,50, Sacch. album 53,1 Erschöpfungszustände, Blutarmut, Störungen im Knochenaufbau und im Wachstum, Zahnkaries, Kalktherapie (Schwangerschaft, Kleinkind). 3 mal täglich 1 Teelöffel voll, Kinder je nach Alter etwas weniger, in Milch, Suppe oder dem Essen beigemischt zu nehmen. Packung mit ca. 85 g Pulver DM 1,75		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise
VEB Homöopharm Dr. Schwabe, Leipzig		Hersteller
(43 28 16 00)	VVS 01/203	Wecusta-Balsam
Oleum Pedum Tauri 57 %, Zinc. oxyd. 6 %, Salbengrundlage 37 % Sonnen- und Gletscherbrand, Brandwunden, Wundsalbe für die Säuglingspflege, Hautschutzmittel. Dose mit 30 g DM 1,15 Klinikpackung mit 1000 g DM 18,90		Bestandteile Indikation Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden		Hersteller
(43 26 19 00)	A VVS 01/202	Wecustan
Oleum Pedum Tauri mit den Vitaminen A, D und F im biologischen Verhältnis. Bei Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni, Gastritis. Täglich 3 mal 1 Kaffee- bis 1 Eßlöffel vor den Mahlzeiten. Flasche mit 100 ccm DM 2,40 Klinikpackung mit 500 ccm DM 9,45		Bestandteile Indikation Dosierung Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden		Hersteller

Wildunger-Salz (43 24 69 00) VVSA 01/205	
Bestandteile	Sal Wildungen factit. Erg. Bd. VI pulv.: Natr. bicarb., Natr. chlorat. Natr. sulf. calc., Kal. sulf., Calc. carb., Magn. carb.
Indikation	Cystitis, Arthritis.
Handelsform und Preise	Stülpeschachtel mit ca. 50 g DM 0,38
Hersteller	VEB Eumarhal-Werk Bernburg
Wismusan oleosum und oleosum forte (43 24 33 00) ARp VVSx 03/215/216	
Bestandteile	0,05 bzw. 0,1 g Bi/ccm in öliger Suspension.
Indikation	Syphilis, Framboesie, Angina Plaut Vincent, Lupus erythematodes.
Dosierung	Man setzt durchschnittlich 2 mal wöchentlich intragluteale Depots von 1-1,5 ccm ggf. mit einwöchigen Pausen, je nach Stärke des Präparates und der Allgemeinverträglichkeit und unter Beachtung der interkurrenten Symptomatik.
Handelsform und Preise	Flasche mit 15 ccm DM 1,73 Flasche mit 30 ccm DM 2,72 Flasche mit 90 ccm DM 6,76
Hersteller	VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben
Wofapas (PAS Wolfen) (43 25 29 00) ARp F 01/206/210	
Bestandteile	p-Aminosalicylsaures Natrium + 2 H ₂ O
Indikation	Chemotherapeuticum zur Behandlung der Tuberkulose aller Formen und Stadien.
Dosierung	Dosierung nur nach ärztlicher Verordnung.
Handelsform und Preise	1 Originalpackung 1500 Dragees zu 0,3 p-Aminosalicylsäure=0,41 g „Wofapas“ DM 87,70 1 Kurpackung 5000 Dragees zu 0,3 p-Aminosalicylsäure=0,41 g „Wofapas“ DM 270,— 1 Originalpackung 1500 Tabl. zu 0,3 p-Aminosalicylsäure=0,41 g „Wofapas“ DM 87,70 1 Kurpackung 5000 Tabl. zu 0,3 p-Aminosalicylsäure=0,41 g „Wofapas“ DM 270,— 10 Amp. zu 2,3 g PAS-Natrium „steril“ DM 7,22 50 Amp. zu 2,3 g PAS-Natrium „steril“ DM 30,68 100 g „Wofapas“-Substanz DM 14,26 350 g „Wofapas“-Substanz DM 49,91
Hersteller	VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld

(43 28 14 00)	F 01/204	Wofasept
10 % Alkylhalogenphenol, 17 % Paraffinsulfonat, Lösungsmittler und Korrigentia.		Bestandteile
In der ärztlichen Praxis: Zur Desinfektion der Hände, Instrumente, Einrichtungsgegenstände mit 2-3 %iger Lösung.		Indikation
In der häuslichen Hygiene: Zur Desinfektion am Krankenbett mit 2-3 %iger Lösung, zur Reinigung des Krankenzimmers mit 5 %iger Lösung auswaschen.		
In der Säuglingspflege: Am Wochenbett m. 0,5 %iger Lösung		
Flasche mit 250 ccm	DM 2,50	Handelsform und Preise
Flasche mit 1000 ccm	DM 7,85	
10 kg lose Ware		
25 kg lose Ware		
50 kg lose Ware		
VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld		Hersteller
(43 28 14 00)	F 01/205	Wofasept „spezial“
Konzentriertes Fein-Desinfektionsmittel auf Alkylhalogenphenolbasis.		Bestandteile
Waschungen transpirierender Körperstellen, Fuß- und Sitzbäder m. 0,5 %iger Lösung, Vaginalspülungen m. 0,25 %iger bis maximal 0,5 %iger Lösung.		Indikation
$\frac{1}{2}$ -1 Teelöffel auf 1 Ltr. Wasser.		Dosierung
Flasche mit 100 g	DM 1,30	Handelsform und Preise
VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld		Hersteller
(43 28 14 00)	F 01/208	Wofasept „Tbc“
Konzentrat auf Alkylhalogenphenolbasis' zu äußerlicher Anwdg.		Bestandteile
Zur Desinfektion bei Tbc-verschmutzter Wäsche, Einrichtungsgegenständen und Instrumenten 5 %ige Lösung, zur Raumdesinfektion 5 %ige Lösung, zur Sputum und Stuhl-desinfektion 5 %ige Lösung. Einwirkungsdauer 4 Stunden.		Indikation
50 ccm = $3\frac{1}{2}$ Eßlöffel voll auf 1 Ltr. Wasser.		Dosierung
Flasche mit 250 ccm	DM 2,30	Handelsform und Preise
Flasche mit 1000 ccm	DM 7,75	
10 kg lose Ware		
25 kg lose Ware		
50 kg lose Ware		
VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Krs. Bitterfeld		Hersteller

W-Tropfen		(48 69 90 00)	VVP 11
Bestandteile	Collodiumlösung 5%ig 8,14, Milchsäure 0,80, Salicylsäure 1,00, Anaesthesin 0,025, Kolophonium 0,035.		
Indikation	Hervorragendes Mittel zur schmerzlosen Entfernung von Hühneraugen, Warzen und Hornhaut.		
Dosierung	Siehe den Packungen beigegebene Gebrauchsanweisung.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 10 g DM 1,25		
Hersteller	VEB Pharm. Werk Pankow, Berlin-Pankow		
Wund- und Heilsalbe		(43 28 12 00)	A VVT 02/217
Bestandteile	Bismut. subnitric. 2,0, Acid. boric. pulv. 7,0, Zinc. oxydat. 3,5, Balsam. peruvian. 2,5, Salbengrundlage 85,5.		
Indikation	Tube mit ca. 25 g DM 0,50		
Handelsform und Preise	Tube mit ca. 25 g DM 0,50		
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		
Zahnungsmittel Paldont		(43 23 75 00)	VVP 05/231
Bestandteile	Tinct. Myrrh. 0,5, Tinct. Chamom. 6,5, p-Aminobenzoessäure-aethylester 0,03, Diamantfuchsin 0,005, Glycerin. ad 100,0.		
Indikation	Linderungsmittel für zahnende Kinder.		
Handelsform und Preise	Tropfflasche mit 10 g DM 0,62		
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/03/28 : CIA-RDP80S01540R001000010005-0

Anhang

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/03/28 : CIA-RDP80S01540R001000010005-0

Medizinische Tees

(43 26 41 00)	VVP 10/001	Abführtee
Cort. Frang. 35,0, Flor. Chamomillae c. Herba, Fruct. Foeniculi vulg., Rhiz. Rhei aa 5,0, Fruct. Rhamni cath. immat., Herba Menthae pip. aa 10,0, Herba Convolvuli, Rhiz. Graminis aa 15,0.		Bestandteile
Obstipation, zur Ableitung auf den Darm und Umstimmung bei chronischen Erkrankungen, Ekzemen, Leber- und Gallenleiden.		Indikation
Aufguß im Laufe des Tages schluckweise trinken.		Dosierung
Packung mit ca. 75 g DM 1,00		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 24 69 00)	VVP 10/002	Blasen u. Nierentee
Folia Betulae 22,0, Folia Uva Ursi, Herba Equiseti aa 15,0, Folia Menthae pip., Radix Levistici aa 5,0, Fruct. Berberidis 1,0, Fruct. Juniperi 4,0, Herba Virgae aur., Cortex fruct. Phaseoli aa 10,0, Radix Ononidis, Flores Calendulae aa 2,0, Radix Petroselinii 3,0, Herba Ericae 6,0.		Bestandteile
Ableitungsmittel auf die Nieren bei chronischen und akuten Nephro- und Cystopathien, Hydrops, Gicht.		Indikation
Aufguß im Laufe des Tages schluckweise trinken.		Dosierung
Packung mit ca. 75 g DM 0,90		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 18 70 00)	VVP 05/002	Blasen- u. Nierentee
Cortex Salicis 8,0, Fol. Betulae 7,0, Fol. Myrtilli 5,0, Fruct. Phaseoli 10,0, Herba Equiseti 10,0, Herba Ericae 20,0, Herba Millefollii 6,0, Herba Urticae 2,0, Radix Levistici 17,0, Radix Ononidis 15,0.		Bestandteile
Diureticum.		Indikation
Morgens nüchtern und abends vor dem Schlafengehen je eine Tasse lauwarmen Auszug möglichst ungesüßt trinken.		Dosierung
Packung mit ca. 50 g DM 0,50		Handelsform und Preise
VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		Hersteller

Blutreinigungstee	43 18 30 00)	VVP 07/001
Bestandteile	Cort. fruct. Phaseoli 10,0, Stip. Dulcamarae 8,0, Cort. Frangul. 15,0, Herba Millefoli. 20,0, Flor. Sambuci, Fruct. Foeniculi aa 5,0, Rhiz. Graminis 12,0, Herba Ericae c. flor. 22,0, Flor. Cyani 2,0, Flor. Calendulae 1,0.	
Indikation	Zur Blutreinigung.	
Dosierung	Auszug im Laufe des Tages schluckweise trinken.	
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 75 g DM 0,90	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul	
Brust- u. Hustentee	43 23 19 00)	VVP 10/003
Bestandteile	Flor. Verbasci, Fruct. Foeniculi, Herba Thymi germ., Rad. Inulae aa 5,0, Folia Farfarae 33,0, Folia Menthae pip. 2,5, Herba Teucrii scorod., Radix Althaeae aa 10,0, Herba Polygonii 14,0, Herba Plantaginis lanceol. 7,5, Flores Cyani 1,0.	
Indikation	Akuter und chronischer Luftröhren- und Bronchialkatarrh, Asthma bronchiale, Bronchiektasien, Pertussis.	
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 75 g DM 1,10	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul	
Brust- u. Hustentee	(43 18 70 00)	VVP 05/003
Bestandteile	Flor. Paeonia 1,5, Flor. Verbasci 1,5, Fol. Farfarae 30,0, Fruct. Foenic. 7,5, Herba Plantagin. 17,0, Herba Polygoni avic. 10,0, Herba Rubi fruct. 22,5, Herba Thymi 5,0, Rad. Althaeae 5,0.	
Indikation	Antitussicum.	
Dosierung	Dreimal täglich eine Tasse voll so heiß wie möglich mit Zucker oder Fenchelhustensaft gesüßt.	
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 50 g DM 0,62	
Hersteller	VEB Chemidroph-Werk Chemnitz	
Entfettungstee	(43 18 70)	VVP 10/005
Bestandteile	Cort. Frangulae, Fucus vesicul., Herba Alchemillae aa 20,0, Cort. Salicis, Herba Adonidis, Flores Cyani aa 5,0, Folia Betulae 10,0, Folia Menthae pip. 15,0.	
Indikation	Adipositas.	
Dosierung	Auszug im Laufe des Tages schluckweise trinken.	
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 75 g DM 1,00	
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul	

(43 18 70 00)	VVP 10/007	Gicht- u. Rheumatee
Cort. Salicis 20,0, Flor. Tiliae c. bract., Herba Millefolii aa 5,0, Folia Betulae, Herba Equiseti arv. aa 15,0, Herba Spiraeae ulmar. 8,0, Herba Urticae 6,0, Fruct. Cynosbatii 15,0, Cortex Frangulae 4,0, Rad. Ononidis 7,0.		Bestandteile
Gicht- und Rheumaleiden.		Indikation
Auszug im Laufe des Tages schluckweise trinken.		Dosierung
Packung mit ca. 75 g DM 0,90		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 18 70 00)	VVP 10/006	Leber- u. Gallentee
Cort. Frangulae, Herba Chelidoni aa 15,0, Flores Chamomillae vulg. c. herba, Rad. Angelicae, Folia Melissae, Herba Agrimoniae aa 5,0, Herba Millefolii 20,0, Herba Menthae crisp., Radix Taraxaci c. herba, Herba Menthae pip. aa 10,0.		Bestandteile
Chron. Cholecystitiden, Hepatitis, Leberzirrhose.		Indikation
Auszug im Laufe des Tages in 2 Portionen warm zu trinken.		Dosierung
Packung mit ca. 75 g DM 1,10		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 18 71 00)	VVP 10/010	Magentee
Herba Ericae, Herba Menthae pip. aa 20,0, Herba Rubi Idaei, Herba Rubi Fruticosi aa 22,5, Folia Salviae 8,0, Folia Melissae 5,0, Flores Calendulae c. cal. 2,0.		Bestandteile
Appetitlosigkeit, Dyspepsie, Störungen der Magensekretion.		Indikation
Aufguß 3 mal täglich warm trinken.		Dosierung
Packung mit ca. 75 g DM 1,10		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller
(43 18 70 00)	VVP 10/011	Nerventee
Flor. Humuli lupuli 6,0, Flor. Chamom. vulg. c. herba, Flor. Lavandulae, Herba Passifl. aa 5,0, Folia Melissae 32,0, Herba Menthae pip., Radix Valerianae aa 15,0, Herba Cardui bened. 10,0, Herba Rubi frutic. 7,0.		Bestandteile
Nervöse Erregungszustände, Neigung zu Krämpfen, Angina pectoris.		Indikation
Den gesamten abgekühlten Aufguß abends auf einmal trinken.		Dosierung
Packung mit ca. 75 g DM 1,10		Handelsform und Preise
VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		Hersteller

Schweißtreibender Tee		(43 18 70 00)	VVP 10/012
Bestandteile	Flor. Sambuci 20,0, Fruct. Cynosbati c. sem. 13,0, Fruct. Sambuci 3,0, Herba Urticae, Folia Verbasci aa 10,0, Cort. Salicis 5,0, Radix Angelicae 4,0, Herba Spireae ulm. 15,0.		
Indikation	Fieberhafte Erkrankungen.		
Dosierung	3-4 mal täglich heiße Aufgüsse trinken.		
Handelsform und Preise	Packung mit ca. 75 g DM 1,10		
Hersteller	VEB Arzneimittelwerk Dresden-Radebeul		
Thüringer Hausmittel			
Balsam Nr. 35		(43 26 19 00)	A VVT 02/208
Bestandteile	Spiritus 56 Vol.-%, Olibanum 0,056 %, Myrrha 0,056 %, Benzoe 0,056 %, Herb. Millefol. 1 %, Flor. Arnicae 1 %, Flor. Chamomill. 1 %, Rad. Alcannae 1,7 %, Rad. Angelicae 0,5 %		
Indikation	Bei Magen- und Darmbeschwerden, Ohnmachten, Schwächeanfällen.		
Dosierung	Mehrmals täglich 15 Tropfen.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 30 ccm DM 0,60 und Sprit-Zuschlag DM —,11		
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		
Dreierlei-Tropfen		(43 26 19 00)	VVT 02/824
Bestandteile	Tinct. Valerian. comp. F. M. B.		
Indikation	Magen- und Nervenberuhigungsmittel.		
Dosierung	Bei Bedarf 20-30 Tropfen.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 30 ccm DM 0,65 und Sprit-Zuschlag DM 0,18		
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		
Durchfalltropfen		(43 26 59 00)	A VVT 02/209
Bestandteile	Rad. Angel. 1,25 %, Herba Alchem. 1 %, Flor. Cham. 0,5 %, Rhiz. Calam. 1,25 %, Fol. Ment. crisp. 1,25 %, Rhiz. Torment. 2,5 %, Fruct. Aur. imm. 1,9 %, Flor. Caryoph. 0,05 %, Spir. 48 Vol.-%		
Indikation	Magen- und Darmstörungen, Durchfall.		
Dosierung	1/4-stündlich 10 Tropfen bis zur Besserung.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 30 ccm DM 0,50 und Sprit-Zuschlag DM 0,09		
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		

(43 23 14 00)	VVP 05/206	Fenchel-Hustensaft
Tinct. Foeniculi comp. 1,0, Sacch. crist. 60,0, Nipagin M 0,2, Infus. Foeniculi ad 100,0		Bestandteile
Antitussicum pro infantibus.		Indikation
Flasche mit ca. 125 g DM 0,88		Handelsform und Preise
VEB Chemidroph-Werk Chemnitz		Hersteller
(43 23 12 00)	VVT 02/218	Fenchelsirup mit rein. Bienenhonig
Mel. 10%, Sir. Amyli 58%, Maz. Foeniculi 2,4%, Saccharum 12%, Aqua dest. ad 100,0%		Bestandteile
Katarthe der Atmungsorgane, Husten und Heiserkeit.		Indikation
Flasche mit ca. 90 g DM 0,85		Handelsform und Preise
VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		Hersteller
(43 21 61 00)	VVT 02/206	Fichtennadel- Franzbranntwein
Ol. aether. 0,22%, Menthol 0,02%, Camphor 0,73%, Spir. aeth. nitr. 0,1%, Spirit. 70 Vol.-%		Bestandteile
Einreibemittel zur Muskel- und Nervenstärkung, Massage- mittel für Sportler.		Indikation
Flasche mit ca. 125 ccm DM 1,65 und Sprit-Zuschlag DM 0,56		Handelsform und Preise
VEB Pharm.-Chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		Hersteller
(43 26 19 00)	A VVT 02/210	Haarlemer Öl
Sulfur 6%, Ol. Lini 92%, Ol. aetherea 2%		Bestandteile
Blutreinigungsmittel.		Indikation
3 mal täglich 16-20 Tropf. in Milch, Wein od. Zuckerwasser.		Dosierung
Flasche mit ca. 30 g DM 0,60		Handelsform und Preise
VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		Hersteller
(43 26 19 00)	VVT 02/212	Hingfong-Essenz
Drogenauszüge 10%, Aether 2,5 Vol.-%, Menthol 0,1%, Camphora 0,05%, aether. Öle 0,230%, Spirit. 65 Vol.-%		Bestandteile
Bei Magen- und Darmbeschwerden, Übelkeit und leichten Ohnmachten.		Indikation
20-25 Tropfen mehrmals täglich.		Dosierung
Flasche mit ca. 40 ccm DM 0,65 und Sprit-Zuschlag DM 0,17		Handelsform und Preise
VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		Hersteller

Hustentropfen-Destillat		(43 23 19 00)	VVT 02/213
Bestandteile	Spiritus 48 Vol.-%, Fruct. Anisi 3 %, Fruct. Foeniculi 3 %, Herba Thymi 3 %, Fol. Menth. crisp. 3 %, Camphora 0,01 %, Menthol. 0,02 %, Ol. Eucalypt. 0,05 %, Liqu. Amm. caust. 0,5 %, Aqua dest. ad 100,0 %		
Indikation	Bei Husten und Heiserkeit, Halsschmerzen		
Dosierung	20 Tropfen mehrmals täglich.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 30 ccm DM 0,60 und Sprit-Zuschlag DM 0,09		
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		
Melissengeist		(43 21 61 00)	VVT 02/815
Bestandteile	Spiritus 55 Vol.-%, Camphora 0,55 %, Ol. aether. 0,118 %		
Indikation	Schwächeanwandlungen, Magenbeschwerden, Neuralgie, Rheuma.		
Dosierung	Äußerlich Einreibung, innerlich 10-20 Tropfen auf Zucker.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 40 ccm DM —,59 und Sprit-Zuschlag DM —,15		
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		
Vispur-Mistelsaft		(43 25 99 00)	VVT 02/215
Bestandteile	Viscum album 20%, Acid. hydrochlor. pur. 1%, Spirit. 30 Vol.-%, Aqua dest. ad 100,0%		
Indikation	Bei Arteriosklerose und Beschwerden der Wechseljahre.		
Dosierung	3 mal täglich 1 Eßlöffel voll.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 125 ccm DM 1,60 und Sprit-Zuschlag DM 0,24		
Hersteller	VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		
Wiener Balsam		(43 26 19 00)	A VVT 02/216
Bestandteile	Spiritus 56 Vol.-%, Olibanum 0,2 %, Myrrha 0,2 %, Benzoe 0,2 %, Aloe 0,3 %, Rhiz. Rhei 0,6 %, Cort. Frangulae 0,6 %, Flor. Arnicae 0,3 %, Herba Millefol. 0,6 %, Aqua dest. ad 100,0 %		
Indikation	Bei Magen- und Verdauungsbeschwerden, zur Blutreinigung und Wundbehandlung.		
Dosierung	20-30 Tropfen mehrmals täglich. Äußerlich: getränkte Gaze als Wundverband.		
Handelsform und Preise	Flasche mit ca. 30 ccm DM 0,50 und Sprit-Zuschlag DM 0,11		
Hersteller	VEB Pharm.-Chem. Fabrik Meuselbach, Meuselbach/Thür.		

Sonstiges

(43 28 16 00)	VVP 05/797		Borsalbe 3 %
	Zur Wundbehandlung. Tube mit ca. 20 g	DM 0,36	Indikation Handelsform und Preise Hersteller
	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		
(43 12 00 00)			Bromoform DAB 6
	Für die Rezeptur. Flasche mit 125 g	incl. DM 3,75	Handelsform und Preise
	Flasche mit 1 kg	excl. DM 25,—	Hersteller
	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		
(43 29 90 00)			Cholesterol- Hautschutzsalbe
	Dose mit 50 g	DM 1,30	Handelsform und Preise
	Kruke mit 1000 ccm	DM 4,15	Hersteller
	VEB Eumarhal-Werk Bernburg		
(43 24 17 00)	VVSx 02/474		Essigsäure-Tonerde- Pulver
	Al OH(CH ₃ COO) ₂ Für Umschläge, Spülungen, Einläufe u. zur Wundbehandlung. Schachteln mit 10 g	DM 0,25	Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller
	VEB Chem. Fabrik Dörlau, Greiz-Dörlau		
(43 24 17 00)	VVP 14/475		Essigsäure-Tonerde- Tabletten
	Aluminium acetic. 96 %, Acid. boric. 1 % Wie vorstehend. Röhrchen mit 20 Tabl.	DM 0,50	Bestandteile Indikation Handelsform und Preise Hersteller
	VEB Pharm.-Werk Johannisthal, Berlin-Johannisthal		
(43 25 41 00)			Folia Digitalis purp. titrata
	Für die Rezeptur. Schachtel mit 5 Amp. zu 2 g Glas mit 25, 50 und 100 g		Handelsform und Preise
	VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul-Dresden		Hersteller

Höllensteinsteife 10 u. 25 mm	(43 28 22 00)	A VVP 04/220	
Bestandteile	Arg. nitric. 90 %, Kal. nitric. 10 %		
Handelsform und Preise	Karton mit 10 Stück (10 mm) je Stück DM 0,90 Karton mit 5 Stück (25 mm) je Stück DM 1,45		
Hersteller	VEB Pharm. Werk Oranienburg		
Mastibal	(43 28 19 00)	VVP 05/229	
Bestandteile	Colophonium 26 %, Aether 37 %, Carbon. tetrachlor. 37 %		
Indikation	Verbandfixiermittel zum Befestigen von Wundverbänden.		
Handelsform und Preise	Flasche mit 30 g DM 0,65 Flasche mit 100 g DM 2,02 Flasche mit 250 g DM 5,40 Flasche mit 500 g DM 8,50 Klinikpackung mit 1000 g DM 14,67		
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		
p-Oxybenzoesäure- methylester	(42 17 97 90)		
Handelsform und Preise	Für die Rezeptur Packung mit 25 g DM 1,96 Packung mit 100 g DM 5,78		
Hersteller	VEB Pharm. Werk Oranienburg		
Unguentum lanetti	(43 15 60 00)		
Bestandteile	Lanettewachs AH. 21 %, Cetiolan extr. 10 %, Glycerin 5 %, Konservierungsmittel q. s., Aqua dest. ad 100 %		
Handelsform	Glas mit 850 g lose 1000 g		
Hersteller	VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rodleben		
Vaseline gelb	(43 16 10 00)	VVP 05/858	
Handelsform und Preise	Tube mit ca. 20 g DM 0,35		
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		
Zinkpaste	(43 16 00 00)	VVP 05/717	
Handelsform und Preise	Tube mit ca. 20 g DM 0,40		
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		
Zinksalbe 10 %	(43 16 00 00)	VVP 05/812	
Handelsform und Preise	Tube mit ca. 20 g DM 0,36		
Hersteller	VEB Chemidropa-Werk Chemnitz		

Herstellerverzeichnis

VEB Aetherea

Fabrik für aetherische Öle, Essenzen und Aromen
Leipzig C 1, Friedrich-Ebert-Str. 118, Tel. 44746

Rheumatox
Sanopin

VEB Arzneimittelwerk Dresden

(früher Pharmazeutisches Werk Madaus)
Radebeul 1 — Dresden, Gartenstr. 16—22, Tel. 74 041

Acirufan	Myko liquid
Anthaesin-Salbe 10 %	Nervinum
Anti-Arterio-Calcin	Oral-Penicillin
Asthma-Tabletten II	Penicilletten
Aurocard-Herzgold	Penicillin ad inj.
Bio-Nektarin	Pevaletten
Carvomin-Magentropfen	Plenosol 0, I und II
Depot-Penicillin	Provenoplex
Diacard-Goldtropfen	Redskin
Echinacin ad inj.	Rutabion
Echinacin extern	Santa Flora
Echinacin intern	Sinusitan
Esenecal-Tinktur	Tinktusan
Eufoliat	Tropoplex
Hamamelis-Supp.	Uplex
Lacuprin	Uraton

Oligoplexe
Teep-Präparate
lt. Sonderverzeichnis

VEB Arzneimittelwerk Dresden
 (früher Pharmazeutisches Werk Gehe)
 Radebeul 1 — Dresden, Gartenstr. 16—22, Tel. 74041

Adonalis	Magenpulver
Adrenalin-Lösung 1:1000	Magenpulver mit Belladonna
Agobilin	Malto-Selloid
Anaesthesin-Menthol-Dragees	Malzextrakt (Maltyl) rein
Aqua bidestillata Amp.	Malzextrakt (Maltyl) mit Kalk
Arsen-Triferrol	Malzextrakt (Maltyl) mit Lecithin
Asthma-Tabletten I	Menthol-Eucalyptus-Dragees
Atropin. sulfuric. 0,0005	Natrium bicarbonicum Tabl. 0,5
und 0,001 Amp. und Tabl.	Natrium chloratum 10% Amp.
Bellatotal-Tabl. und Zäpfchen	Natrium citricum 3,8% und 5%
Bellatotal comp. Tabl. u. Zäpfchen	Amp.
Bismutum subnitricum Tabl. 0,5	Oleum camphoratum 10% und
Bromum compositum Tabletten 0,5	20% Amp.
Calcium chloratum 10% Amp.	Opium concentratum Amp. 0,02
Calcium gluconicum 10% Amp.	Opium concentratum Tabl. 0,01
Calcium-Resorpta-Sirup	Ovo-Transannon
Chinin-Dragees 0,1 und 0,3	Physiolog. Kochsalzlösung 0,9%
Chinin-Perlen 0,05	Pyrantine
Cholin-Kapseln	Scopolamin. hydrobrom. Amp.
Codeinum phosphoricum	0,0005
Tabletten 0,03	Secatropin-Tabletten
Coffeinum-Natrium benzoicum	g-Strophanthin-Amp. 0,25 und
Amp. 0,25	0,5 mg
Coffeinum-Natrium salicylicum	K-Strophanthin-Amp. 0,25 und
Amp. 0,25	0,5 mg
Digitoxin-Tabletten 0,0001	Strychnin. nitricum Amp. 0,001
Digibletten	und 0,003
Dihydrocodeinon bitartaricum	Tanninum albuminatum Tabl. 0,5
Tabletten 0,01	Testes siccati Dragees
Eugarrol	Thyreoidea siccata Dragees
Flaviform-Tabletten	Tonikum
Folia Digitalis purp. titrata	Transannon
Gecobrol	Traubenzucker-Lösung 20, 25 und
Gecolax	40% Amp.
Gecopulmin	Tryasol-Hustensaft
Hexamethylenetetramin-Tabl. 0,5	Tryasol-Hustensaft c. Codein
Hypophysis pars anterior-	Urocid
Dragees	Varicocid 5% und 10%
Indigocarmin 0,4%	Viscophyll Tropfen und Perlen
Inhalo	Vitamin A in öliger Lösung
Instillio	Vitamin A + D in öliger Lösung
Kamilliquid	Vitamin B ₁ -Ampullen
Kola „Gehe“	Vitamin B ₁ -Tabl. 0,003
Liquitalis Tropfen und Zäpfchen	

Galenische Präparate
 lose und in Handverkaufspackungen
 lt. Sonderverzeichnis

VEB Arzneimittelwerk Dresden

(früher Wecusta-Werk Dresden)

Radebeul 1 — Dresden, Gartenstr. 16—22, Tel. 74941

Anthaesin-Brustwarzenbalsam	Liulan 101
Anthaesin-Haembalsam	Liulan forte
Anthaesin-Salbe 10 0/0	Melven 20 0/0 und 40 0/0
Calmasan-Pulver	Oleum Terebinth. 15 0/0 und 40 0/0
Calmasan-Tabletten	Opetol
Echinacin-Salbe	Pulmogeran-Salbe
Frigidin-Salbe	Rhinogeran-Nasensalbe
Hamamelis-Salbe	Rhinogeran-Nasensalbe verstärkt mit Menthol
Hepartonyl forte	Styptan
Hypostin	Thrombin
Hypostin forte	Wecusta-Balsam
Lactalbin-Salbe	Wecustan
Lebertran-Salbe	
Oleum Pedum Tauri pur.	Spezialfette und -öle für die fein- mechanische, optische und Elektro-Industrie
Oleum Pedum Tauri pro inj.	
Uhrenöle	

VEB Chemidropa-Werk

Chemnitz, Moritzstr. 29—33, Tel. 46 945/46

Aminosin-Ampullen 4 0/0	Hatussin
Aminosin-Globuli	Ichthyolsalbe 20 0/0
Aminosin-Salbe	Lanat-Tabletten
Aminosin-Spiritus	Lanat-Tropfen
Aminosin-Zäpfchen	Lanat-Zäpfchen
Aminovagin	Mastibal
Blasen- und Nierentee	Melival
Boromenthol	Pyrolenin liqu.
Borsalbe 3 0/0	Rutanol 20
Bromoform DAB 6	Sacutil-Borglycerincreme
Brust- und Hustentee	Sacutil-Kinder-Creme
Choleratropfen	Sacutil-Kinder-Puder
Esmarolan	Sanal-Haemo-Salbe
Fenchelhustensaft	Sanal-Haemo-Zäpfchen
Glykokoll-Substanz Erg. B 6	Tussagutt
Glykolan-Salbe	Vitacardol
Glykopud	Zahnungsmittel Paldont
Glykosal-Tabletten	

Galenische Präparate

lose und in Handverkaufspackungen
ferner Salben, Salbenverreibungen, Tinkturen, Fluidextrakte,
Spirituspräparate, Pharmazeutische Chemikalien
It. Sonderverzeichnis

Bearbeitung sämtlicher Vegetabilien

VEB Chemische Fabrik Dörlau

Greiz-Dörlau

Essigsäure Tonerde-Pulver

VEB Chemische Fabrik Grünau

Berlin-Grünau, Regattastr. 35, Tel. 6522 61

Arsen-Helpin	Neobigrol
Billiton	Neospiran
Colsil-Tabletten	Pentredin
Colsil-Suppositorien	Probronchin
Euglissin	Titretta analgica Tabletten
Fibrex	Titretta analgica Suppos.
Helpin	Titretta analgica Suppos. für Kinder
Milax	

Textilhilfsmittel
Lederhilfsmittel
Bautenschutzmittel
Bonderlösungen
lt. Sonderverzeichnis

VEB Chemische Fabrik von Heyden

Radebeul bei Dresden, Tel. 75 361, 75 871, 75 938, Sammelnummer 74811

Actol	Lopirin
Actol-Puder	Noviform-Salbe
Adsorgan	Peremesin
Caseosan	Pro-Expit
Coffetylin	Silargetten
Dolosin	Sufrogel
Euvernil	Sulfoderm-Puder
Gastro-Sil	Teer-Sulfoderm-Puder
Gastro-Sil „B“	Tonil
Kalypnon	Für die Rezeptur:
Kinderpuder - Heyden	Euvernil-Reinsubstanz
	Lopirin-Reinsubstanz

Röntgen-Artikel-Heyden:

Neossal-Schirme:
für die Durchleuchtung
für die Schirmbildaufnahme

Folienkombinationen:

„Standard“ - für universelle Verwendung
„Exacta“ - scharfzeichnend
„Ultra-Rapid“ - hochverstärkend

VEB Dentalchemie

Leipzig N 22, Max-Liebermann-Str. 40, Tel. 52586

Dental-Präparate
lt. Sonderverzeichnis

VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben

Rodleben, Post Roßlau/Elbe, Tel. Roßlau/Elbe 451/52, Dessau 2908

Antipyoderm-Salbe	Sulfo-Perscatol
Dehydasaal	Thiantan
Devaricin	Thiantetten
✓ Dithioglycerin „Rodleben“	Vagitral
I. O.-Syn	Neo-Vagitral
Perscabit	Wismusan oleosum
Placentol	Wismusan oleosum forte
Sulfanilamid	

Für die Rezeptur:

Sulfanilamid - Substanz
Thiantan - Substanz
Unguentum lanetti
Salbengrundlage
Lasupol
Suppositorienmasse

VEB Eumarhal-Werk

Bernburg, Hallische Landstr. 105 b, Tel. 2064

Emser Salz
Karlsbader Salz
Lecilade „Bernburg“
Lecithin-Dragees „Bernburg“
Mergentheimer Salz
Reinlecithin „Bernburg“ mit Zucker, Faszikelform
Reinlecithin „Bernburg“ ohne Zucker, Faszikelform
Wildunger Salz

Weitere Erzeugnisse:

Reinlecithin „Bernburg“ für Pharmazie und pharm. Industrie
Salbengrundlagen für Pharmazie und Kosmetik
Hautschutzsalben
Dental-Produkte

VEB Fahlberg-List

Chemische und Pharmazeutische Fabriken
Magdeburg-Südost, Postschließfach 25, Tel. 46041-46

- | | |
|---|---|
| ✓ Chloramin „Fahlberg“ DAB 6 | Falistrypt liquidum |
| ✓ Chloramin-Tabletten „Fahlberg“
DAB 6 0,5 und 1,0 g | Falistrypt-Puder
Falistrypt-Puder steril in Ampullen |
| Roh-Chloramin „Fahlberg“ 83% | Glykokoll Erg. B. 6 |
| Dyspepsol „Fahlberg“ granulat. | Kohle-Tabletten „Fahlberg“ |
| Dyspepsol „Fahlberg“ liquidum | Lactobaryt „A“ und „N“ |
| Ephedrin-Lösung in Ampullen | Neo-Arsoluin 0,15, 0,3, 0,45, 0,6 g |
| Ephedrin-Tabletten „Fahlberg“ | Ophthalicain 0,5% |
| Extussin-Hustensaft mit Ephedrin | Ophthalicain stark 1% |
| Extussin-Hustensaft mit Ephedrin
und Codein | Rektalicalcin (Suppositorien) |
| Exrhinisol | Thianthrol-Salbe |
| Exrhinin | Tussedrin-Hustentropfen |
| Falichol | Feinchemikalien |
| Falimint | Barium sulf. puriss. pro Röntgen |
| Falipsoryl | DAB 6 |
| Falistrypt z. Injektion | Synth. rac. Ephedrinchlorhydrat |
| Falistrypt z. Instillation | |

Dental-Präparate
lt. Sonderverzeichnis

VEB Farbenfabrik Wolfen

Wolfen Kr. Bitterfeld, Tel. 2441, 2741

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Arzneifertigwaren | Wofasept „spezial“ |
| Anaesthesin-Dragees | Wofasept „Tbc“ |
| Anaesthesin-Salbe „Wolfen“ | |
| Kresomerlat | |
| Miotisal | Pharm. Grundstoffe |
| Nikozid-Wolfen | Aether DAB 6 |
| Prontosil-Tabletten | Aether techn. |
| ✓ Sulfaguandin - Wolfen | Anaesthesin DAB 6 |
| ✓ Sulfathiazol - Wolfen | Miotisal für die Rezeptur |
| Wofapas (PAS-Wolfen) | Prontosil für die Rezeptur |
| Wofasept | Wofapas (PAS Wolfen) |

VEB Gärungschemie Dessau

Dessau, August-Bebel-Str. 90 a, Tel. 3021

Pepsacid

VEB Homöopharm Dr. Willmar Schwabe

Leipzig O 5, Elisabeth-Schumacher-Str. 54-56, Tel. 6441

Allicepan-Dragees	Hametum-Salbe
Allicepan liquidum	Influvit
Angioton	Jorondellen
Apsedon Dragees	Klimaktoplant
Arniflor-Salbe	Leandin
Arniflor-Tinktur	Lerminol-Einreibung
Aureaticum	Mafera-Herzsalbe
Biofungin	Migranden
Bryorheum	Nisülen
Camphora Rubini „Schwabe“	Otoseden
Cholopiant	Picurin II
Cineraria „Schwabe“	Picurin III
Collosulfan-Bad	Plantival-Dragees
• Collosulfan-Puder	Plantival liquidum
Congelatum	Prostagutt
Crataegutt	Styptigutt
Cupridium	Sulfur-Colloo-Inj.
Cupridium forte	Sulfur-Colloo-Tabletten
Cynosid liquidum	Tonsiotren
Cystiplant	Traumafliid-Hämorrhoidal-
Dioptrix-Augensalbe	Zäpfchen
Diugutt A	Traumafliid-Lösung
Diugutt B	Traumafliid-Paste
Enuroplant	Traumafliid-Salbe
Essentia aurea „Schwabe“	Tussistin liquidum
Ferrofungin liquidum	Tussistin-Sirup
Formidium	Tussistin-Tabletten
Glissitol	Ulcoterran
Hamelogran-Salbe	Viropect
Hamtum-Extrakt	Viscratyl
Hametum-Fettpuder	Vitaplasgen

Homöopathie

in folgenden Arzneiformen:

Urtinkturen
Dilutionen
Tabletten
Triturationen
Globuli
Ampullen
Colloo-Präparate

Biochemie
Tabletten
Triturationen

lt. Sonderverzeichnis

VEB Imbal-Werk

Chemnitz, Altchemnitz Str. 2-4, Tel. 38251

**Verbandstoffe
Verbandpflaster**

lt. Sonderverzeichnis

VEB Jenapharm

Jena, Otto-Schott-Str. 15, Tel. 3551

Aethylurethan „Jenapharm“	Morphin. hydrochloric. c. Atropin sulfuric.
Ascorvit	Morphin. hydrochloric. c. Scopolamin. hydrobromic.
BCG-Impfstoff	Nikotinsäureamid Jenapharm
Calcium bromatum	1-Nor-Adrenalin Jenapharm
Chloronitrit Jenapharm	Penicillin - Calciumsalz Jenapharm zur Injektion
Codein. phosphoric.-Tabletten	Penicillin - Calciumsalz Jenapharm zur Lokalbehandlung
Colchicin Jenapharm	Penicillin-Salbe Jenapharm
Dekristol	Penicillin-Wundpuder Jenapharm
Depotpenicillin (Jenacillin A u. O)	Sanaestin
Dimitan	Scomodrin
Glykofrukton	Tachystin Jenapharm
Isotonal	Tebethion
Jecoffin	Trimitan
Jenacain zur Lokalanaesthesie	
Jenacain zur Heilanalgesie	
Jenacillin A	
Jenacillin O	
Morphinum hydrochloricum	

VEB Kali-Chemie

Arzneispezialitäten Rhenania

Berlin-Niederschöneweise, Schnellerstr. 141, Tel. 65 12 67, 65 12 68, 65 26 21

Calorose, 10, 20, 35, 40, 70 %
Daucaron
Eucalyptus-Menthol-Tabletten
Mucidan-Ohrspülung
Mucidan-Tinktur
Purostrophan I und II
Purostrophan perlingual
Rheumafluid
Strophantose I und II
Varico-Calorose 50 und 60 %

VEB Laborchemie Apolda

Apolda, Buttstädter Str. 15, Tel. 1147

Laborchemikalien
lt. Sonderverzeichnis

VEB Lactacida

Chemisches Werk

Niederstriegis/Sa., Tel. Amt Döbeln 2045/46

Dextromalt
Kindernährzucker „Schwaan“

VEB Pharm.-chem. Fabrik Meuselbach

Meuselbach (Thür. Wald), Tel. Amt Mellenbach Nr. 8

Andolor	Hoffmannstropfen DAB 6
Balsam Nr. 35	Hustentropfen-Destillat
Brojunival	Kampferspiritus DAB 6
Brojunival verstärkt	Junicosan
Densana	Melissengeist
Diursan	Millefolan
Dreierleittropfen	Regulaxier-Tabletten
Durchfalltropfen	Salva nos
Fenchelhonig	Thüringer Balsam
Fichtennadel-Franzbranntwein	Tussylvan
Franzbranntwein	Vispur-Mistelsaft
Haarlemer Öl	Wiener Balsam
Hingfong-Essenz	Wund- und Heilsalbe

Nichtregistrierpflichtige Präparate

Cynosbatin (Extract. Cynosbat., Saccharum)
(43 27 59 00) Flasche mit ca. 130 g
Junipur (Extract. Juniperi conc.)
(43 27 59 00) Flasche mit ca. 180 g
Wacholdersaft gesüßt (Extract. Juniperi, Kap.-Sirup)
(43 27 59 00) Glas mit ca. 250 g
Glas mit ca. 500 g
Fichtennadel-Bade-Extrakt „Pinipur extra stark“
(43 14 20 00) 43 14 20 00) Flasche mit ca. 150 g
Glas mit ca. 500 g
lose
Lohtannin-Extrakt „Tannipur“ naturrein
(43 14 20 00) lose

Tinkturen, Extrakte und galenische Präparate

lt. Sonderverzeichnis

VEB Pharmazeutisches Werk Johannisthal

Berlin-Johannisthal, Am Flugplatz 6, Tel. 651281

Anginos	Menthymin
Brosedan	Methysal
Curcumen	Pancurmen
Epithen-Salbe	Pervitin
Essigsäure-Tonerde-Tabletten	Phenan
Eufemyl	Siran
Guttajod	Siran-Pastillen
Haematogen „Sicco“	Siran-Tropfen
Jodisal-Salbe	Speton
Jodana-Tinktur	Vitamin K „Pharma“
Kephalosan	

VEB Pharmazeutisches Werk Oranienburg

Oranienburg-Mark, Industriestr. 1, Tel. 591

Acesal	Euphyllin-Jod-Calcium
Combiphenan	Guajektol
Euphydigital	Höllensteinsteife
Euphyllin	Oramid
Euphyllin-Calcium	

Chemikalien
lt. Sonderverzeichnis

VEB Pharmazeutisches Werk Pankow

Berlin-Pankow, Borkum-Str. 2, Tel. 481762

Antasthmatica-Tabletten	Antineuralgica-„Pharma“- Tabletten
Balsam Acht	„Drei-Nerv“-Dragees
Dragees Neunzehn verstärkt	W-Tropfen
Spalt-Tabletten	

VEB Promassolwerk

Erfurt, Altonaer Str. 25a, Tel. 5901

Cystin	PA-Puder
Dehydrochol-Tabletten	PA-Salbe
Digicordin	Philodorm
Epecton - Hustentropfen	Promassolax
Epecton „C“	Promassol-Dragees
Epecton mit Ephedrin	Promassol-Hautschutzsalbe
Gastrosecrin „Sauer“	Rhinitin-Emulsion
Jobrometten	Rhinitin-Emulsion mild
Kyaugutt (DRWZ)	Uscabin liquid.
Lepitoin	Viocid
✓ Methylthiouracil	

VEB Serum-Werk Dessau

Dessau, Seminarplatz 5, Tel. 3186

Sera und Impfstoffe

Antagon C.
Antavagin
Dextran
Diphtherie-Serum „Dessau“
Diphtherie-Toxoid „Dessau“
Erysipeloid-Serum „Dessau“
Homoseran „Dessau“
Milzbrand-Serum „Dessau“
Milzbrand-Serum, präzipitieren-
des
Oroseran
Präzipitierende Seren „Dessau“
Pyolysin
Staphysol „Dessau“
Tetanus-Serum „Dessau“
Tetatoxoid „Dessau“
Tuberkulin „Dessau“
Tuberkulin-Salbe „Dessau“
Typhus-Paratyphus B-Impfstoff

Pharmazeutische Heilmittel

Adrenasid
Betasid
Camphedrin
Fissurin-Salbe „Dessau“
Gastrase „Dessau“
Globinal
Pervalen
Pyolysin-Salbe
Tonasid
Valvanol
Valvanol-Tinktur

Schlangengift-Präparate

Epileptasid
Haemostypt
Vipracutan
Viprasid

✓ Chirurgische Hilfsmittel

✓ Blutkonservenflasche „Dessau“

Für Präparate der **Veterinär-Medizin**
bitte Sonderverzeichnis anfordern

VEB Serum-Werk Weißensee

Berlin-Weißensee, Gr. Seestr. 4, Tel. 541535

Sera und Impfstoffe

Di-Scarla-Toxoid
Intestolysin
Pyrasid und Pyrasid forte
Scarla-Toxoid
Staphylo tropin
Tussitropin forte

Pharmazeutische Hilfsmittel

Algolyt
Oestrasid
Oestrasid forte
Oestrasid fortissimum
Oestrasid pro inj.
Oestrasid forte pro inj.
Oestrasid-Salbe
Rhinolyt
Viperolan-Salbe
Vipracutan

Diagnostische Sera

Testseren A, B und O

AB-Serum
Anti-Rho-Serum
Anti-A₁-Serum
Anti-M-Serum
Anti-N-Serum
Anti-Mensch-Globulin-Serum

Extrakte zur Serodiagnostik

Citochol-Extrakt
Rinderherz-Extrakt
Haemolytischer Ambozeptor
Kahn-Extrakt

In Vorbereitung:

Cardiolipin „Weißensee“
Oestrastilben D
Oestrasid-Globuli
Oestrasid-Implantate
Oestrasid-Kristall-Suspensionen
Pertussis - Diphtherie - Toxoid
„Weißensee“

VEB Schering Adlershof

Berlin-Adlershof, Glienicke Weg 181, Tel. 642011

Aether pro narcosi
Albucid
Albucid-Augentropfen
Alluval
Alluval forte
Atophan
Atophanyl
Bilitrast
Calciumthiosulfat-Amp.
„Schering“ „Tecesal“
Chlorylen
Cortiron
Corvitol
Dijodtyrosin
Ferrostabil
Gentiaverm

Insulin „Degewop“
Neo-Insulin „Degewop“
P. Z.-Insulin „Degewop“
Mezym
Neutralon
Neutralon c. Belladonna
Nitro-Tabletten „Schering“
Oxyphysin
Pentephen
Pernaemyl forte
Proluton
Santonin „Schering“
Testoviron
Testoviron-Tabletten
Thyreoidin „Schering“
Uroselectan B.

✓ Laborchemikalien

✓ Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel

lt. Sonderverzeichnis

In Vorbereitung

Albucid-Augensalbe
Chloramphenicol „Schering“

VEB Vasenol-Werk

Leipzig C 1, Wittenberger Str. 2, Tel. 50841/43

Bisuderm (Streupulver mit 20 % Bism. subgallic.)	Vasenol-Hautschutzsalbe Typ W und FS
Jecortannat	Vasenol-Kinder-Creme
Karwendol (Ammonium sulfokar- wendolicum)	Vasenol-Körper-Puder (Sanitätspuder)
Karwendolan 10, 20, 50 %	Vasenol-Körper-Puder mit Spezialparfümierung
Karwendol-Globuli 10 %	Vasenol-Leberölpaste 25 %
Karwendol-Puder 5 und 10 %	Vasenol-Öl (Wund- und Kinder-Öl)
Karwendol-Suppositorien 10 %	Vasenol-Paste
Pastaderm	Vasenol-Schwefelpuder
Siliphen-Wundstreupulver	Vasenol-Tamponadestreifen P und S
Vaopin-Salbe	Vasenolum mercuriale 33 1/3 %
Vaopin-Wundstreupulver	Vasenol-Wund- und Kinder-Puder
Vasenol-Brandbinde	
Vasenol-Fett-Creme	
Vasenol-Fuß-Puder (Vasenoloform-Puder)	

Gödecke & Co., Chemische Fabrik

In Verwaltung

Teitow b. Berlin, Elbestr. 2, Tel. 218

Convallan	Targesin
Gelonida Alumini subacetici	Targesin-Salbe
Gelonida antineuralgica	Targesin-Tabletten
Gelonida stomachica	Targophagin

Hans C. Wirz

In Verwaltung

Gotha, Postschließfach 46, Tel. 1121, 1125

**Capsicum-Pflaster
Zug- und Furunkelpflaster
Verbandpflaster**
lt. Sonderverzeichnis

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/03/28 : CIA-RDP80S01540R001000010005-0



ZL 16-652 III-26-13 16'' 52-1069 Satz und Druck: VEB Druckwerke Reichenbach i.V.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/03/28 : CIA-RDP80S01540R001000010005-0

SECRET

SECRET