

50X1-HUM

FORM 39 51-61

CLASSIFICATION SECRET/CONTROL - U.S. OFFICIALS ONLY
SECURITY INFORMATION
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

REPORT

INFORMATION REPORT

CD NO.

COUNTRY East Germany

DATE DISTR. 25 July 1952

SUBJECT East German Pharmaceutical Production

NO. OF PAGES 1 50X1-HUM

PLACE ACQUIRED

NO. OF ENCLS. (LISTED BELOW)

DATE OF INFO. ACQUIRED

SUPPLEMENT TO REPORT NO.

50X1-HUM

[Redacted]

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIONAGE ACT 50 U.S.C. 31 AND 32 AS AMENDED. ITS TRANSMISSION OR THE REVELATION OF ITS CONTENTS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PROHIBITED BY LAW. REPRODUCTION OF THIS FORM IS PROHIBITED.

THIS IS UNEVALUATED INFORMATION

[Redacted]

50X1-HUM

[Redacted]

[Redacted]

catalogue of the East German Deutscher

50X1-HUM

Innen-und Aussen Handel Chemie, showing the various pharmaceuticals which are sold by this East German agency. Beside certain of these pharmaceuticals are penciled inscriptions showing the location of the plant in which the individual drug is produced.

[Redacted]

50X1-HUM

CLASSIFICATION SECRET/CONTROL - U.S. OFFICIALS ONLY

	NAVY	JSRB	DISTRIBUTION											
NY	AIR		ORR	x										

SEP 1951
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
OFFICE OF FOREIGN TRADE CONTROL

THIS IS AN ENCLOSURE TO
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

50102
[Redacted Box]



SECRET CONTROL
U.S. OFFICIALS ONLY

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Allopathische Spezialpräparate	1-50
Seren, Impfstoffe, Tuberkulin, Tuberkulinsalbe	51-56
Tierarzneimittel	57-76
Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel	77-85

SECRET CONTROL
U.S. OFFICIALS ONLY

SECRET CONTROL
NO. 11/10/1979

Deutscher Innen- und Außenhandel Chemie

der Im- und Exporteur
der Deutschen Demokratischen Republik
für alle chemischen Erzeugnisse

Spezial-Kataloge und Prospekte
stehen auf Wunsch zur Verfügung

BERLIN C2 DIRCKSENSTRASSE 4

Ortsr. 42 58 56 Fernruf. 47 06 52
Telegraph. Adresse: DAKAPHARMA

SECRET CONTROL
NO. 11/10/1979



An unsere Geschäftsfreunde!

Wir überreichen Ihnen unseren pharmazeutischen Katalog, der einen Einblick in unser Programm geben soll und wie folgt aufgeteilt ist:

Humanmedizin

Allopathische Spezialpräparate
Seren - Impfstoffe
Tuberkulin - Tuberkulinsätze

Tierarzneimittel

1. Teil Sera, Impfstoffe
Tuberkulin
2. Teil pharm. Heilmittel
Organpräparate
Schlangengiftpräparate

**Pflanzenschutz-
und Schädlingsbekämpfungsmittel**

Bitte geben Sie uns Ihre Anfragen und Wünsche auf, da wir alle Außenhandelsinteressen der Deutschen Demokratischen Republik wahrnehmen. Wir werden Ihnen dann Spezialangebote mit Preisen und Mustern der gewünschten Präparate zuwenden. Einsteilen haben wir Artikel, die für Ihren Markt besonders interessant erscheinen, mit einem * versehen.



**Erläuterungen zu Preisen,
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen**

Preise

Die Preise verstehen sich treibend, vorbehaltlich ministerieller Genehmigung einschl. innerer und äußerer exportmäßiger bzw. seemäßiger Verpackung.

Lieferbasis

Lieferung erfolgt frachtfrei oder franko deutscher Grenze, frachtfrei oder fob deutscher Ostseehafen bzw. Hamburg.

Lieferzeit

Kurzfristig nach Auftragserteilung.

Zahlung

- a) In freien Dollars oder Pfund Sterling oder zu vereinbarenden Wahrung durch Eröffnung eines unwiderrüflichen Akkreditivs mit Gültigkeit in Berlin bei der Deutschen Notenbank, Berlin W 8, Behrenstraße. Nach jeweiliger Vereinbarung soll es teilbar oder unteilbar sein.
- b) Durch Barüberweisung auf unser Konto Nr. 239 bei der Deutschen Notenbank, Berlin W 8.

Unser Grundsatz ist die prompte Lieferung qualitativ hochwertiger Waren für jeden Auftrag.

**Deutscher Innen- und Außenhandels
Chemie**

SECRET CONTROL
OFFICIALS ONLY

Calciopot *Tripos Kach*

Zusammensetzung: Kalksalze 30% (Calciumcitrat 20%, Tricalciumphosphat 2%), Calipot D enthält zusätzlich Vitamin D und ferner Vitamin B.

Anwendungsgebiet: Zur Vorbeugung gegen die durch Kalkmangel in der Ernährung entstehenden Schädigungen sowie als leistungssteigerndes Mittel bei Sporttreibenden.

Camphedrin *und besetzt*

Lösung von 15% Kampfer und 0,5% Ephedrin in sterilem, neutralem, reizfreiem fettem Öl.

Anwendungsgebiet: Kampfer-Ephedrin Injektionsöl bei Infektionskrankheiten, Unfällen, Schock, Vergiftungen, nach Operationen, in der Geburtshilfe, bei Herzschwäche verschiedener Art, Apoplexie, Commotio cerebri, Pneumonie usw.

Camphocard

Kampferpräparat in 10- bzw. 20%iger Lösung für Herz- und Kreislauftherapie.

Anwendungsgebiet: Herzinsuffizienz, plötzliches Versagen der Herztätigkeit, Infektionskrankheiten, Pneumonie und dergleichen.

Camphochin *Asogepta Dresden*

Lösung ätherischer Öle mit 2% basischem Chinin und 3% Kampfer zur schmerzlosen intramuskulären Injektion.

Anwendungsgebiet: Alle entzündlichen und fieberhaften Erkrankungen der unteren Luftwege. Ferner zur Vorbeugung und Behandlung postoperativer Pneumonien, zur Vorbeugung der Bronchopneumonie bei Längere Bettruhe.

5 Tabletten
Pulver

5 und 50 Ampullen
zu 1 ccm

6 Ampullen zu 1 ccm
2 ccm und 3 Ampullen zu 5 ccm

6 Ampullen zu 2,2 ccm

Carboplastin-Salbe

Saurys Teersalbenpräparat

Anwendungsgebiet: Bei chronischen Ekzemen, Schuppenflechte, Pruritus, Neurodermitis, Lichen ruber, Prurigo.

Glasbehälter mit 50 g Inhalt

Ceradent-Zahnwache

Zahnmodellierwachs rosa, in Platten von etwa 1,4 mm Stärke.

Gußwachs, blau, in Lanzetten à 2 g.

Gußwachs, elfenbein, in Lanzetten à 2 g.

Gußwachs, grün, mittelhart, sehr modellierfähig, in Lanzetten à 2 g.

Gußwachs, blau, in Rundscheiben etwa 80 mm, sortiert in den Stärken 0,25, 0,40 und 0,60 mm.

Klebwachs, gelb

Klebwachs, rot

Faltschachtel zu brutto 500 g

Schiebeschachtel zu 15 Stück

Schiebeschachtel zu 15 Stück

Schiebeschachtel zu 15 Stück

Schiebeschachtel zu 15 Stück

Schachtel zu 6 Stangen

Schachtel zu 6 Stangen

Cetiolan

Cetiolan besteht aus einem Fettsäure-Fettalkohol-Ester, welcher dem natürlichen Potwaltran entspricht.

Anwendungsgebiet: Wird in der kosmetischen Industrie verwandt.

Abfüllung n. Wunsch

Choloramin DAB 6

Paratoluolsulfonchloramidnatrium chemisch rein.

Anwendungsgebiet: Zur Desinfektion.

Abpackung n. Wunsch

Chloramin technisch 98%

Paratoluolsulfonchloramidnatrium techn. rein 98%

Anwendungsgebiet: Zur Desinfektion.

Abpackung n. Wunsch

Abpackung n. Wunsch

Chloramin-Roh 83%

Abpackung n. Wunsch

SECRET CONTROL
OFFICIALS ONLY

Balsam Acht

Zusammensetzung: Histamin, Orthooxybenzoesäureester in 3 Kombinationen, ferner: Sekundärer Alkohol anaesthetisierend wirkend, aetherischer Solanaceenextrakt in Verbindung mit spezifisch auf die Epidermis wirkenden aetherischen Ölen und das Keton eines Terpenes.

Anwendungsgebiet: schmerzstillender Einreibe-Balsam mit Tiefenwirkung.

Belladonnin *Ammerl Hel-Kent*

Gesamtalkaloide der Belladonna in reiner Form.

Anwendungsgebiet: Spasmolyticum. Alle Indikationen des Atropins und der Belladonna.

Belladonnysatum *Geat Zinger*

Zusammensetzung: Gesamtalkaloide der frischen Blätter von Atropa Belladonna.

Anwendungsgebiet: Bei allen spastischen Zuständen wie Ulcus ventriculi, Cholelithiasis im Anfall, Cystopyelitiden, Angina pectoris.

Bellucesal *Dr. Remmler VEB*

enthält Extr. Bell., Extr. Hypocyam. und findet Anwendung bei neuro-vegetativen Störungen.

Betamid *Ber in Dessau Asid*

starke, isotonische wäßrige Injektionslösung mit 5 mg Anerinchlorid-Hydrochlorid (= 2500 Intern. Einh.).

Anwendungsgebiet: Vitamin B1 Injektionslösung bei Beri-Beri aller Erscheinungsformen, Neuritiden und Nervenschwächen verschiedener Genese und Lokalisation. Anwendung: Anämie, Diabetische, post-

Flasche mit 30 g Inhalt

20 Tabletten à 0,2 g
Zäpfen mit 6 und 10 Stück zu 0,5 mg

Tropfflasche zu 15 g
6 Suppositorien
3 Ampullen zu 1 g

Schachtel mit 25 g gees

5 Ampullen zu 1 g

Betavitan 0,005 Vitamin B1 (Aneurin) Ampullen

Bei B1-Avitaminosen.

Bilergon

Bestandteile: Fel. Tauri, Extracta fluida, Casc. sagr. Damian, Frangul, Galeg. Colombo, Boldo.

Anwendungsgebiet: Pflanzliches Cholagogum und Cholereticum, Elixier gegen Leber- und Gallenleiden.

Biofungin

Zusammensetzung: Ferrum glycerino-phosphor. Cuprum formicicum, Manganum formicicum, Magnesium borocitric. Acid. formicicum, Ignatia Zinc. sulf. D1, Arsenicum alb. D4, Calcium fluoratum Colloo D2, Aqua silicata. Sirup. simplex, para-Oxybenzoesäuremethylester Corr.

Anwendungsgebiet: Bei Blutarmut, Rekonvaleszenz, Appetitlosigkeit.

Biulen oleosum *Bzjk*

Bismutum subsalicylicum in öliger Suspension findet Anwendung als Bekämpfungsmittel der Lues und Anginen aller Stadien.

Bromutil-Tabletten

Zusammensetzung: Natrium brom. 0,90 g, Hefe 0,30 g, Extrakt. Levistici aquos sicc. 0,03 g, Extraktum Humuli Lupuli 0,01 g.

Anwendungsgebiet: Bei Erregungs- und Angstzuständen, Nervenschwäche sowie Schlaflosigkeit.

Bryorheum

Spezialauszug Panstabil von: Phytolacca decandra, Homöopathischen Dilutionen von: Bryonia, Rhus Toxicodendron, Dulcamara, Ginaphalium, polycephalum, Colocynthis.

Anwendungsgebiet: Perorales Antirheumaticum

3 und 10 Ampullen zu 5 mg a 1,1 cm forte 0,025 Vitamin B1 zu 3 Ampullen à 25 mg zu 1,1 cm

Flasche mit 20 cm

Flasche zu 250 und 500 g

Flasche zu 15 und 100 g

Packung zu 20 und 1000 Tabletten

Flasche zu 30 cm

SECRET CONTROL
OFFICIALS ONLY

Albucid

Schering

p-Aminobenzolsulfonacetylamid.

Anwendungsgebiet: Gegen Angina, Furunkulose, Cystitis, Pyelitis, Meningitis, Otitis, Dysenterie.

Albucid-Augentropfen

p-Aminobenzolsulfonacetylamid-Natrium.

Anwendungsgebiet: Gegen Katarrhe, Ulcerationen der Hornhaut und der Bindehaut, Prophylaxe zur Verhinderung von Infektionen nach perforierenden Verletzungen.

Alginon

Salicylsäureamid 0,5 g.

Anwendungsgebiet: Gegen Schmerzen aller Art. Rheumatismus, fieberhafte Infektions- und Erkältungskrankheiten.

Alphylt

Zusammensetzung: Eine klare, zähflüssige Lösung von 100 mg Phenol und des Anästhetikums 4-Buthyl-2-piperidyl-Dimethylaminoethanol in reinstem wasserlöslichem Glycerin.

Anwendungsgebiet: osmotisch druckentlastende, beruhigende anästhetische Ohrtropfen gegen akute, eitrige Mittelohrentzündung, neuralgische Schmerzen, Trommelfellentzündung und Gehörverlust.

Zusammensetzung: *Albus Lappae, Allium ursini, Raphanus*
cruciger, Valeriana c. aeth., Lobelia D 3, Corrigens,
Valeriana c. aeth., Lobelia D 3, Corrigens,
Valeriana c. aeth., Lobelia D 3, Corrigens,

20 und 500 Tabletten
à 0,5 g und 5 g
in zu 10 cm
zentige Lösung

Flasche zu 10 cm
(20%ige Lösung)

20 Tabletten zu 0,5 g

Tropfflasche mit
6 g

35 und 150 Drag.

Aluval

Bromisovalerylcabamid.

Anwendungsgebiet: Sedativum und Hypnoticum, Neurasthenie, Herzneurosen, arteriosklerotischen Beschwerden.

10 und 250 Tabletten
zu 0,3 g *Schering*

Altanol

Bestandteile: Alum. acetic. tannic. 0,44 amyl. ste-
rin, Talkum ad 0,5.

20 Tabletten à 0,5 g

Anwendungsgebiet: Bactericides Darmadstringens gegen Durchfälle aller Art.

Aminosin-Ampullen 4%

Bestehend aus Thiosinamin (einem chemischen Allyl-
hioharnstoff - C₃H₃ - CS - NH₂ und Aqua bidest.
Anwendungsgebiet: Zur Behandlung schmerzhafter
Verwachsungen und Narben, besonders auch nach
Brandwunden, bei Keloid und ähnlichen Indikationen,
durch intracutane Injektionen.

5 Ampullen à 2 ccm
Chemodrophia
chemin b

Aminosin-Globuli

Thiosinamin, Natriumsalicylat, Suppobasin.
Anwendungsgebiet: Zur Behandlung schmerzhafter
Verwachsungen und Narben im vaginalen Bereich.

6 Vaginalkugeln à 5,5 g
Chemodrophia
chemin b

Aminosin-Salbe

Thiosinamin, Natriumsalicylat, Ungt. Lanetti.
Anwendungsgebiet: Zur Behandlung schmerzhafter
Verwachsungen und Narben sowie bei multipler
Sklerose.

Tubenpackung mit et-
wa 20 g Inhalt
Chemodrophia
chemin b

Angioton

Spezialauszüge von *Dact. Crataegus, Convallaria*
Valeriana c. aeth. Lobelia D 3, Corrigens.
Anwendungsgebiet: Bei Herzmuskelschwäche leich-
teren bis mittleren Grades. Funktionelle Herzstörungen,
Herzneurose.

30, 250 und 1000 ccm
Flaschen
Schering

SECRET
NO FOREIGN DISSEM

Allopathische Spezialpräparate

Acirufan

Wird aus der durch Destillation von Ameisen gewonnenen natürlichen Ameisensäure (Acid. formicicum) unter Zusatz von kolloidem Gold hergestellt.

Anwendungsgebiet: Bei Asthma bronchiale. Ferner zur Behandlung von rheumatischen Affektionen.

Schachtel mit 3 und 6 Ampullen zu 1 ccm

Adrenasid

Sterile, isotonische wäßrige Lösung von 0,167% synthetischem Nipazol-Nipagin konserviert.

Anwendungsgebiet: Zur Exzitation der Herz- und Kreislauf-tätigkeit und zur Erzeugung örtlicher Ischämie.

5 Ampullen zu 1 ccm

*500 mg Helele
Dessert*

Adsorgan

Zusammensetzung: Sitargel (Chlorsilber-Kiesel-säure-Gel) 40%. Argocarbon (Silberkohle-Heyden) 10%, gesüßte und aromatisierte Kakaomasse 50% = Silbergehalt 25%.

Anwendungsgebiet: Zur Behandlung von Magen-Darmerkrankungen auf infektiöser Grundlage, z. B. Tuberkulose und fieberhafte Darmkatarrhe, Cholera nostras, Ruhr, Colitis ulcerosa, Colitis membranacea, Typhus, Paratyphus usw.

Originalpackung mit 50 g, Blechdose mit 250 g

Heyden

Aether pro narcosi DAB 6

in neuartiger Ampul-Tropfflasche.

Tropfflasche mit 100 g

Agoblin

Zusammensetzung: Chlorsäures und salizylsäures Strontium, Diacetylphosphthalein.

Anwendungsgebiet: Bei Cholangitis, Cholecystitis, Hepatitis icterica, Cholelithiasis und zur Prophylaxe bei Dispositionen zur Steinbildung.

20, 40 und 500 Dragees

Ameisensäure

Paratoluolsulfonchloramidnatrium,
rohe Ware 83%

Zur Desinfektion.

Cholecysmon *Sächsisches Patentwerk*
der standardisierte Aktivator der Fettverdauung
(Gallenblasen-Wirkstoff).

Anwendungsgebiet: Gestörte Fettverdauung bei
Gallen-Leberstörungen und bei Pankreatitis, sowie bei
Hepatitis und schmerzhafter Leberinsuffizienz. Ferner
bei Verdauungsstörungen unklarer Genese.

Cholopiant *Dr. Schwabe, Leipzig*
Spezialauszüge Panstabil von Berberis, Nux vomica,
Chelone glabra, Natr. choleiicum D1.

Anwendungsgebiet: Entzündliche Zustände und
Dysfunktionen des Leber-Chelido-Gallensystems.

Coffetylin *Chem. Fabrik von Heyden*
Zusammensetzung: 90% Acetylin + 10% Coffein
purum.

Die 0,5-g-Tablette enthält 0,45 g Acetylin und 0,05 g
Coffein.

Die 0,03-g-Tablette enthält 0,27 g Acetylin und 0,03 g
Coffein.

Anwendungsgebiet: Schmerzzustände und Neural-
gien jeglicher Ätiologie, insbesondere Kopfschmerz, Mi-
gräne, Zahnschmerz, Grippe, Erkältungen und anderen
ähnlichen Erkrankungen.

Cholesterin *Chem. Fabrik Grünau*
Cholesterin-Präparat.

Anwendungsgebiet: Zur Bekämpfung des Röntgen-
schadens bei Bestrahlung von Nervenzellen und de-
r...

g-lin

Abpackung

20 und 100 Pa-
3 und 24 Am-
zu 2 ccm

40 und 80 Tab-

20 und 1000 Ta-
ten zu 0,5 g
20 Tabletten zu

12 und 250 Table-

Smallysat

aus frischem, wildwachsendem einheimischem Bärlauch
(Allium ursinum) gewonnen.

Anwendungsgebiet: Alle Fälle von Darmkatarrhen
und Diarrhöen, Dyspepsien, speziell Fäulnis und Gäh-
ngsdyspepsien, Appetitlosigkeit, Darmparasiten, Amö-
benruhr, Dysenterie.

Curcumen

bestehend aus Wirkstoffen der Curcuma. Ch'orsäures
Calcium Fel tauri.

Anwendungsgebiet: Bei Erkrankungen der Gallen-
blase und der Gallenwege akuter und chronischer Art.
Antiphlogisticum zur Behandlung infektiöser Leber-
und Gallenerkrankungen und enteraler Sepsis.

Bebevit-Tabletten

(Polyvitaminpräparat).

Vitamin D2, B1 bis 7 zur Rachitis-Prophylaxe und
Therapie, bei Störungen des Kalkstoffwechsels, Krampf-
bereitheit des Kleinkindes, Intoxikationsschäden,
Hypovitaminosen während der Gravidität und Still-
periode, Neuritiden, Neuralgien, Furunkulose.

Dehydasaal

Dehydasaal enthält als wirksames Prinzip das Diäthyl-
3-oxyethylamin.

Anwendungsgebiet: Bei peripheren Durchblutungs-
störungen, Angiosen, Angina pectoris, Asthma bron-
chiale, Allergien.

Leumacard

Dimethylentetrazol.

Anwendungsgebiet: Rasch wirkendes Analeptikum,
Stimulans und Kreislaufmittel. Ferner bei Infek-
tionen, Erschöpfungszuständen, bei Schlafmittelver-
giftungen sowie als Weckmittel bei tiefen Narkosen.

Flasche 60 und 150 ccm
Glas zu 50 Dragees

Röhre mit 30 Dragees

30, 200 und 500 Ta-
bletten

5 und 100 Ampullen
zu 5 ccm
30 und 250 ccm Tropf-
flaschen
6 und 50 Suppositorien

Liquidum 10 und
500 ccm
Ampullen 5 Stück zu
1,1 ccm
10 Tabletten zu 0,1 g

SECRET CONTROL
OFFICIALS ONLY

Anker Pain-Expeller

Zusammensetzung: Fruct. pip. cayen. 3,28, Alkohol 49,85, Camphora 1,5, Liquor ammonii 12,5, Acid. salicylic. 1,87, Olea aetherea 0,7, Sapo 1,5, Extr. capsici 0,25, Aqua ad. 100.

Anwendungsgebiet: Bei Rheuma und Gicht, Muskel- und Gelenkschmerzen, Hexenschuß, Verkühlungen aller Art.

Antiphytin-Salbe

Zusammensetzung: Thioformol „Leuna“ Teer, Phenol, Salicylsäure, Zink oxyd. Vaseline.

Anwendungsgebiet: Alle Dermatomykosen, seborrhoische und parasitäre Ekzeme, Pyodermien.

Antipyodermisalbe

bestehend aus Sulfonamiden, Halogenoxydiphenylmethan, Unguentum lanetti.

Anwendungsgebiet: Bakterielle Hauterkrankungen, besonders Schrunden, Geschwüre, offene Krampfadern, akute und chronische Ekzeme, Dermatomykosen verschiedenster Art, wie Favus, Bartflechte.

Apophyllin

bestehend aus Theophyllin-Aethylendiamin und Natriumcamphorat in wässriger Lösung.

Anwendungsgebiet: Wirksames Kreislauf-Analeptikum bei zentral bedingter Kreislaufschwäche, Beeinträchtigung der Atmung, bei Infektionskrankheiten, Pneumonie, bei Schlafmittelvergiftung und dergleichen.

Arson-Helpin

Zusammensetzung: Sterile Lipidemulsion (Helpin) mit einer klinisch bewährten Arson-Komponente. Arson-Gehalt: 0,025g CH₃AsO₂Na₂ + H₂O pro Ampulle

Anwendungsgebiet: Ernährungsstörungen, Anämie, Lymphknotenvergrößerung, maligne Tumoren

Flasche zu 50 cc

Aureaticum

bestehend aus Avena sativa, Lycopus virginicus, Crataegus oxyacantha, Aurum mur. D 4, Convallaria majalis D2, Scilla D2, Camphora D2, Veratrum album D2, Coriogens. Sirup simplex

Flasche zu 100 und 250 cc

Aurocard

Zusammensetzung: Frischpflanzenzubereitung: Digitalis purpurea, Cactus grandiflorus. Pflanzenauszüge: Strophanthus, Ignatia Aur, natr. chlorat. kreislauf-wirks. Organextrakt, Vin. camphorat.

Flasche zu 100 und 200 cc

Anwendungsgebiet: Zur Behandlung von Kreislaufinsuffizienzen während und nach Infektionskrankheiten (Pneumonie, Grippe, Typhus usw.)

Kruke zu 30 g, Kanne zu 500 g

Tube etwa 20 g
Tube etwa 50 g
Glas etwa 850 g

Azoangin

Eine Tablette enthält 0,05 g des Chemotherapeutikums Azohel (Diaminoazobenzolmonohydrochloridcitrat).

Röhre mit 10 Tabletten à 0,2 g
Röhre mit 25 Tabletten à 0,2 g
425 Stück à 0,2 g

Anwendungsgebiet: Bei Anginen, gegen Grippe, Masern, Scharlach, Stomatitis (Larynx und Pharynx) Cystitis, Pyelitis.

6 Ampullen zu 1,1 cc

Azohel-Lösung

bestehend aus 4%igem Azohel in 15%igem Alkohol (Diaminoazobenzolmonohydrochloridcitrat)

Flasche mit 10 und 15 cc

Anwendungsgebiet: Gegen Laryngitis, Pharyngitis, Anginen etc. Stomatitiden, Gingivitis, Glossitis, Parodontose sowie zur Behandlung von Di-Bazillenträgern

10 und 100 Ampullen zu 1,5 cc

Azo-Pro-Pastillen

Eine Pastille enthält 0,01 g Azohel (Diaminoazobenzolmonohydrochloridcitrat)

Packungen mit 15 und 30 Pastillen à 0,01 g

Anwendungsgebiet: Vorbeugungs- und Heilmittel gegen Infektionskrankheiten, die ihren Eingang durch Mund und Nase nehmen (Grippe, Masern, Scharlach, Hals- und Mandelentzündungen)

STRICTLY CONFIDENTIAL

Allopathische Spezialpräparate

Formosan
 Wird aus der durch Destillation von Ameisen gewonnenen natürlichen Ameisensäure (Acid. formicicum) unter Zusatz von kolloidem Gold hergestellt.
 Anwendungsgebiet: Bei Asthma bronchiale. Ferner zur Behandlung von rheumatischen Affektionen.

Schachtel mit 3 und 6 Ampullen zu 1 ccm

Adrenasid
 Sterile, isotonische wäßrige Lösung von 0,167% synthetischem Nipazol-Nipagin konserviert.
 Anwendungsgebiet: Zur Exzitation der Herz- und Kreislauf-tätigkeit und zur Erzeugung örtlicher Ischämie.

5 Ampullen zu 1 ccm

Leitung Herbe Dessert

Adsorgan
 Zusammensetzung: Silargel (Chlorsilber-Kiesel-säure-Gel) 40%. Argocarbon (Silberkohle-Heyden) 20%, gesüßte und aromatisierte Kakaomasse 50% = Silbergehalt 25%.
 Anwendungsgebiet: Zur Behandlung von Magen-Darmerkrankungen auf infektiöser Grundlage, z. B. Tuberkulose und fieberhafte Darmkatarrhe, Cholera nostras, Ruhr, Colitis ulcerosa, Colitis membranacea, Typhus, Paratyphus usw.

Originalpackung mit 50 g, Blechdose mit 250 g

Heyden

Aether pro narcoosi DAB 6
 in neuartiger Ampu-Tropfflasche.

Schönung

Tropfflasche mit 100 g

Agobillin
 Zusammensetzung: Chlorsaures und salizylsaurer Strontium, Diacetylphenolphthalein.
 Anwendungsgebiet: Bei Cholangitis, Cholecystitis, Hepatitis ictérica, Cholelithiasis und zur Prophylaxe bei Dispositionen zur Steinbildung.

20, 40 und 500 Dragees

Arzneim. Helmerich's Dresden

Deumanat

Dr. Driem...

Stickstoffgehalt 5,30%, 33,1% Eiweiß, Tyrosin 2080 mg %, Tryptophan 260 mg %, Cystin 1450 mg %, Arginin 160 mg %.

Anwendungsgebiet: Für Rekonvaleszenten mit Hypoproteinämie nach Infektionskrankheiten, endokrine Dysproteinämie, bei Magen-Darmstörungen (Colitis, Gastroenteritis).

Devaricin

Dr. H. H. Dr. ...

Devaricin stellt eine 2,5%ige Lösung des Natriumsalzes einer höheren, synthetisch hergestellten Fettsäure dar (α -Hexyldekansäure).

Anwendungsgebiet: Zur Krampfadernverödung.

Dextromon

Mariena Herbe

Unguentum Sach. Amyl. enthält 42% reine Dextrose in Form von Dextropur.

Anwendungsgebiet: Dextromon ist indiziert bei Brandwunden, Rhagaden und anderen Hautdefekten, Panaritien, Furunkeln, Karbunkeln, Ulcera cruris, perimalleolaren Ulzerationen.

Dextropur-Traubenzucker-Ampullen

Mariena Herbe

10-, 20-, 25-, 40%ige Injektionen.

Dextropur

Mariena Herbe

Sacharum amylaceum purum $C_6H_{12}O_6 \cdot H_{20}$.

Anwendungsgebiet: Dextropur hat die Fähigkeit, die Muskel- und Herztätigkeit in Gang zu halten, die verkrampften Gefäße zu erweitern und der Leber den notwendigen Betriebsstoff zu liefern.

Dr. Maclaus

Zusammensetzung: Aur. natr. chlorat. 0,0003, Calc. phosphor. 0,3, Tinktr. Valerianae aether., Tinktr. Straphanti Wap. 0,01, Tinktr. ... 100 g Discard.

Dragiert 25, 1 kg

Tabletten

enthalt je Tablette 0,1 g Fol. Digit. purp. titrat. ... Anwendung.

20 Tabletten zu 0,1 g

Dijodthyrosin

5-Dijod-4-oxyphenylalanin.

10 Tabletten zu 0,1 g

Anwendungsgebiet: Dijodthyrosin dient zur konservativen Behandlung von Thyreotoxikosen und Basedowkrankungen.

3 und 20 Ampullen 2 ccm

Mugutt A

Zusammensetzung: Spezialauszüge Panstabil von donis 0,2 g, Convallaria 0,3 g, Scilla 0,5 g, Apocynum 0 g, Crataegus 5,2 g, Helleborus 0,1 g, Petroselinum 0,0, Ononis 1,0 g, Sambucus 1,0 g, Na_2SO_4 crist. 10,0 g, para-Oxybenzoesäuremethylester 0,1 g, Sirupus simplex 3,0 g, Aqua destillata.

Packung zu 80 g

Anwendungsgebiet: Hydrops, besonders kardialen Ursprungs, Aszites, Oedeme.

Pleurisyat

5 Ampullen zu

Zusammensetzung: Bulb. Scillae, Fruct. Juniperi und Folia Betulae.

Flasche zu 20 und 60 ccm

Abfüllung n. We

Anwendungsgebiet: Wasserretentionen jeder Art, Oedeme, Hydrops kardialen und renalen Ursprungs, Nephritiden mit allgemeinem Hydrops Pleuritis, Leber-irritose.

Röhrchen zu 20 Tabletten

Polosin

Ch...

Salicylsäure-Isopropylamid 0,45, Coffein 0,05.

10 Tabletten zu 0,5 g

Flasche mit 30 100 ccm Inhalt

Anwendungsgebiet: Gegen Schmerzen aller Art wie Kopfschmerz, Zahnschmerzen, Schmerzen im Gefolge von Infektions- und Erkältungskrankheiten.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP83-00415R012200090004-2



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP83-00415R012200090004-2

SECRET
TOP SECRET

Am 1. August 1954

Der Oberste Kommando der Luftwaffe
Hilft in unser Programm, welches...

Personnel:

- 1. Oberstleutnant...
- 2. Hauptmann...
- 3. Oberleutnant...


Technische:

- 1. Oberleutnant...
- 2. Hauptmann...
- 3. Oberleutnant...
- 4. Hauptmann...

Personnel:

und...

SECRET
CONFIDENTIAL



Die **Zahlungsbedingungen** sehen vor: Eröffnung eines unwideruflichen, teilbaren, bestätigten Akkreditivs bei der Deutschen Notenbank, Berlin W 8, zu Gunsten der DAHA-Chemie, Berlin C 2, bzw. Barüberweisung auf das gleiche Konto.

Da die **Lieferfristen** von verschiedenen zeitbedingten Faktoren abhängig sind, müssen sie von Fall zu Fall vereinbart werden.

Der planmäßige Ausbau der Produktion in den einzelnen Werken der DDR ist durchaus noch nicht abgeschlossen, so daß wir darum bitten, uns über das Maß des hier vorliegenden Sortiments hinaus Ihre Bezugswünsche aufzugeben. Es wird das Bemühen der Werke sein, diese genauestens zu prüfen und die bestehenden Lücken so bald wie möglich zu schließen.

Deutscher Innen- und Außenhandel
Chemie

SECRET
CONFIDENTIAL

Ovo-Transanon und Ovo-Transanon forte

Enthalten das seit Jahrzehnten gegen die Beschwerden im Klimakterium hervorragend bewährte Transanon mit einem Zusatz östrogenener Substanz in Form eines Stilben-Derivates.

Anwendungsgebiet: Amenorrhoe, Oligomenorrhoe. Auch bei klimakterisch, vasomotorisch bzw. trophoneurotisch bedingten Hautleiden.

Oxymor-Kurpackung

Zusammensetzung: Weiße Tabletten: Alum. acet. benz. mit indiff. Zusätzen. Rote Tabletten: Alum. acet. benz. 8-Acid benz. 2-Alumen kalin. 42-Natr. sulf. 42-Alumen lactic. 0,2-Indiff. Tabl. Zus. ad. 100 gefärbt. Analkalbe-p-Dichlorbenzol 1,35-Naphthalin 0,9 Acid. salicylic. 0,9-Anaestain-Salbengrundlage mit 0,7% Anästain ad. 100.

Anwendungsgebiet: Gegen Oxyuriasis.

Pancurmen

Zusammensetzung: Pancreas sicc. pflanzl. Diastase Curcumafarbstoff.

Anwendungsgebiet: Chronischer Meteorismus, Blähbauch, Angra pectoris, Gastritiden, Cholangitis, Enteritis sowie Pancreasinsuffizienz und dyspeptische Zustände verschiedenster Art.

Zusammensetzung: ... Cresoie und ... Emulgator.

Sche

Penicilletter

Schachtel 100 I.E. Calciumpenicillin und 0,025 g Sulfanilamid pro Tabletten zu 500 I.E. Penicilletter forte: 20 I.E. 1500 E.

Anwendungsgebiet: Mandelentzündungen, Entzündungen der Mund- und Rachenhöhle, Angina, Gingivostomatiden, Verhinderung nach chirurgischen Eingriffen wie: Zahnextraktionen, Resektionen, Entfernung von Cysten usw.

Röhrchen mit 10 Tabletten

Penicillin-Calciumsals

Doppelkur 48 weiße Tabletten 0,5 zum Einsatz 12 rote Tabletten 2,5 für Einsatz 1 Tube 10 g als An

Anwendungsgebiet: Staphylokokken, Streptokokken, Pneumokokken, Gonokokken, Meningokokken, Gasbrandbazillen, Milzbrandbazillen, Diphtheriebazillen, Spirochäten, Actinomyceten.

Zur Injektion: Flaschen zu 200000 und 500000 i. E.

Penicillin-Wundpuder

Penicillin-Wundpuder dient zur örtlichen Behandlung von Eiterungen aller Art wie Furunkulose, Pyodermien, eiternden Wunden.

Röhrchen mit 5 g zu 2500 i. E. Glas mit 50 g zu 25000 i. E.

Pentidrin

Zusammensetzung: p-methylaminoethanolphenol tartrat.

Anwendungsgebiet: Akute und chronische Kreislaufschwäche, als Analeptikum bei Kreislaufschwäche, bei Infektionskrankheiten (Grippe, Diphtherie, Pneumonie, Ruhr, Typhus), Koronarerkrankungen, Asthma.

10- und 25-g-Tropfen 20 Tabletten zu 0,1 g 6 Ampullen zu 1,5 mit 0,06 g Pentidrin

Lepton-Witte

Leptonium siccum pro bacteriologia. Anwendungsgebiet: In Pulverform bei Magen- und Darmkrankungen, Diarrhoe, zur urspezifischen De-

Abpackung n. Wunsch

Pepsacid *Stimmung*

Zusammensetzung: 80% Betainhydrochlorid (feste Salzsäure) und 20% Pepsin doppelt stark.

Anwendungsgebiet: Mangelhafte Magensaft- und Salzsäuresekretion, Enteritis, chronische Darmstörungen nach Ruhr, gastrogene Diarrhoe.

10 Tabletten
Glasröhrchen
in Pulverform

Percresan *Indol Hydroxy n. h. h. D. d. l. e. b. u.*

Percresan ist ein vielseitig anwendbares Desinfektionsmittel, das als Wirksubstanz bakterizid hochwirksame Derivate des Chlorphenol mit geringer Resorptionstauglichkeit und Giftigkeit enthält.

Anwendungsgebiet: Zur Feindesinfektion.

Flasche zu 250
und 1000 ccm

Peremesin *chem. Farbstoff*

Kolloidale Ceroxalat-Komplexverbindung.

Anwendungsgebiet: Bei Schwangerschaftserbrechen sowie gegen See-, Luft- und Eisenbahnkrankheiten.

10 und 25 Tabletten
zu 0,1 g

Permaemyl forte *Leberung*

Elweißreicher Leberextrakt findet Anwendung bei perniciöser Anämie, Intoxikationen, Anämien nach Blutverlusten.

3 Ampullen

Phenacetyl *Phenacetin*

Phenacetyl ist ein wirksames Schmerzmittel, das bei verschiedenen Arten von paroxysmalen Schmerzen (Krisen) Anwendung findet.

Glas zu 150 ccm

Phosphor *Phosphor*

Phosphor ist ein wirksames Schmerzmittel, das bei verschiedenen Arten von paroxysmalen Schmerzen (Krisen) Anwendung findet.

Flasche zu 100 ccm

Phosphor *Phosphor*

Phosphor ist ein wirksames Schmerzmittel, das bei verschiedenen Arten von paroxysmalen Schmerzen (Krisen) Anwendung findet.

Tropfflasche
Spezialflasche

Pervalen

Zusammensetzung: Pervalen ist eine Lösung chlorierter Phenolhomologe in glyzerin-alkoholischer Seifenlösung.

Flasche zu 100 ccm

Anwendungsgebiet: Bei Pyodermien, Ekzemen, Ektubitus und Verbrennungen, bei Furunkulose und zur antiseptischen Behandlung von Furunkel und Abszessen.

Pervitin

Zusammensetzung: 0,003 g 1-Phenyl-2-methylaminopropanhydrochlorid.

Packung zu 30 Tabletten
6 Ampullen und 100 Ampullen

Anwendungsgebiet: Peripheres Kreislaufmittel mit Depotwirkung, Atmungsanaleptikum, Spasmolytikum, Diuretikum, Antiallergikum, besonders bei Heubrennen und Rhinitis. Weckmittel bei Narkosen und Vergiftungen, Stimulans bei Depressionen und Hypotonie.

Phenacetyl

Zusammensetzung: Phenacetin, Phenyldimethylpyrazolon, Coffein.

10 und 20 Tabletten

Anwendungsgebiet: Bei Neuralgie, Migräne, rheumatischen Beschwerden, Infektionskrankheiten wie Grippe, Pneumonie, usw.

Physival

Zusammensetzung: Eine schwach spirituöse Tinktur aus fermentierter aufgeschlossener Baldrianwurzel, aus Rotdornblüten und aus Hopfenblüten. Des weiteren enthält die Tinktur geringe Mengen Analgetica, Sedativa in physiologisch abgestimmter Menge, d. a. Antipyrin und Bromharnstoff.

Flasche zu 20 ccm

Anwendungsgebiet: Bei Neurasthenie, Herzneurose, nervösen Magenbeschwerden, verschiedenen Formen der Hysterie, Agrypnie.

Requetan

Zusammensetzung: Acidum diaethylbarbitur 0,12, Dimethylaminophenazon 0,28.

Anwendungsgebiet: Gegen Migräne, Zahnschmerzen, Neuralgie. Ferner bei schmerzhaften Zuständen während der Menstruation.

Rhinogeran H

Zusammensetzung: Calciumchlorid, Salz. 4-Butylaminobenzoldimethylaminoäthanol, Berus-Toxin, Vascelletta cum Emulgator.

Anwendungsgebiet: Gegen Heuschnupfen.

Rhinogeran verstärkt

Zusammensetzung: Ol. silv. comp. 1,0, 4-Butylaminobenzoyldimethylaminoäthanol HCl 0,05, Lan-Emulsion 10,0, Vascelletta ad 100,0.

Anwendungsgebiet: Gegen starken Niesreiz bei Schnupfen.

Röntgenbariumsulfat DAB 6

Röntgenkontrastmittel

Barium

Zusammensetzung: Röntgenbrist. Rutilin (Quercetin-
Bismut).

Anwendungsgebiet: Bei Darmpatzen zur Be-
kämpfung von Geschwülsten und Dia-
gnose.

10 Tabletten Salicylsäure DAB 6

Abpackung n. Wunsch

10 Tabletten Anasthmyl-Asthma-Pulver

Zusammensetzung: Pyraz. phenyl. dim. Phenacetin, Ephedrin, Coffein, Acid. benz.

Packung zu 10 Stück

Anwendungsgebiet: Bronchialasthma, Erkältungs-
krankheiten.

Tabletten Santonin

Zur Beseitigung von Ascariden.

10 Tabletten zu 0,01
10 Tabletten zu 0,025

Tabletten Schwefel-Diasporal

Zusammensetzung: Kolloidale, hochdisperse Lösung
von Schwefel in Glycerin.

3 und 10 Ampullen
zu 2 ccm à 10 mg
3 und 10 Ampullen
zu 5 ccm à 30 mg

Anwendungsgebiet: Bei Gelenkrheumatismus.

Sennatin

Enthält alle wirksamen Prinzipien der Senesblätter
unter Ausschluß der Nebenwirkungen hervorrufenden
Sennaharze und der Ballaststoffe.

5 Ampullen zu 3 ccm

Anwendungsgebiet: Prophylaxe und Behandlung
postoperativer Darmlähmung sowie akuter und chro-
nischer Obstipation.

10 und 20 Tabletten Sepso-Tinktur

Zusammensetzung: 12,85 komplexe Halogen-Rho-
dan-Metallverbindungen.
1,80 Salicylsäure ad. 100,0, Thymolspiritus 60%iger.

Sepso-Tupf à 3 ccm
Flasche zu 20, 50,
250, 1 000 ccm

Anwendungsgebiet: Zur äußerlichen Anwendung
für alle Indikationen der Jodtinktur in der großen und
kleinen Chirurgie, Gynäkologie, Dermatologie.

Silargetten

bleim-faltlos Heyden

Zusammensetzung: Schwerlösliche gummihaltige Pastillen mit 10% Silargel-Heyden. Silargel ist eine feste, kolloid. Lösung von Chlorsilber in aktivem Kieselsäuregel. Silbergehalt des Silargel 0,5% in einer Silargette also 0,00025 g.

Anwendungsgebiet: Zur Verhütung von Grippe, Katarrhen der Mund- und Rachenhöhle, Angina, Pharyngitis. Behandlung von Grippe, Katarrhen, Angina, Stomatitis, Gingivitis und Glossitis.

Spalt-Tabletten

Prof Dr. Müller

Zusammensetzung: Phenacetin, Dimethyloxy-chinolin, Dimethylamino-phenyldimethylpyrazolon, Phenylglycolsäurebenzylester, Coffein, Ephedrin.

Anwendungsgebiet: Analgetikum und Antipyretikum. Bei periodischem Unbehagen, Alkoholabusus, fieberhaften Erkrankungen.

Speton

Femmesler Werke

Zusammensetzung: Natr. dichlorylsulfamidobenzoic., Dioxynbernsteinsäure, Natr. hydrocarb.

Anwendungsgebiet: Gynäkologische Desinfizien und Antiseptikum, antikonzeptionsmittel.

Strophantose

Kali Chemie

Stufe I und II

Zusammensetzung: ... Lösung von 0,25 bzw. ... Lösung von ...

... bei akuter ...

Strophil

Strophil Werke

Packung: Membran- und K-Strophantin.

Anwendungsgebiet: Für alle Formen von Herzinsuffizienz, im besonderen solche, die primär durch eine Koronarinsuffizienz ausgelöst werden.

3 und 24 Ampullen zu 2 ccm

Strumacil

Zusammensetzung: Methylthiouracil.

Anwendungsgebiet: Mittlere und schwere Hyperthyreose einschl. Vollbasedow, Colitis ulcerosa.

20 Tabletten zu 0,1

Styptan

Styptan

10 und 20 bestehend aus spezifischen Wirkstoffen des Rückenmarks.

Anwendungsgebiet: Lungen- und Magenbluten, Blutungen des Urogenitalsystems, Blutungen an Mund, Nase, Ohr, postoperative Blutungen, gynäkologische Blutungen, hämorrhagische Zustände.

6 und 20 Ampullen zu 1 ccm

Sulfanilamid

Dr. H. J. H. Werke Rodleben

Röhre mit 20 Tabletten

Zusammensetzung: p-Aminophenylsulfonsäureamid. Anwendungsgebiet: Mandelentzündung — auch zur Prophylaxe — Bakterienruhr, Blasenkatarrh, Pyelitis, Nephrocystitis, Otitis, Lymphogranulomatose.

20, 300, 1000 Tabletten zu 0,5 250 und 500 g Pulver

Sulfoderm-Puder

Sulfoderm v. Heyden

Feiner Kolloid-Schwefelpuder.

Anwendungsgebiet: Bei Seborrhoe, Akne, Pityriasis, Impetigo, Pyodermie.

Packung zu 25 und 500 g

Strophil

Strophil

I = 5 Ampullen 10 ccm 1/4
II = 5 Ampullen 10 ccm 1/4

Zusammensetzung: Gebrauchsfertige, sterile Suspension von 0,3% äußerst fein verteiltem Schwefel in Saline.

3 und 50 Ampullen zu 1 ccm 3 Ampullen zu 5 ccm

Anwendungsgebiet: Chronische Gelenkerkrankungen, insbesondere Arthritis deformans, Polyarthritis rheumatica, auch des Kindesalters, chronische Versteifung der Wirbelsäule. Ferner bei chronischem Ischias, metallurgische Erkrankung des Nervensystems. Bei gynäkologischen Erkrankungen wie Parametritis, Pelveoperitonitis, Salpingoophoritis.

Sulzberger-Tropfen

Zusammensetzung: Aloe (verschiedene Arten) 22, Fol. Trifolii übr. 2, Div. äth. Öle, etwa 1, Spiritus /Wasser 75 p. Ct.

Anwendungsgebiet: Universelles Verdauungsstimulans.

Targesin

Goedelebe

Kolloidale komplexe Diacetyltanninsilbereiweißverbindung. Silbergehalt etwa 6%.

Anwendungsgebiet: Gonorrhoe, Orethritis posterior und Cystitis.

Targophagin

Goedelebe

Zusammensetzung: Targesin und p-Butylammonbenzoyldimethylaminoäthanolchlorhydrat, p-Aminobenzoessäureäthylester.

Anwendungsgebiet: Gegen entzündliche Erkrankungen der Mund- und Rachenhöhle.

teab

Philipscharin

Zusammensetzung: Tetraäthylammoniumbromid.

Anwendungsgebiet: Zur Unterbrechung der Reizleitung in den sympathischen Ganglien bei peripheren Durchblutungsstörungen, Hautkrankheiten, Causalgien.

rebethion

Zusammensetzung: Acetyl-p-aminobenzaldehydthiosemicarbazon.

100 und 1000 Tabletten zu 0,05 Röhrcchen mit 5 g Reinsubstanz

Anwendungsgebiet: Bei allen aktiven, pulmonalen und extrapulmonalen tuberkulösen Prozessen, Darmtuberkulose, Lymphknotentuberkulose, Nieren-, Blasen- und Genitaltuberkulose

ecesal

Calciumthiosulfat.

Flasche zu 2

Anwendungsgebiet: Bei allen chronischen und akuten Infektionskrankheiten, entzündlichen Erkrankungen der Leber und Gallenwege. Asthma, Heufieber, Urticaria und andere allergische Erkrankungen.

5 Ampullen zu 10 ccm 10%iger Lösung

ecoryl

Zusammensetzung: 1% Ephedrin, 2% organ. Calcalz, 0,01% Äthoxydiaminocridinlactat in viskoser, säbriger Lösung.

Gläser zu 50, 250 und 500 g

Anwendungsgebiet: Bei Nasen- und Rachenkatarrh, Heuschnupfen, vorbeugend gegen Grippe.

Pipettenflasche mit etwa 15 g

eer-Sulfoderm-Puder

Sulfoderm-Puder-Heyden (Kolloidschwefelpuder, 1% Schwefel) und etwa 6% Steinkohlenteer mit Geruchsborgern, der Hautfarbe entsprechend gefärbt.

20 und 250 T zu 0,5 g

Anwendungsgebiet: Ekzematöse Erkrankungen, Säuglingsekzeme, Neurodermitis und Blasenkrankungen der Haut.

Packung zu 25 g

thioseptsalbe

Zusammensetzung: 10 Teile Tiroler Schieferöl, Zinkoxyd, 82 Salbengrundlage.

5 Ampullen zu

Anwendungsgebiet: Bei allen entzündlichen Hauterscheinungen, bei rheumatischen Affektionen.

Tube zu 18 g. Dose zu 27 und 250 g Inhalt

Thyreoidin sicc. 0,06-Gehe

Standardisiertes Schilddrüsenpräparat.

Tiranol

Zusammensetzung: 1,5 Teile Antiseptika, 93,5 Kieselsäureester, 5,0 Harz.

Anwendungsgebiet: Zur konservativen Behandlung der Caries profunda bleibender Zähne mit intakter Pulpa.

Tonasin

Zusammensetzung: Steril filtriertes, natives Serum gesunder Tiere mit 25% Disacchariden, 10% Monosaccharid, 15% Äthylalkohol, 0,8 mg% Vitamin B₂, 1% Vitamin C, 0,05% Coffein sowie tonisierender pflanzlichen Bitterstoffen und Geschmackskorrigentien.

Anwendungsgebiet: Nutritives, tonisierendes Oralserum gegen Störungen im Wasserhaushalt bei Hypoproteïnämie, Störungen der Blutgeneration, dysfermentativen Magen- und Darmstörungen.

Tonasin

Zusammensetzung: Tonasin ist das Dinatriumsalz der Mononethylaminsäure mit 27,4% organisch gebundenem Arsen.

Anwendungsgebiet: Körperliche Schwächezustände, Nervenkrankheiten, Bismut- und Quecksilber-Intoxikationen.

Tropfen

Zusammensetzung: ...

Transanon

Kalk-Magnesiumverbindungen mit Oleum Salviae und Extr. Aloe.

Schachtel mit 50 Bohnen

Anwendungsgebiet: Spezificum gegen klimakterische Beschwerden.

Tritol

Zusammensetzung: 1 stark. 8 g Extraktum filicis, 28 g Oleum Ricini, Malzextraktmischung 4:3.

Glas zu 50 g

Anwendungsgebiet: Taenia saginata, Taenia solium.

Turpintol 15%

Zusammensetzung: Oleum pedum tauri, Ol. Terebinth, rect.

6 Ampullen zu 1 und 2 ccm
20 Ampullen zu 1 und 2 ccm

Anwendungsgebiet: Adnexitis, Rheuma, Prostatitis, Erkrankungen der Atmungsorgane, Furunkulose, Ekzem und andere Hauterkrankungen.

Tyronorman

Schilddrüsen-Schutzstoff gegen Thyreotoxikose (Morbus Basedowi) und thyreogen bedingte Störungen der Lactation, physiologisch ausgewertet und standardisiert.

18 und 100 Tabletten

Ulcoterran

Zusammensetzung: Robinia-Spezialauszug 0,3, Argentum-Collo D 3 1,0, Nux vom. D 2 1,0, Anacardium D 2 1,0-Bismutum subnitricum 1,0, Magn. peroxydat 3,0 Magn. usta 2,0 Calamus rhiz. rec. 11,5 g Heilerde und Kieselgel.

Packung zu 40, 100 und 1 000 g

Anwendungsgebiet: Gastritis Sodbrennen Ulcus ventriculi et duodeni

Unguentum lanetti

Zusammensetzung: basiert auf Cetylalkohol Cetiplan Glycerin.

Glas etwa 850 g

Anwendungsgebiet: Eine hochwertige Salbengrundlage.

Uraemonal *Dr. Pen*

Zusammensetzung: Hexamethylentetramin Acid. citric. Piperazin Lith citricum Kal. sulf.

Anwendungsgebiet: Störungen des Stoffwechsels arthritische und neuralg. Erkrankungen Harnsäure Diathese.

Glas zu etwa

Vagilan simplex *Dr. Pen*

Zusammensetzung: Acid. adipin. Acid. boric. in 20 und 300 Tabletten
schaumbildender Tablettenmasse. zu 0,5

Anwendungsgebiet: Allgem. Hygiene der weiblichen Genitalorgane unspezifischer Fluor.

Uricedin *Phroschein*

Zusammensetzung: Gemisch von Alkalicitrat Alkalitartrat und sulfatisch-salinischen Salzen.

Anwendungsgebiet: Digestivum Depurans Uratolyticum.

Packung zu 2
und 100 g

Valocordin *Dr. Pen*

Zusammensetzung: Bromisovaleriansäureäthylester Tropfflasche
Natr. phenyläthylbarbituricum, beides in kleinen Tages- mit 15 g Inhalt
dosen, Hopfen und Mentha.

Anwendungsgebiet: Stenokardische und pseudo-
stenokardische Beschwerden Tachykardie alle Formen
vegetativer Erregungszustände vasomotorische Stö-
rungen, kardiogastrische Symptome (Zwerchfellhoch-
stand), intestinale Spasmen (Colon, Pylorus).

Uropal

Zusammensetzung: Extr. Uvae ursi Acid. amygdal.
Hexamethylentetramin. Salol.

Anwendungsgebiet: Harninfiziens und Adjuvans
bei Gonorrhoe.

Packung zu 3
bletten

Valvanol *Dr. Pen*

Zusammensetzung: Eine wäßrige Lösung von chlo-
rierten phenolhomologen, alkoholischen Speziallösungs-
mitteln und seifenartigen Netzstoffen. Flasche zu 100 g

Anwendungsgebiet: Gewebefreundliches, material-
schonendes Desinfiziens zur Haut, Instrumenten-,
Krankenbett- und Sputumdesinfektion.

Uscabin liquid.

Zusammensetzung: Fract. Pix Lith. org. Sulf. Sapo.
Ol aeth.

Anwendungsgebiet: Bei Scabies Pediculosis Der-
matozoonosen Pyodermien Ekzemen.

Flasche zu 100
1 000 cem

Valvanol-Tinktur *Dr. Pen*

Zusammensetzung: Valvanol-Tinktur ist eine Lö-
sung von insgesamt 2,5% chlorierten Phenolhomologen
in einem flüchtigen, gut netzenden organischen Lösungs-
mittel. Flasche mit 20 g

Anwendungsgebiet: Desinfizierende, antiseptische
und antimykotische Tinktur auf Valvanolbasis, zur
Desinfektion des Operationsfeldes und von Injektions-
stellen, zur Wundbehandlung und zur Therapie von
Pilzkrankheiten der Haut.

Uvalysat *Dr. Pen*

Zusammensetzung: Aus Uräthen Uvae ursi ge-
wonnen.

Anwendungsgebiet: Zuverlässiges pflanzliches
Harnantiseptikum für personal Hygiene und Erkrän-
kungen des Urogenitaltraktes.

Tropfflasche zu
30 und 50 cem
20 Tabletten

Vaccineurin *Dr. Pen*

Zusammensetzung: *Dr. Pen*

6 Ampullen zu
Stärke I, II, III

Dragees Neunzehn verstärkt

Prof. Dr. Misch

Zusammensetzung: Extr. Fel Suis, Ferro ammon. sulf. Natr. bic. Glycoside, Extr. frang. Sapo med., Saponin, Phenolphtalein, Rhiz. Rhei, Specz. lax., Spec. Drast.

Anwendungsgebiet: Mild wirkendes Stuhlregulierungsmittel zum kurmäßigen Gebrauch.

Dreinerv-Dragees

Prof. Dr. Misch

Zusammensetzung: Semenossypii, Semen Foenu-graeci, Cholesterin, hormonale Org. Substanz, Calc. phosphor, Natr. phosphoric., Ferroglycerinum phosphoric., Kal. und Natr. brom. Saccharum, Dextrose.

Anwendungsgebiet: Nervinum und allgemeines Aufbaumittel, besonders wirksam infolge der mildwirkenden Bromkomponenten.

Dyspepsol

Fahlberg-List

Zusammensetzung: Pektinstoffe, Zellulose.

Anwendungsgebiet: Chronische und akute dyspeptische Störungen, infektiöse und toxische Darmerkrankungen.

Echinacin-intern

Madaris

Auszug aus der frischen Echinacea purpurea.

Anwendungsgebiet: Im Sinne einer Resistenzsteigerung bei septischen und entzündlichen Prozessen, Furunkulose.

Patent Apothekisches Pommes-Werk

Misch

Urotin

Prof. Dr. Misch

Glasflaschen
Stück Inhalt

enthält Ol. Junip., Ol. Terebinth., Ol. Menth. und geschwefeltes Öl.

Schachtel mit 12 Gelatinekapseln

Anwendungsgebiet: Zur internen konservativen Behandlung von Nieren- und Uretersteinen sowie allen entzündlichen Erkrankungen der Gallenblase und Gallengänge, Gallensteine und Leberaffektionen (Ikterus).

Ephadren

Prof. Dr. Misch

Packung zu 72

Zusammensetzung: 1 ccm enthält 0,02 Ephedrin hydrochloricum und 0,0001 Adrenalin hydrochloricum.

6 und 100 Ampullen zu 1 ccm

Anwendungsgebiet: Bei vasomotoren und Kreislaufinsuffizienzen, Kollaps, bei starker Hypoonie, vor allem bei Asthma und zur Linderung und Beseitigung der Atemnot. Auch bei Emphysem und bei Heufieber hat sich Ephadren bewährt.

Epileptasid

Amel Desaut.

Granulat 50 g
Pulver 50 und
Flaschen zu 15
250 g

Zusammensetzung: Sterile, stabilisierte, konservierte wäßrige Lösung von 0,04 mg/ccm verschiedener Crotalus (Klapperschlangen) Toxine. Staatlich geprüft. 2 Jahre haltbar.

5 Ampullen zu 1 ccm
Ampullenflasche mit 5 ccm

Anwendungsgebiet: Crotalustoxin (Klapperschlagentoxin). Injektionslösung gegen Epilepsie, Chorea minor und Migräne.

Flasche zu 20
ccm
6 Ampullen zu

Epithensalbe

Ter...-Werk

Scharlachrot und Perubalsam in besonderer Salbengrundlage.

Tube mit 20 und 35 g Inhalt

Anwendungsgebiet: Gegen Hautschäden aller Art. Furunkulose, offene Frostschäden, nach Ausbrennen von Lupus und Hautkrebs.

Flasche zu 20 ccm
3 und 24 Ampullen
2 ccm

Essentia aurea

Dr. Sch...

Crataegus 10 FD/ccm 17,0 g, Aurum muriaticum D4 0,12 g, Cactus D2 17,0 g, Lobelia D4 17,0 g, Ignatia D4 17,0 g. Spezialauszug Panstabil von: Convallaria 0,017 g, Aqua destillata.

Anwendungsgebiet: Unspezifische Reiztherapie, Myalgien, Neuralgien, Ischias, chron. Rheumatismus, Pruritus, Urtikaria, Ekzeme.

Eufemyl

Femmel, K...

Mamm. Lact. sicc. 0,1

Anwendungsgebiet: Gegen Menstruationsbeschwerden, insbesondere ovarielle Dysmenorrhöen, Polyhypermennorrhoe und Metrorrhagien, blutende Myome.

Eufoliat

Dr. Madan...

Stabilisiertes Kardobenedikten-Löwenzahn-, Wermutpräparat.

Anwendungsgebiet: Bei Erkältungskrankheiten, Grippe-Prophylaxe, im Sinne einer allgemeinen Resistenzsteigerung bei Ermüdungs- und Erschöpfungszuständen verschiedener Genese, Ulcus cruris.

Euphyllin

Bjrk Oranienb...

Zusammensetzung: Euphyllin ist eine Theophyllin-Aethylendiamin-Verbindung mit 78% Theophyllin-gehalt.

Anwendungsgebiet: Diureticum und Cardiacum. Das erste Theophyllin-Aethylendiaminpräparat des Handels. Die starke vasodilatatorische Wirkung des Euphyllin erklärt sich durch die Additionswirkung der Aethylendiamin-Komponente.

Euvernil

chem. Fabrik von Mey...

N-Sulfanylcarbamid $H_2N-SO_2-NH-CO-NH_2$

Anwendungsgebiet: Ein Chemotherapeutikum gegen Infektionen der Harnwege (Cystitis, Pyelitis, Pyelonephritis, Prostatitis usw.).

30, 250 und 1000 Flascheninhalt

Falichol

Enthält sämtliche natürliche Wirkstoffe der Ochsen-galle (Fel tauri sicc.), Hexamethylentetramin, Phenolphth., Kalomel, Kampfer, Menthol.

Anwendungsgebiet: Mangelnde Gallenproduktion, gestörte Motilität der Gallenwege, Entzündungen aller Art der Leber-Gallen-Gegend, insbesondere bei Entero-colitiden.

Röhrchen mit 15 Dra-gees

Farnotaen

Zusammensetzung: Kapseln mit 8 g Extraktum Filicis, 37 g Oleum Ricini Inhalt.

Anwendungsgebiet: Taenia saginata, Taenia solium. Für Erwachsene und Kinder.

Schachtel mit 15 Ge-latine-kapseln

Falistrypt

Biologisch standardisierte Lösung von Polygalakturon-säureestern und Glykokoll.

Anwendungsgebiet: Bei Blutungszuständen jeg-licher Ätiologie zur i. m. Injektion, Instillation, zur oralen Darreichung und zur lokalen Anwendung in Pulverform.

5 Ampullen zu 10 ccm
6 Ampullen zu 25 ccm
zur lo'alen Anwen-dung
Pulver Glas zu 15 g

Ferrostabil

stabilisiertes Ferrochlorid.

Anwendungsgebiet: Sekundäre Anämie, Chlorose, Schwangerschaftsanämie, Perniziöse Anämie.

50 Dragees zu je 0,05 g

Fissurin-Salbe

Zusammensetzung: Wismutsubnitrat, Wismutsub-gallat, Zinkoxyd in einer reizlosen, deckenden, gut haf-tenden Zerat-Wolfett-Salbengrundlage. Maschinelle Verarbeitung der Salbengrundstoffe in Rühr- und Walz-werken gewährleistet feinste Verreibung der Wirkstoffe.

Kruke mit 30 oder 250 g Inhalt

Folia Digitalis purp. titrata

Für die Rezeptur.

5 Ampullen à 2 ccm
25, 50 und 100 g-
Gläser

Behe.

Fontanon

standardisiertes Ovarhormon zur substituierenden Therapie bei funktionellen Störungen der Frau (Amenorrhoe, Infantilismus, mit Hypoplasia uteri Klimakterium Stadium 2 und 3, Dysmenorrhoe) evtl. Kombination m. Hypophysenvorderlappen Hormon Horpan.

Sächsisches Serumwerk

Gastrase *Asid. Dessau*

Zusammensetzung: Gastrase ist eine braun-rote opaleszierende wäßrige Lösung von kolloidalem Silber, Schutzkolloiden, Kamillenextrakten und p-chlor-m-Kresol.

Anwendungsgebiet: akute und subakute Formen der Gastritis, Ulcus ventric. et duodeni bei beginnendem Icterus simpl.

Gastrozil

Chem. Fabrik v. Heyden

Kalziumsilikat.

Anwendungsgebiet: Ein Spezifikum gegen Hyperacidität, Ulcus.

Gastrozil-B

Chem. Fabrik v. Heyden

Tabletten mit 0,5 g Ca-Silikat-Gel und 0,015 g Extr. Bell.

Anwendungsgebiet: Analgetikum bei Hyperacidität, Ulcus.

Gecolax

Behr

Zusammensetzung: Extrakt. Frangul. fraucus, sicc. 0,12, Extr. Frangul. part. aquos sicc. 0,12, Extr. Rhei aquos sicc. 0,06, Extr. Atyp. fol. aquos sicc. 0,04.

Anwendungsgebiet: Mildes, reiz. purgatives Ab-

3 Ampullen zu 1000 int. Einheiten
1 Ampulle zu 1000 Einheiten zu 1000
30 Dragees zu 1000
20 Dragees zu 1000
1000 Einheiten

Tropfflaschen
Inhalt

Packung zu 500
1 kg

20 und 1000 Tab
zu 0,5 g

30 und 500 Dr

Gelonida Aluminium subacetici

Sächsisches Serumwerk

Basisches-essigsäures Aluminium mit 10% Aluminiumsulfat.

Anwendungsgebiet: Bei Madenwürmern.

20 und 500 Tabletten zu 0,5 g
20 und 500 Tabletten zu 1 g

Gelonida stomachica

Sächsisches Serumwerk

Zusammensetzung: Extr. Belladonn. 0,01, Bismutum subnitric. 0,2, Magnes. ust. 0,6.

Anwendungsgebiet: Bei Hyperacidität, spastischen Zuständen des Magen und Darms.

20 und 250 Tabletten zu 1 g

Gestrophan

g-Strophantin.

Anwendungsgebiet: Cardi tonicum zur Injektion.

10 Ampullen zu 0,25 mg, 1,1 ccm
10 Ampullen zu 0,5 mg, 1,1 ccm

Globinal

Asid. Dessau

Zusammensetzung: Globinal, ein hellgelbes bis hellgraues, geruchloses, mittelfeines, süß schmeckendes Pulver, besteht zu etwa 60% aus Globin und zu etwa 40% aus Disaccharid. Daneben enthält es in geringen Mengen physiologisch indifferente Geschmackskorrigentien.

Anwendungsgebiet: Globin-Präparat zur Substitution hochwertiger Aminosäuren gegen alimentäre Eiweißmangelzustände, akute und chronische Blutverluste.

Flasche mit etwa 250 ccm

Glycurator

Sächsisches Serumwerk

zur quantitativen Bestimmung von Zucker im Harn, enthält Reagenzflüssigkeit für 15 Untersuchungen Reagenzgläser sowie Pipetten

Glykopud steril

Glykokoll, Calciumcarbonat.

Anwendungsgebiet: Bei nässenden Ekzemen, Verbrennungen 1. und 2. Grades, Ulcus cruris, Intertrigo, Nekrosen, Impetigo, Dekubitus.

Originalpackung etwa 15 g

Glykosal-Tabletten

bleu-micro

Glykokoll, Calciumphosphat.

Anwendungsgebiet: Zur Behebung von Eiweißmangel-schäden, Störungen im Kreatin-Stoffwechsel. Ferner bei Basedow, Fieber, Kachexie ist Glykosal indiziert.

Guajektol

Byke. Südeuropa

Zusammensetzung: Guajektol ist freies, nach einem in Wasser gelösten, chemisch reinen Guajakol mit einem Zusatz von p-Aminobenzoyldiethylaminoethanol und l-Ascorbinsäure. Es ist eine hellgelbe Flüssigkeit, die bei längerer Aufbewahrung nachdunkelt, ohne daß die Wirksamkeit beeinträchtigt wird. Die 1 ccm-Ampulle enthält 0,075 g Guajakol.

Anwendungsgebiet: Bei Erkrankung des Respirationstraktes. Akute und chronische Bronchitis, Grippe-Pneumonie, Asthma bronchiale und Lungentuberkulose.

Guttajod

Femmel

Labil-organ Jod. Verbindung (0,5 mg J).

Anwendungsgebiet: Bei Schnupfen zur internen Jodtherapie.

Gynal-Tabletten

Tropen Kerke

Zusammensetzung: 30% Glukose, 30% Calcium-lactat, 18% Borsäure, 0,15% Natrium bitoracicum, 10% Stärke und Gleitmittel.

Anwendungsgebiet: Zur zureichenden Therapie des Fluor albus.

Haemophobin

bleu. Fabrik Scharffenberg

3 und 10 Ampullen
5 ccm
3 Ampullen zu 10 ccm
10 Ampullen zu 10 ccm

Haemostypticum auf Pektingrundlage

25 Tabletten

pro Injektione.

Flasche zu 150 ccm

Zusammensetzung: 1,5% Pektin in isotonischer Natriumchloridlösung. liquidum: zur peroralen Darreichung.

Zusammensetzung: 3%ige Pektinlösung mit Calciumsalzen und einem Zusatz von Calciumisovalerinat. Anwendungsgebiet: Magen- und Darmbluten, Blutungen während der Operation, Nierenbeckenblutungen usw.

Haemostypt

5 Ampullen zu 1

Zusammensetzung: Haemostypt ist eine sterile, klare, farblose Lösung von 0,009 mg/ccm haemostyptisch wirksamer Toxine mehrerer Giftschlangenarten. Anwendungsgebiet: Blutungen nach Verletzungen und Operationen, Tonsillektomien, Blasenbluten usw.

Ampullenflasche mit 25 ccm

Hametum-Extrakt

Hamamelis Extrakt

Destillat aus Folia Hamamelidis.

Anwendungsgebiet: Hämorrhoiden, Varizen, venöse Blutungen, Nasenbluten.

Flasche zu 50 ccm

Hametum-Salbe

Hamamelis Salbe

Spezialdestillat aus Hamamelis virginica.

Anwendungsgebiet: Hämorrhoiden, oberflächliche Hautdefekte, Wund- und Kindersalbe

Büchse zu 50, 100, 250 g

Helpin

bleu. Scharffenberg

Mit Natrium, Kalium und Kalziumchlorid versetzte Lipoidemulsion.

Anwendungsgebiet: Bei Tuberkulose, Anämien, in der Rekonvaleszens.

10 Ampullen zu 1 ccm

Heparjekt

bleu. Scharffenberg

Heparjekt ist ein konzentriertes gereinigtes Leberpräparat zur Behandlung der perniziösen Anämien.

5 und 10 Ampullen zu 2 ccm

Hepartonyl forte *25er Packung*

Ein hochwertiges, hochkonzentriertes Leberpräparat.
Anwendungsgebiet: Für die Therapie der hyperchromen megalocytären Anaemien, insbesondere der Anaemie perniciosa, sowie der übrigen Indikationen der Leber-Therapie.

3 und 6 Ampullen
 2 ccm

Penacain - Adrenalin

Penacain (p-Aminobenzoyldiacetylaminäthanolhydrochlorid) - Adrenalin (Dioxyphenyläthanolmethylamin).
Anwendungsgebiet: Zur Lokalanesthesie.

10 und 50 Ampullen
 zu 1 und 2 ccm, 1, 2, 4%ige Lösung und Adrenalin 0,005%

Hexamethylenetetramin in Tabletten

Anwendungsgebiet: Spezifikum der Harnwege.

20 Tabletten zu 0,1 g

Jodana-Tinktur

Komplexe Bromarsenrhodamide, methyl, Halogenphosphate in alkoholischer Lösung.
Anwendungsgebiet: Oberflächen-Desinfiziens an Stelle von Jodtinktur.

Flasche zu 10, 50 und 250 ccm

Histopin-Augensalbe *mit Kollagen*

Zusammensetzung: Reiner Staphylokokkenextrakt. Acid. boric. Adeps lanae. Vaseline.

Tube zu 5 g

Jorondellen

Perlen mit 0,05 mg Jod, 0,5 mg Kal. jodatam, 0,01 mg Oleum Eucal., 0,03 mg Menthol.

Packung zu 32 und 90 Perlen

Homoseran *acid Jessan*

Arteigenes Serum aus Retroplazent Blut gesunder Mütter.
Anwendungsgebiet: Zur allgemeinen Umstimmung. Aktivierung der Abwehrkräfte bei Infektionskrankheiten, Therapie bei hormonalen Störungen und Mangelkrankheiten, Ersatz für Bluttransfusionen.

Ampulle zu 10 ccm
 5 Ampullen zu 10 ccm

Anwendungsgebiet: Zur allgemeinen Jodtherapie, Struma, Arteriosklerose, Schnupfen und Erkältungskrankheiten.

Kalorisan

Plastisches Antiphlogisticum in Pulverform.
Anwendungsgebiet: Bei allen rheumatischen Erkrankungen, wie Lumbago, Myalgie, chronischer Arthritis, Drüenschwellungen, Pleuritis.

Packung zu 100 und 750 g

Infegrol *Erman*

Infegrol entspricht in seinen Eigenschaften dem Liquor Cresoli saponat. des DAB 6. Cresolgehalt etwa 50%.
Anwendungsgebiet: Raumdeseinfektion, Krankenpflege und Ungezieferbekämpfung.

Flasche zu 10, 50 und 1000 cm

Karwendol-Globuli dunkel 10%

Zusammensetzung: Karwendol, Glukose, Gelatine-Glycerin H₂O.
Anwendungsgebiet: Zur Therapie des vaginalen Fluors, bei Kolpitis und Adnexitis.

Packungen zu 10 und 100 Stück

I. O.-Syn *Wachstumsförderer*

Zusammensetzung: Organisches Schwefelpräparat auf Fettbasis mit etwa 20% organischem Schwefel.
Anwendungsgebiet: Antiphlogisticum, Antisepticum und Resolvens. Ferner bei Dermatosen, Mastitis, Furunkulose.

30, 50, 500 und 1000 mg

Karwendol-Präparate

Karwendol (Ammonium sulfokarwendolicum). 100% Karwendol.
Anwendungsgebiet: Furunkulose, Karbunkel, Erysipel.

250, 500 g und 1 kg

Karwendol-Puder 5 und 10%

Bei Dermatosen, chronische Ekzeme, Pruritus. Epidermophytien, Pityriasis rosar.

Kephalosan

Zusammensetzung: Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon, Phenylmethylpyrazolon Coffeincitrat.

Anwendungsgebiet: Bei Erkältungskrankheiten. Grippe, Neuralgien, Zahn- und rheumatischen Schmerzen.

Koryn-Nasenöl

Zusammensetzung: Dithyral, Camphora, Mentholum, Ephedrin, pflanzliche und mineralische Öle.

Anwendungsgebiet: Bei allen Nasenkatarrhen und anderen entzündlichen Affektionen der Nase und ihrer Nebenhöhlen.

Kyangutt

Zusammensetzung: Spigel., Scilla, Adonis, Crataeg., Valerian., Camphor., Spiritus.

Anwendungsgebiet: Für das alternde oder nervöse Herz und in der Digitalispause.

Lactobaryt

Kontrastmittel zur Schleimhautdarstellung.

Lacuprin

Echinacea in Kombination mit organischen Säuren und organisch gebundenem Zink.

Anwendungsgebiet: Gegen Anginen, intraorale, Ulcerationen und Entzündungen, eitrige Rhinitis, Phlegmone, Furunkel.

Lanettewachs

Lanettewachs ist eine Wachsartige Substanz von höheren gesättigten Fettalkoholen und Fettalkoholsulfonaten.

Anwendungsgebiet: Für die Kosmetik und in der Pharmazie.

Lasupol

Lasupol, eine synthetische Suppositorienmasse, ist ein völlig neutraler Ester gesättigter, hochmolekularer Fettalkohole und einer Dicarbonsäure.

Anwendungsgebiet: Zur Herstellung von Suppositorien.

Lavagrol

Zusammensetzung: Formaldehyd in Verbindung mit einem Spezial-Emulgator (Gehalt an Formaldehyd 25%). Anwendungsgebiet: Zur Feindesinfektion.

Lecithin

Zusammensetzung: Lecithin pur. vegetab. c. ol. vegetab. 75,0, Sacchar. 24,5, corrig. 0,5, natr. benzoic. 0,004.

Anwendungsgebiet: Pflanzenlecithin zur Nerven- und Bluterneuerung.

Leo Kafettpaste

Zur Behandlung des Zahnfleisches bei Symptomen der Parodontose wie blutendes, entzündetes oder lockeres Zahnfleisch.

Leo-Pillen

Pilulae Rhei comp., Sacch. obduct. Anwendungsgebiet: Bei Darmträgheit, Magen- und Darmverstopfungen, ferner bei Gallenerkrankungen und bei Verstopfung während der Schwangerschaft.

Abpackung n. Wunsch

Abpackung n. Wunsch

Flasche zu 100, 500, und 1000 ccm

Packung zu 105 g

29-g-Tube

30 und 60 Pillen

Lepitonin *Primo*

Zusammensetzung: Diphenylhydantoin 0,1 g pro Tablette.

Anwendungsgebiet: Epilepsie und alle Arten von epileptiformen Erscheinungen.

Leunalyd *Leuna*

Zusammensetzung: Aluminiumoxydhydrat.

Anwendungsgebiet: zur Adsorptionstherapie, bei Hyperacidität, Gastritis, Pyrosis, Ulcus ventriculi et duodeni.

Leunalyd c. Belladonna *Leuna*

Aluminiumoxydhydrat m. Extr. Belladonnae 0,01.

Anwendungsgebiet: Wie Leunalyd.

Leuzerval *Leuna*

Bronisovalerianylharnstoff.

Anwendungsgebiet: Einschlafstörungen, Nervosität, Neurasthenie.

Liquitalis *Sehe*

Digitalis-Präparat.

Anwendungsgebiet: Akute und chronische Herzmuskelschwäche mit ihren Neben- und Folgeerscheinungen ganz entsprechend dem Indikationsgebiet der Fol. Digitalis.

Liulan 101 *Heinold*

Zusammensetzung: Oleum pedum tauri, Bism. subsalicyl., Terpene 0,05 g. Bi je 1 ccm.

Anwendungsgebiet: Bei Lues, Hauterkrankungen, akute und chronische Angina.

Liulan forte *Heinold*

Zusammensetzung: Oleum pedum tauri, Bism. subsalicyl., Terpene 0,1 Bi je 1 ccm.

Loranil

50 Tabletten

Zusammensetzung: N-1-Sulfamyl-N-2-Isopropyl-carbamid.

20 Tabletten zu 0,5 g

Anwendungsgebiet: Gegen Infektionskrankheiten, Sepsis, Pneumonie, Angina, Otitis media, Furunkulose usw.

Pulver mit 50 100 g

20 Tabletten

Luvos-Heilerde

bei rheumatischen und neuralgischen Erkrankungen.

Packungen zu 400 g und 1 kg

Mafera-Herzsalbe

Zusammensetzung: Amyl. nitr., Camph., Menthol, Crataeg., Cinnam., Castor., Valer., Ungt., Paraff.

Originaltube etwa 15 g

Anwendungsgebiet: Cardiale Dyspnoe, insbesondere stenokardische Zustände und Angina pectoris.

10 Tabletten

Materna

Zusammensetzung: Ein aus schlummernden Getreide-Keimen gewonnenes Nahrungsmittel: etwa 30% Eiweiß, 7% Mineralstoffe, 12% Fett (darunter Lecithin und andere Lipoide), sämtliche Getreide-Vitamine, außer dem C-Faktor, besonders E.

Packung mit 250 g in Pulverform

Anwendungsgebiet: Nahrungsmittel.

Tropfflasche zu 20 ccm

Anstaltspackung 500 ccm

Schachtel zu 6 12 Suppositorien

Meleusol

Liquor cresoli DAB 6 mit hochwertigen kapillaraktiven Stoffen.

Packung zu 100 und 1000 g

Anwendungsgebiet: Zur Grob- und Raumdesinfektion.

Flasche zu 5, 15, 75 ccm

Methysal

Methylum salicylic., Ol. chloroformii.

Flasche zu 50 ccm

Anwendungsgebiet: Antirheumaticum, Antineuralgicum zur externen Anwendung.

Flasche zu 20 ccm

Methylthiouracil

Die mtu-Behandlung ist angezeigt bei Vollbazedow und echten schweren und mittelschweren Thyreotoxikosen

Mitranol *Leinwand*

Zusammensetzung: Lösung von Spezialkohlenwasserstoffen und kapillaraktiven Verbindungen.

Anwendungsgebiet: Pediculosis.

Moloid *Sachs. Leinwand*

Nitrokörper 0,33 mg.

Anwendungsgebiet: Gegen Migräne, Gefäßspasmen, zur Differentialdiagnose der echten Migräne.

Multival-Wundsalbe + Lösung *Sachs.*

Wundsalbe auf Basis ungesättigter Pflanzenfettsäuren.
Anwendungsgebiet: Zur Wundbehandlung.

My-Jod

Zusammensetzung: 0,1% Jod an feines disperses Kolloid gebunden, davon etwa 0,03% elementar, außerdem 2% Jodkali.

Anwendungsgebiet: Zur Coupierung septischer Fieber nach Geburt, Abort, Operation, bei Erysipel und septischen Anginen.

Myrmekan 1 + 2 *Mill. Leinwand*

Amelensäure in steriler wäßriger Lösung.

Anwendungsgebiet: Bei Gelenk- und Muskelerkrankungen, Gicht, Ictus, akutem und chronischem Muskelrheumatismus.

Naftalin-Donne

Zusammensetzung: 95-98% hellkräftiger, eigenartiger Rohnafta und 4-5% Spezialeff.

Anwendungsgebiet: Bei Hautkrankheiten, Verbrennungen, Verletzungen, sowie bei Gicht und Rheumatismus.

Neo-Arsoluin

30 Tabletten mit
100 Tabletten mit
0,025 g

Neutrales, leichtlösliches Natriumsalz der 3,3-Diamino-4,4-dioxyarsenobenzolmethylensulfoxyisäure

Flasche mit
Inhalt

Anwendungsgebiet: Laes sämtlicher Stadien, tiefer Lungengangran mit Spirillen und Spirochäten, Penphigus, Plaut-Vicentische Angina

Neobigrol

Packung mit 20
40 Tabletten

Zusammensetzung: 10% Bismut. subsal. levis puriss. $CH_3(OH)COOB_{10}$ OL. ped. tauri puriss. steril.

Anwendungsgebiet: Laes aller Stadien, Angina, Lup. erythem.

Neo-Insulin-Degewop

Dose mit etwa
Inhalt
Flasche zu 250

Gegen Diabetes mellitus, Depot-Insulin mit eiweißfreiem, körpereigenem Depot-Prinzip.

Neo-Pyocyanase

3 und 24 Amp
2 ccm

Enthält die proteo und bacteriolytischen Enzyme verschiedener Pyocyanus-Kulturen.

Anwendungsgebiet: Gegen entzündliche Erkrankungen der oberen Luftwege, speziell Anginen.

Neospiran *Leinwand*

Stärke I = 3, 12
Ampullen zu 1
Stärke II = 3,
Ampullen zu 2

Zusammensetzung: Orthophthalsäure-di-diethylamid.

Dose mit 100
200 g Inhalt

Anwendungsgebiet: Analepticum für Atmung und Kreislauf.

Atmungsstimulans: Alle Zustände von Bewußtlosigkeit, Collaps, Koma, Atemlähmung.

Kreislauf-tonicum: Infektionskrankheiten, Pneumonien.

Ampulle mit etwa
0,3 - 0,45 - 0,6 g

Flasche zu 15 und
100 ccm

Flasche zu 10 ccm mit
400 Einheiten

Flasche zu 15 und
50 ccm

3 Ampullen zu 2 ccm
2 Ampullen zu 20 ccm
3 Ampullen zu 0,5
ccm
10 Tabletten und
10 ccm Tropfen

Nephro-Myrmecan

Arzneisäure in steriler wässriger Lösung.
Anwendungsgebiet: akute und chronische Nieren-
erkrankungen, und zwar gichtische Schrumpfnieren,
Nephrolithiasis, Nephrosen und diffuse Nephritiden.

Neutralon

Aluminiumnatriumsilikat.
Anwendungsgebiet: Zur Behandlung von Hyper-
acidität, Hypersekretion, Ulcus ventriculi und duodeni.

Neutralon c. Belladonna

Aluminiumnatriumsilikat mit einem Zusatz von 0,6%
Extr. Bellad.
Anwendungsgebiet: Wie Neutralon.

Nicodon

Zusammensetzung: Bestehend aus Natriumsalz der
reinen kristallisierten Nikotinsäure.
Anwendungsgebiet: Bei allen peripheren Durch-
blutungsstörungen und vielen ihrer Folgeerscheinungen,
wie Gangrän, Erfrierungen, Sklerodermie usw.

Nitroangin-Kapseln

Zusammensetzung: Jede Kapsel enthält 0,2 Pflanz-
öl (hochraft. Mohnöl oder Sonnenblumenöl) oder
Paraffinum liquidum 0,8 mg Nitroglycerin gelöst.
Anwendungsgebiet: Angina pectoris.

Nitroangin-Tabletten

Zusammensetzung: Alkohol, Nitroglycerin.
Anwendungsgebiet: Koronarkrampf, spastische
Muskeln, Hypertonie usw.

3, 6 und 10
Tabletten zu 100 mg

Noviform-Augensalbe

Zusammensetzung: Tetraäthylbrenzkatechinwisumut
Anwendungsgebiet: 5%iges Präparat speziell für
ophthalmologische Zwecke, indiziert bei Conjunctivitis
Iridopharitis, Ulcus corneae, Ekzemen.

5- und 50-g-Pak-
kungen

Packung zu 50 g

Oestrasid und Oestrasid forte

Zusammensetzung: Oestrasid enthält als Wirkstoff
das synthetische Oestrogen 3,4-Di-(p-Oxyphenyl)-hexa-
dien-2,4. in Form des Diazetates.

20 Tabletten zu 0,2 mg
forte: 20 Tabletten zu
0,5 mg

Packung zu 50 g

Anwendungsgebiet: Genitale Hypoplasie, primäre
und sekundäre Amenorrhoe, Polymenorrhoe, Dysme-
norrhoe. Arthropathien, Arthritiden, primär chron.
Polyarthritiden.

5 und 10 Ampullen
zu 10 ccm =
10 Ampullen
= 100 mg
Glas mit 10 Table-
tten zu 50 mg

Optal

Propylalkohol med. Leuna 98/100% Vol.%.
Anwendungsgebiet: Zur Desinfektion der Hände,
Instrumente des Operationsfeldes.

Flasche zu 1000 ccm

Schachtel zu 30
Tabletten

Dramid

Salicylsäureamid (C₆H₄(OH)CO NH₂).
Anwendungsgebiet: Als Antipyretikum, Analgeti-
cum und Antirheumatikum. Bei Schmerzzuständen
aller Art.

12 Tabletten zu 0,2 g
20 Tabletten zu 0,5 g

Flasche zu 100
ccm

Otalgan

absolut wasserfreie Glycerin-Lösung mit einem Zusatz
von 5% Pyrazolan phenyldimethyl. und anderen An-
ästhetika.

Packung zu 6 g

Packung zu 100
g

Anwendungsgebiet: Zur konservativen Behandlung
der akuten Mittelohrentzündung und aller Ohren-
schmerzen.

Vaopia-Wundstreupulver

Grundlage: Magnesiumsilikatkombination.
Wirkstoffe: Phenol, Campher, Alkohol nach Chlumsky,
Jod, Zinkoxyd.

Anwendungsgebiet: Zur Heilung infektiöser Gewebsprozesse, spez. zur wundreinigenden Anwendung bei septischen, chirurgischen Erkrankungen.

Varico-Calorose *Kals Chloride*

Zusammensetzung: 50- und 60%ige Invertzuckerlösung.

Anwendung: Zur Verödung von Varicen und Hämorrhoiden.

Varicocid *Sehe*

Zusammensetzung: 5- und 10%ige Lösung der Natriumsalze bestimmter Fettsäuren des Lebertrans zur Verödung von Varicen, Hämorrhoiden, Hämangiomen.

Vasenol-Brandbinde *Vasenol*

Der schmerzlindernde Deck- und Heilverband bei Verbrennungen 1. und 2. Grades.

Vasenol-Tamponadestreifen

Nach submukösen Septumresektionen, Konchotomie, Polypenentfernungen, Nebenhöhlenoperationen.

Vasenol-Wund- und Kinder-Puder

Zur Pflege der kindlichen Haut. Therapie des Wundschins, Decubitus-Prophylaxe.

Vaseline pharmazeutisch DAB 6 und Augenvaseline weiß

Dose mit 15, 50, 500 g

5 Ampullen 10 cm

3 und 5 Ampullen zu 3,3 ccm und 5,5 ccm - 5%

3 und 5 Ampullen zu 1,1 ccm, 3,3 ccm und 5,5 ccm 10%

1 m lang, 10 cm br.
2 m lang, 10 cm br.
4 m lang, 10 cm br.

Packung zu 2 cm br., 1,5 m lang
4 cm br., 1,5 m lang
1 cm br., 4 m lang

Streudose zu 100 g

Abpackung n. Wunsch

Vermicur-Wurmkur

Zusammensetzung: Thymol, Oleum Thymi und Aluminium subacetatum basisch.

Anwendungsgebiet: Zur Bekämpfung der Madenwürmer.

Viperin

1 ccm = 0,1 mg Vipera-berus-Toxin.

Anwendungsgebiet: Zur subkutanen Therapie allergischer, neuralgischer und rheumatischer Erkrankungen.

Viperol

Zusammensetzung: Toxin der Vipera berus, Extr. form., Acid. salicylic., Ol. aeth., Emulgator.

Anwendungsgebiet: Vorzügliches Mittel gegen Rheuma, Ischias, Arthrosis, Arthritiden.

Vipracutan

Zusammensetzung: Aus Toxinen verschiedener Giftschlangen, im besonderen Gift der Balkan Sandvipere sowie Salicylsäuremethylester und Campher in Emulsionsform.

Anwendungsgebiet: Bei Rheuma aller Formen, Neuralgien, besonders Ischias, Arthriden, Arthropathien.

Viprasid

Zusammensetzung: Viprasid ist eine sterile, konservierte wäßrige Lösung verschiedener Viperintoxine.

Anwendungsgebiet: Rheumatismus musculorum, Myalgia capitis, Myalgia lumbalis, Arthrosis derformans.

Vitaferro-Dragees

Zusammensetzung: Ferrum sulf. oxydulat ammon 0,125, Ascorbinsäure 0,010, Sacch. lact. und Füllstoffe.

Anwendungsgebiet: Gegen Blutanomalien und Folgezustände.

Inhalt in einer Packg.
12 Zäpfchen,
12 Kapseln,
1 Salbenstift

5 Ampullen zu 1 ccm

Flasche zu 30 und 50 ccm

Flasche mit 30 und 50 g

5 Ampullen zu 1 ccm
Ampullenflasche zu 5 ccm

Packung mit 40 Dragees

Vitamin B₁ *Sehe*

Findet Anwendung bei Beriberi, Polyneuritiden verschiedener Art, Cholera, Neuralgien usw.

5 Ampullen zu 1 ccm
0,005
forte - 0,025

Vitamin C *Jenaplast*

Ascorbinsäure.

Anwendungsgebiet: Bei Skorbut, Infektionskrankheiten.

5 Ampullen zu
2,2 ccm 5%

Wirgoplast

Verbandpflaster.

Auf Wunsch steht
Sonderliste zur Verfügung

Wismusan oleosum *Dr. hydric*

Hochdisperse ölige Suspension mit 0,05 g Bi/ccm und forte 0,1 Bi/ccm.

Originalpackungen
mit 15, 30 und 90 ccm

Anwendungsgebiet: Intramuskulär zur Behandlung der Laes aller Stadien und der Framboesie. Zur Wismuttherapie der Angina, des Lupus erythematodes und anderer auf Wismut ansprechender Hautkrankheiten.

Xifal-Milch *Lachs, Serum Kevik*

Zusammensetzung: Fettfreie Milch mit dosiertem Bakterieneiweiß.

6 Ampullen zu 2 ccm
6 und 24 Ampullen
zu 5 ccm

Anwendungsgebiet: Zur Reiztherapie der Epilepsie, Myokarditis, Poliomyelitis a. ac. inf., Encephalitis, lethargica und anderer Abbaufkrankheiten des zentralen Nervensystems.

Auf Wunsch stehen Sonderlisten für homöopathische Erzeugnisse zur Verfügung.

Seren - Impfstoffe
Tuberkulin - Tuberkulinsalbe

Coliperin-Serum

Spezif. Coliantitoxin, ohne Phenolgehalt, vom Rind zur Behandlung der Peritonitis diffusa et circumscripta (insbesondere Colityphus) Prophylaktisch bei Darmoperationen jeder Art. Bei allen Coliinfektionen: Coliabszesse, Colimetritis.

Ampulle mit 20 ccm

Diphtherie-Nativtoxoid Asi

Herstellung: Toxin aus flüssigen Kulturen stark toxinbildender Diphtheriestämme, durch wiederholtes Aussalzen gereinigt, durch Formol in die ungiftige Toxoidform überführt, mit 0,3% Phenol konserviert.

Ampullenflasche
zu 3 ccm

Anwendungsgebiet: Gereinigtes, nicht adsorbiertes Diphtherietoxoid zur Serum-Toxoid-Therapie der Diphtherie, zur Behandlung diphtherischer Lahmungen, zur Diphtherie-Schutzimpfung Erwachsener und zur Feststellung der Diphtherie-Immunitätslage nach Moloney.

Diphtherie-Serum

Herstellung: Durch Impfung von Pferden, Rindern und Hammeln mit steigenden Dosen von Diphtherietoxoid und Diphtherietoxin. Konservierung mit 0,5% Phenol.

Ampullen zu
8 ccm 4 000 AE
6 ccm 6 000 AE
10 ccm 10 000 AE
sämtlich vom Pferd
Ampulle zu
10 ccm 1 000 AE
vom Rind
Ampulle zu
10 ccm 2 000 AE
10 ccm 4 000 AE
vom Hamme

Anwendungsgebiet: Antitoxisches Immunserum zur passiven Schutzimpfung sowie zur Simultan- und Heilimpfung.

Diphtherie-Toxoid

Herstellung: Toxin aus flüssigen Kulturen, durch wiederholtes Aussalzen gewonnen, durch Formol entgiftet, an Aluminiumhydroxyd adsorbiert, konserviert.

Anwendungsgebiet: Diphtherietoxoid-Aluminium-Depotimpfstoff zur aktiven und simultanen Schutzimpfung.

2 Ampullen zu 0,5 ccm
Ampullenflasche zu 25 ccm

Erysipeloid-Serum

Gewinnung: Das Serum wird von Schweinen gewonnen, die die mit Rotlaufbakterienkulturen der 3 serologischen Varianten A, B und N hyperimmunisiert wurden.

Anwendungsgebiet: Antifektiöses Schweinerotlaufserum ad.us.hum., gegen Erysipeloid, den durch Schweinerotlauf und Muriseptikumbakterien verursachten Stäbchenrotlauf.

1 Ampulle zu 10 ccm

Gonasid

Herstellung: Gonasid wird unter Verwendung mehrerer möglichst frischer Gonokokkenstämme aus akuten Gonorrhoeefällen hergestellt. Die Gonokokken werden auf geeigneten Agarnährböden gezüchtet, mit physiologischer Kochsalzlösung abgeschwemmt und das Konzentrat mit Formol sterilisiert.

Anwendungsgebiet: Polyvalente Gonokokkenvakzine mit 100 Millionen Keimen/ccm zur Provokation bei der Kontrolle des Behandlungserfolges.

Ampullenflasche zu 5 ccm

Meningokokkenserum

Polyvalent, antiinfektiös. Injektion., intramuskulär, intravenös oder intralumbal bzw. intraventrikulär je nach Lokalisierung der Erkrankung.

Ampulle zu 10 ccm
Ampulle zu 20 ccm

Milzbrand-Serum

Herstellung: Milzbrandserum wird durch Hyperimmunisierung von Pferden mit einer Vielzahl von Stämmen des Milzbrandbazillus gewonnen, wobei zuerst Abschwemmung abgetöteter Kulturen, dann lebende Bazillen in steigenden Dosen injiziert werden. Konservierung mit 0,5% Phenol.

Anwendungsgebiet: Antifektiöses Immunserum zur Serumtherapie des Milzbrandes.

1 Ampulle zu 10 ccm
1 Ampulle zu 20 ccm vom Pferd, Hammel und Rind

Peritonitis Serum vom Pferde

Polyvalentes Coli-Gasbrand-Antitoxin, enthält 2000 Einheiten Perfringens-Antitoxin und 30.000 Einheiten Coli-Antitoxin in 20 ccm, gegen alle Peritonitis-us-Fälle, bei denen eine Coli-Gasbrandinfektion nachgewiesen ist oder wahrscheinlich ist.

Ampulle zu 20 ccm
Ampulle zu 50 ccm

Pyolysin

Herstellung: Entkeimtes, entgiftetes und konserviertes (0,5% Phenol) Filtrat von Bouillonkulturen verschiedener Staphylokokken-, Streptokokken-Koli und Pyocyanium-Stämmen.

Anwendungsgebiet: Gegen Wundinfektion, Osteomyelitis, Furunkel, Hidraenitis, Follikulitis, Erysipel, Impetigo contagiosa, Pemphigoid, Ekthyma.

Ampullenflasche zu 20 ccm
5 Ampullen zu 20 ccm Flasche mit 100 ccm

Pyrasid

Herstellung: Pyrasid wird aus einem mit besonderen biochemischen und serologischen Eigenschaften ausstatteten Typhus-Bakterienstamm hergestellt. Pyrasid enthält 100, Pyrasid forte 500 Mill. Keime im ccm. Konservierung 0,5% Phenol, staarisch und klinisch auf die Verträglichkeit und auf zuverlässig steuerbare Nebenwirkung geprüft.

Pyrasid einfach 100 Mill. Keime/ccm
Pyrasid forte 500 Mill. Keime/ccm
5 und 50 Ampullen zu 1 ccm

Anwendungsgebiet: Heißfieber-Vakzine gegen Lues aller Stadien, Polyarthritiden, chron. Neuralgien und Neuritiden, chron. Endometritis, Parametritis und Salpingitis.

Rotlauf-Serum *Sächs.*

Human, staatlich geprüft

Ruhrserum *Sächs.*

Antitoxisch, antiinfektiös, prophylaktisch

Scharlach-Serum *Sächs.*

Bakterizid, antitoxisch und hochkonzentriert.

Serumgrundstoff (Aluminiumhydroxyd) *in 100 mg Packung*

Staphylokokken-Serum *Sächs. Serum*

Polyvalent.

Staphylostromin *Asid Serum*

Herstellung: Aus zahlreichen, frischen, stark pathogenen Stämmen des Staphylokokkus aureus der S-(Giatt)-Form. Mit 0,5% Phenol konserviert.

Anwendungsgebiet: Gegen Furunkulose, Akne, Impetigo contagiosa, staphyloc. Folliculitis barbae, Osteomyelitis, Fistein und Phlegmonen mit vorwiegender Staphylokokkenflora u.a. subakute bis chronische Staphylokokkeninfektionen.

Testseren A, B und O *Asid Serum*

Herstellung: Die Testseren werden von Menschen mit besonders hohem Agglutinationstiter, keimfrei gewonnen und mit 0,5% Phenol konserviert.

Anwendungsgebiet: Diagnostische Seren zur Feststellung der Blutgruppenzugehörigkeit von Bluttransfusionen und zur Vaterschaftbestimmung.

Tetanus-Serum

Ampulle zu 10 ccm
Ampulle zu 20 ccm

Herstellung: Von Pferden und Rindern durch Grundimmunisierung mit Tetanoxoid und Hyperimmunisierung mit Tetanustoxin. Konserviert mit 0,5% Phenol.

Tetanus-Serum vom Pferd
Ampulle mit 5 ccm = 3000 AE
3 ccm = 3000 / E
25 ccm = 15000 AE vom Rind
10 ccm = 3000 AE

Ampulle zu 10 ccm
4000 E
Ampulle zu 20 ccm
8000 E

Anwendungsgebiet: Zur Schutzimpfung bei Tetanusgefährdeten Verletzungen, Verwundungen und Verbrühungen sowie zur Heilbehandlung bei Tetanus.

Tetanoxoid

Ampulle zu 10 ccm

Herstellung: Zuchtung stark toxinbildender Tetanusbazillenstämmen auf flüssigen Spezialnährböden, Reinigung und Konzentrierung durch wiederholtes Aussalzen und Dialysieren, Entgiftung mit Formalin, Adsorption des hierdurch entstehenden Tetanusformoltoxoids an Aluminiumhydroxyd und Konservierung mit 0,3% Phenol.

2 Ampullen zu 1 ccm
Flasche zu 25 ccm

Abpackung n. Wund

Anwendungsgebiet: Zur aktiven und aktiv-passiven Schutzimpfung und neben antitoxischen Serum zur Heilbehandlung bei Tetanus.

Ampulle zu 10 ccm
Ampulle zu 20 ccm

Tuberkulin

5 Ampullen zu 1 ccm mit 50, 100, 200, 300 und 500 Mill. Keim je ccm

Herstellung: Tuberkulin ist ein Gemisch aus Alt-tuberkulin und Bovotuberkulin. Es ist mit 0,3% Phenol konserviert.

3 Ampullen zu 1 ccm
Ampulle zu 5 ccm
Ampulle zu 10 ccm

1 Ampulle zu 5 ccm mit 500 Mill. Keim je ccm

Anwendungsgebiet: Zur Diagnose und Therapie.

Tuberkulin-Salbe

Packung zu 3 Fläschchen à 1 ccm A, B und 1 O Satz mit 5 Kapillartestserum A, B

Herstellung: Tuberkulinsalbe enthält in einer fettreichen, leicht einzureibenden Salbengrundlage Tuberkulin, ein Gemisch aus staatlich geprüfem Alt-tuberkulin und Bovotuberkulin.

Tube zu 3 und 10 g

Anwendungsgebiet: Fettfreie Salbe aus Alt-tuberkulin, leicht einzureiben, klinisch auf Antituberkulosegefahr geprüft zur Perkutanprobe nach Moro.

Tussitropin forte

Herstellung: Aus differenzierten, toxischen Keuchhustenstämmen der S-Form. Vermehrung auf serumhaltigen Spezialnährböden, Abschwemmung mit physiologischer Kochsalzlösung, Entgiftung der Endotoxine mit Formol, Zugabe eines Lipoidextraktes auf fetalen Organen.

Anwendungsgebiet: Polyvalente Keuchhustenvakzine mit 20 Milliarden Keimen/ccm und immunisationsfördernden Organextrakten zur Schutz- und Heilimpfung bei Keuchhusten.

Typhus-Paratyphus B-Impfstoff

Herstellung: Zahlreiche Stämme der zwei Bakterienarten verschiedener geographischer Herkunft, sorgfältig nach ihren biochemischen und serologischen Eigenschaften ausgewählt, werden auf Agar vermehrt, die Rasen mit 0,5%iger Phenol-Kochsalzlösung abgeschwemmt und bei 56° C abgetötet.

Anwendungsgebiet: Polyvalente Typhus-Paratyphus-B-Vakzine zur Schutzimpfung gegen Abdominaltyphus und Paratyphus B.

Ampullenflasche zu 3 ccm

3 Ampullen zu 1 ccm
Flasche zu 100 ccm

Tierarzneimittel

I. Teil Sera, Impfstoffe, Tuberkuline

Abortus-Bang-Lebendimpfstoff

Abschwemmung: Keimbahnimpfung von geschlechts- schwach virulenter *Brucella abortus* Stamm auf physiologischer Kochsalzlösung, Entgiftung durch amtlicher Verschrift, staatlich kontrolliert, einjährig haltbar.

5 Ampullen 5 ccm
1 Ampulle zu 20 ccm

Anwendungsgebiet: Zur Schutzimpfung der 5-12 Monate alten weiblichen Kühe und bis 6 Monate alten männlichen Zuchtschweinen in verseuchten Beständen.

Abortus-Chinosol-Vakzine

Polyvalente Vakzine aus Keimbahnimpfungsvakzine von *Brucella abortus*-Bang-Stämmen mit Chinosol unter größtmöglicher Schonung der schützenden Wirkung sterilisiert und konserviert, einjährig haltbar.

Flasche zu 100 ccm

Anwendungsgebiet: Zur Schutzimpfung in verseuchten Beständen.

Avisana

Trockenimpfstoff aus Taubentuberkulosematerial. Ein Jahr haltbar.

Packung mit 0,05 g
Impfstoff = 45 Dosen
und 3 ccm Verdün-
nungsflüssigkeit

Anwendungsgebiet: Zur Schutzimpfung gegen Pocken und Diphtherie von Tauben, Truthühnern, Peruhühnern, Pfauen, Fasane, sowie in gesunden Beständen, sowie Notimpfung in allen Geflügel in frisch verseuchten Beständen.

Borna-Schutzimpfstoff

Trockenimpfstoff aus Kaninchenhirnpassagevirus, zwei Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur aktiven Immunisierung gegen Meningo-Encephalomyelitis (Bornasche Krankheit) der Pferde und Schafe.

Packung zu 1 g mit 10 Pferdedosen = 60 Schafedosen und 100 cem Verdünnungsflüssigkeit

Bradsot-Formol-Vakzine

polyvalenter, durch Formol sterilisierter und entgifteter, konservierter Impfstoff aus einer Vielzahl von Kulturen der Bac. Gigas und Novy, zwei Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur Schutzimpfung in verseuchten, zur Zeit der Impfung aber seuchenfreien Beständen.

Flasche mit 100 cem

Chinotropin

spezifisch-unspezifisch Antigen, polybakterielle Vakzine mit immunisationsfördernden Organextrakten, steril, konserviert, zwei Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur spezifisch-unspezifischen Umstimmungstherapie (unspez. Reiztherapie).

Flasche zu 100 cem

Fohlenruhr-Fohlenlähme-Serum

polyvalent und gegen die hauptsächlichsten Erreger der Fohlenruhr und der Fohlenlähme gerichtet.

Ampulle zu 20 cem
Flasche zu 100 cem

Fohlenruhr-Fohlenlähme-Vakzine

polyvalent, enthält Bact. coli, Bact. paratyphi abortus equi, Bact. pyosepticum viscosum und Streptokokken.

Anwendungsgebiet: Zur Schutzimpfung gefährdeter Fohlen 5 Wochen vor der Geburt und der

Ampulle zu 10 cem
Ampulle zu 20 cem

Geflügelcholera-Serum (Pasteurella-Serum)

polyvalentes, durch Immunisierung von Pferden mit Stämmen des Geflügelcholera-Bakteriums (Pasteurella aviseptica) gewonnenes Serum, steril, konserviert. Mindestwertigkeit 1:100. Zwei Jahre haltbar. Anwendungsgebiete: Zur aktiven Schutzimpfung an Ausstellungs- und Mastgeflügel. Zur Notimpfung gesunden Geflügels in verseuchten Beständen. Zur Heilimpfung bei erkranktem Geflügel.

Flasche mit 50 cem

Geflügelcholera-Vakzine (Pasteurella-Vakzine)

polyvalente Vakzine aus einer Vielzahl von Stämmen des Geflügelcholera-Bakteriums (Pasteurella aviseptica), durch Formol sterilisiert, frei von andersartigen Bakterien, konserviert, zwei Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur aktiven Schutzimpfung in verseuchten Beständen und zur simultanen Notimpfung gesunden Beständen bei gesunden Tieren.

Flasche mit 50 cem

Geflügelpest-Schutzimpfstoff

geflügelpestvirushaltige, künstlich inhierte Hühnerembryonen, nach dem Verfahren von Traub feinstens zerrieben, an Aluminiumhydroxyd adsorbiert und mit Formalin inaktiviert, staatlich geprüft. Eintritt der Immunität etwa 14 Tage nach der Impfung. Haltbarkeit ein Jahr.

Flasche mit 100 cem

Anwendungsgebiet: Zur aktiven Schutzimpfung in verseuchten, aber noch seuchenfreien Geflügelbeständen.

Geflügeltuberkulin

aus Züchtung von Geflügeltuberkelbakterien und Reinigung der Kulturen auf EMB das Ursprungsvolumen gewonnen, steril, konserviert. Haltbarkeit im unverseuchten Zustand fünf Jahre.

Flasche mit 1 cem

Flasche mit 5 cem

Anwendungsgebiet: Zur Tuberkulinisierung des Geflügels. Zur Tuberkulinisierung von Rindern, Pferden, Schweinen und anderen Säugetieren bei Verdacht auf Tuberkulose. Zur Diagnose der Tuberkulose der Rinder und Schafe.

SECRET
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

Hippocamp-Serum

Multipartiales, von Pferden durch Immunisierung mit Kulturen von Streptokokken, Bact. pyosepticum viscosum, Bact. coli und Bact. paratyphus abortus equi gewonnenes Immunserum, steril, konserviert, fünf Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur passiven Schutzimpfung der Mutterstuten und zur Schutz- und Notimpfung gefährdeter Fohlen. Desgleichen zur Heilimpfung erkrankter Fohlen.

Hippocamp-Vakzine

gegen Fohlenaufzuchtcrandheiten. (Siehe Hippocamp-Serum.)

Anwendungsgebiet: Zur aktiven Schutzimpfung der Mutterstuten, sowie Notimpfung gefährdeter Fohlen.

Rechtshamerum gegen Maul- und Klauenseuche

Rechtshamerum

Rechtshamerum

zur Schutz- und Heilimpfung vorwiegend gegen Infektionen.

Rechtshamerum

Vorbereitung der passiven Immunisierung und zur Schutzimpfung trächtiger Stuten 4 Wochen vor der Geburt.

Wichtigsteigenschaften.

Flasche mit 100 ccm

5 Ampullen zu 10 ccm

5 Ampullen zu 20 ccm

Flasche zu 100 ccm

Abfüllung n. Wunsch

Abfüllung n. Wunsch

Ampulle zu 20 ccm

Flasche zu 100 ccm

Ampulle zu 10 ccm

Ampulle zu 10 ccm

Ampulle zu 20 ccm

Flasche zu 100 ccm

Wirkstoff gegen Aktinobakterien, Bact. pyosepticum viscosum, Bact. coli, Bact. paratyphus abortus equi, Saprophyten und andere Mikroorganismen, konserviert, zweifach haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur Heilimpfung von Maul- und Klauenseuche und Stauungskehlentzündung bei Paratuberkulose.

Maul- und Klauenseuche-Vakzine

Rechtshamerum

gegen Maul- und Klauenseuche durch Immunisierung von Pferden und Fohlen mit einer Vielzahl von Milzbrandstämmen gewonnenes Immunserum, unschädlich, konserviert, fünf Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur Notimpfung tiererkrankter Bestände und zur Heilimpfung von Tieren.

Milzbrand-Rauschbrand-Formol

ist eine durch Formol sterilisierte und konservierte Vakzine aus Kulturen einer Vielzahl von Pararauschbrand-Bacillus (Bact. edwardsii) und Rauschbrand-Bacillus (Bact. anthracis Chauveaux) durch Formol sterilisiert, frei von andersartigen Mikroben, zwei Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur aktiven Schutzimpfung von Pferden gegen Milzbrand und Rauschbrandinfektionen. Die Impfung ist zu jeder Zeit der Impfung aber senken.

Flasche mit 100 ccm

Abfüllung n. Wunsch

Flasche mit 5 ccm
Flasche mit 100 ccm

Flasche zu 100 ccm

ORIGINALS ONLY

Pararanschbrand-Serum

Das Pararanschbrand-Serum wird durch Immunisierung von Rindern und Pferden mit Pararanschbrand-Bazillen und deren Toxinen hergestellt. Es ist auf Hochwertigkeit, Sterilität und Unschädlichkeit geprüft und mit Phenol konserviert, fünf Jahre haltbar. Kurzfristiger Impfschutz mit sofort einsetzender Wirkung ist angezeigt bei akuter Infektionsgefahr und bei Infektionsverdacht, also bei empfänglichen Tieren gefährdeter Bestände vor Geburten, vor Operationen und nach Verletzungen. Impfschutz etwa 14 Tage.

Anwendungsgebiet: Zur Schutz- und Notimpfung, zur Heilimpfung.

Flasche mit 100 ccm vom Rind
Flasche mit 100 ccm vom Pferd

heraus aus 100 ccm Schweinen auf geprüfte Keimzahl und Bakterienstammenspezifität geprüft. Serum haltbar 14 Tage. Wirkt gegen Bakterien, 47 Tage haltbar. Anwendungsgebiet: Zur simultanen Schutzimpfung gegen Schweinerotlauf nach Lorenz und zur Nachimpfung vorausgegangener Simultanimpfung.

Rauschbrand-Serum

polyvalentes, durch Immunisierung von Rindern mit einer Vielzahl von Stämmen des Bact. sarcophysematos. Foth-Chauveaux hergestelltes Immunsorium, steril, konserviert, fünf Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur Not- und Heilimpfung bei infektionsverdächtigen, fiebernden und offensichtlich erkrankten Tieren (hier neben chirurgischer und symptomatischer Behandlung).

Flasche zu 100 ccm

Serum vom Schwein

heraus durch Immunisierung von Schweinen mit einer Vielzahl von Rotlauf-Bakterienstämmen hergestelltes Immunsorium, steril, auf Schweinen auf Vertragstierwertigkeit (1000 IF ccm) geprüft, artimmunsorium besonders bei der Heilimpfung ein Jahr haltbar.

Flasche zu 50 ccm

Anwendungsgebiet: Zur simultanen Schutzimpfung gegen Schweinerotlauf nach Lorenz. Zur Notimpfung bei Ausbruch von den nicht fiebernden Tieren. Zur Heilimpfung bei erkrankten Schweinen.

Rauschbrand-Formol-Vakzine

polyvalente, durch Formol sterilisierte und entgiftete Vakzine aus einer Vielzahl von Stämmen des Bact. sarcophysematos. Foth-Chauveaux, frei von andersartigen Mikroben, steril, zwei Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur aktiven Schutzimpfung in gefährdeten, zur Zeit der Impfung aber seuchenfreien Beständen.

Flasche zu 100 ccm

Mastitis-Vakzine

Die Vakzine aus dem Micrococcus mastidis ovis, dem Bact. ovium Dammann aus erkrankten Eutern stammenden Staphylococcus Diplokokken, Streptokokken und Kolibakterien, steril, zwei Jahre haltbar.

Flasche zu 100 ccm

Anwendungsgebiet: Zur Schutz- und Notimpfung in gefährdeten Beständen.

Septikämie-Serum

heraus durch Immunisierung von Rindern mit einer Vielzahl von Schafseptikämie (Pasteurella ovis) Bakterienstämmen hergestelltes Immunsorium, konserviert, fünf Jahre haltbar.

Flasche zu 100 ccm

Anwendungsgebiet: Zur Notimpfung gesunder Lämmer in verseuchten Herden und zur Heilimpfung erkrankter Schafe und Lämmer.

Schafseptikämie-Vakzine

polyvalentes, aus einer Vielzahl von Schafseptikämie (Pasteurella ovisepitium) Bakterienstämmen hergestellte Vakzine, konserviert, frei von andersartigen Bakterien, zwei Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur aktiven Schutzimpfung gefährdeter Bestände.

Schweine-Rotlauf-Konzentrat-Vakzine

Suisan

gegen Ferkelaufzuchtkrankheiten (Bronchopneumonien, Durchfälle, Ekzeme, Lebensschwäche, Entwicklungsstörungen), Serovakzine mit Antikörpern und Antigenen der Erreger bzw. Sekundärerreger von Ferkelaufzuchtkrankheiten (Streptokokken, Pasteurella suisepitium, Coli- und Paratyphus-Bakterien), steril, zwei Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur Schutzimpfung der Muttertiere in stationär verseuchten Beständen. Zur Schutzimpfung der Neugeborenen und zur Schutz- und Heilimpfung der Läufer und älteren Ferkel.

Tetanus Serum ad us. vet.

polyvalentes, durch Immunisierung von Pferden mit Tetatoxid und Tetanistoxin gewonnenes antitoxisch wirksames Immunserum, steril, Mindestwertigkeit 600 Antitoxineinheiten in 1 ccm, fünf Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur passiven Schutzimpfung vor Operationen (niedrige Dosierung) und nach Verletzungen (höhere Dosierung), zur simultanen Schutzimpfung bei schweren Verletzungen mit voraussichtlich längerer Heilungsdauer, zur Heilimpfung nach Ausbruch von Tetanus.

Tetatoxid

gereinigtes, an Aluminiumhydroxyd gebundenes Tetanusformoltoxoid, steril, fünf Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur aktiven Schutzimpfung in tetanisgefährdeten Betrieben und Gegenden und zur simultanen Schutzimpfung bei schweren Verletzungen mit voraussichtlich längerer Heilungsdauer.

Flasche zu 100 ccm

Abfüllung n. Wunsch

Flasche zu 100 ccm

Flasche zu 500 ccm

Ampulle mit 5 ccm

= 3 000 AE

Flasche mit 25 ccm

= 15 000 AE

Flasche mit 50 ccm

= 30 000 AE

Flasche mit 100 ccm

= 60 000 AE

Ampulle mit 5 ccm

Flasche mit 50 ccm

Flasche mit 100 ccm

Tubulin ad. us. vet. 50prozentig

Züchtung von Rinder- und Menschentuberkulosen und Einengung der Kulturen auf 1/10 des Ausgangsvolumens gewonnen, steril, konserviert, mit 10 Teilen Phenol-Kochsalzlösung verdünnt, fünf Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur Intrakutan-Intralpebralanalyse beim Rind und zur Subkutanprobe bei Rindern und Schweinen, Schafen, Ziegen, Hunden, Katzen und Affen.

Widder-Serum

gegen Kälberaufzuchtkrankheiten (Kälberruhr, Kälberparatuberculose, Kälberlähme) multipartiales, polyvalentes Serum, gewonnen durch Immunisierung mit Stämmen des (Pasteurella) vitulisepticum, des Bact. coli, des (Salmonella) Enteritis Gärtner und Breslau und des (Streptococcus) abortus abortus gewonnenes Immunserum, steril, fünf Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur passiven Schutzimpfung von Muttertieren und zur simultanen Schutz- und Notimpfung der Jungtiere. Zur Heilimpfung bei erkrankten Kälbern.

Widder-Vakzine

gegen Kälberaufzuchtkrankheiten (Kälberruhr, Kälberparatuberculose, Kälberlähme) multipartiale, polyvalente Vakzine aus einer Vielzahl von Stämmen des Bact. vitulisepticum, des Bact. coli, des Bact. (Salmonella) Enteritis Gärtner und Breslau und des (Streptococcus) abortus abortus mit Formol sterilisiert und erdfrei von andersartigen Keimen, zwei Jahre haltbar.

Anwendungsgebiet: Zur aktiven Schutzimpfung der Muttertiere und zur simultanen Schutz- und Notimpfung der Kälber.

Flasche mit 1 ccm
Flasche mit 5 ccm
Flasche mit 10 ccm

Flasche mit 100 ccm

5 Ampullen zu 10 ccm
5 Ampullen zu 20 ccm
Flasche zu 100 ccm

II. Teil Pharmazeutische Heilmittel Organpräparate und Schlangengiftpräparate

Adrenasid

razem. Adrenalin-Injektionslösung 1:600, wirkungsmäßig entsprechend links-Adrenalin-Injektionslösung 1:1000, gegen innersekretorische Störungen z. B. Rachitis, Osteomalacie, Kümern, Wolefressen und Lecksucht, gegen bestimmte Sterilitätsformen zur Stillung innerlicher Blutungen und Therapie bei blutigen Harn und blutiger Milch.

5 Ampullen zu 1 ccm

Afarom

Stomachikum, Roborans und Plastikum, Basisbehandlungsmittel bei Sterilität. Weißes mittelfeines Pulver aus Kalziumphosphat, Kalziumkarbonat, Arsen (0,01%), feinst verteiltem metallischen Eisen und Kupfer sowie Geschmackskorrigentien.

Packung zu 500 g

Anwendungsgebiet: Gegen Erschöpfungen, Unternahrung, Kräfteverfall, Blutarmut nach Blutverlusten und nach Perioden unzureichender Fütterung. Ferner bei Aufzuchtkrankheiten der Schweine sowie bei Durchfällen der Pferde und Fohlen bei Aufnahme von kaltem Wasser.

Analept

Analeptikum und Exzitans für die Herz-, Kreislauf-, Atmungs- und Nerventätigkeit.

5 Ampullen zu 5 ccm

Eine sterile, haltbare Lösung von 0,1 Ephedrinhydrochlorid, 0,002 Strychninnitrat und 0,0005 g r-Adrenalin.

Anwendungsgebiet: Findet Anwendung bei Erster Erschöpfung, Festliegen vor und nach Schweregeburten, Gebärmutterkoma, Herz- und Kreislaufschädigungen bei Infektionskrankheiten sowie bei Asphyxie und Lebensschwäche der Fohlen und Kälber.

Alginon

Stimulierende, zerteilende Salbe gegen Phlegmen und chronische Entzündungen. Bestehend aus Kampfer und Terpenen in gut streichfähiger leicht resorbierbarer Salbengrundlage.

Packung mit 100 g

Anwendungsgebiet: Gegen Einschub, andere Zellentzündungen, Drüenschwellungen bei Drüsenentzündungen, chronische Euterentzündungen sowie zur Vorbehandlung bei Abszessen, Furunkeln und Karbunkeln.

Antim

Antimittel für Pferde.

Flasche zu 200 g

Antisept

Antiseptikum. Bestandteile: Acid. boric. zinc. sulfuric. Desinfektantien in Grundmasse.

Packung zu 12 Stück

Antisept

Antiseptikum zur Sterilitätsbekämpfung, bestehend aus chlorierten Phenolhomologen, Saponin, elementarem Schwefel und Schwefelalkali-Verbindungen in wässriger-alkoholischer Seifenlösung.

Flasche zu 100 ccm

Anwendungsgebiet: Bei Entzündungen und Karbunkeln im Bereiche des Scheidengewölbes und Vagina, zur Erhöhung des Tonus und der Erregbarkeit der gesamten Genitalsphäre, zur anhaltend, örtlicher und gelind reizender Beeinflussung des gesamten Scheidenraumes.

Alum hydratum puriss.

Reinherbares Narkotikum zur oralen, intraabdominalen, intravenösen und rektalen Anwendung.

Flasche zu 250 ccm

Chromo-Tinktur

nicht ätzende Adstriktions-Tinktur. Eine wäßrige, grünlige Lösung von saurem Chrom und Kupfersalzen, Phenol und Malachitgrün.

Anwendungsgebiet: Zur Nabelversorgung und Nabelpflege gegen Caro luxurians, üppige Wundgranulation sowie Schürf- und Scheuerwunden. Ferner bei Pocken und Wunden an den Zitzen, nässenden Ekzemen, insbesondere der Fesselbeuge der Pferde und Rücken-ekzeme der Hunde.

Flasche mit 50 ccm

Citan

tonisierend wirksames Spezialantiseptikum gegen Magen-Darm- Infektionen, Durchfälle, Indigestion und Tympanie. Lösung von chloriertem Phenolhomologen mit Galle sowie Bitter und Würzstoffen in glycerin-spirituöser Seifengrundlage.

Flasche mit 100 g

Citosan-Blättchen

Scheideneinlagen zur antiseptischen Behandlung von Scheidenkatarrhen, zur Brunsterzeugung und Konzeptionsbegünstigung.

Packung mit 120 Stück

Colfin

sterile, konservierte, unbegrenzt haltbare Lösung von Fluidextrakten aus Flor. Chamomillae, Fol. Sennae und Rhamni Cathartica, von Thymol und geringen Mengen von Chlorbarium.

5 Ampullen zu 20 ccm

Anwendungsgebiet: Unschädliche Injektionslösung gegen Koliken der Pferde, Mekoniumverhaltung der Fohlen und Indigestionen der Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Indigestion und Trommelsucht der Kaninchen.

Colfinoral

enthält Kamillen- und Schafgarbenfluidextrakt, Thymol und Schwellwertdosen von Chlorbarium.

Flasche mit 100 g

Anwendungsgebiet: Gegen Krampfkolik (katarrhalischer Darmkrampf), Windkolik, leichtere Fälle von Verstopfungskolik, Adjuvans bei allen sonstigen Koliken.

oder mit 5% des synthetischen Kontakinsektiva Hexachlorcyclohexan (666%).

Beutel mit 100 g

Anwendungsgebiet: Ungezieferbekämpfungsmittel für Haustiere.

Colin

ölige Lösung von Salicylester, Terpenen der Terpentinöl und von Kampfer.

5 Ampullen zu 5 ccm

Anwendungsgebiet: Injektionslösung zur Erzeugung lokaler Hyperämie und Hyperlymphie gegen Euterentzündungen.

Cyan

Strychnin-Lösung.

Flasche zu 100 ccm

Anwendungsgebiet: Herz- und Kreislaufmittel, Spasmodikum. Ferner bei Infektionskrankheiten, Koma, Paresen.

Cytasid

konservierte, Injektionslösung mit 0,04 mg (Klapperschlangen) Toxin je ccm, staatlich geprüfte.

5 Ampullen zu 1 ccm Ampullenflasche mit Durchstechstopfen zu 5 ccm

Anwendungsgebiet: Schlangengiftinjektionslösung Krämpfe, speziell Kaukrämpfe bei fieberloser Myoenzephalitis der Hunde.

Colmatan

weißliche, kosmetischen Cremes ähnliche Salbe Aluminiumchlorat-Lösung in einer Spezialsalben-Base hohen Wasserverbindungsvermögens.

Packung mit 100 g

Anwendungsgebiet: adstringierende Kühlsalbe, Spezialektrol für Euterentzündungen.

Col

ölige Lösung von Eisen und Zinksalzen.

Flasche mit 100 g

Anwendungsgebiet: Gegen Fehlen oder schwaches Gelingen der Brunft bei Rindern, Schweinen und

Gastrase

Lösung von kolloidalem Silber, Kamillenextrakt und p-chlor-m-Kresol in einem als Schutzkolloid fungierenden viskösen Lösungsmittel.

Anwendungsgebiet: Bei Magen- und Darmkatarrhen, auch prophylaktisch zu verwenden.

Flasche mit 10 g

Hormal

steriler, klarer, schwach gelblich gefärbter wässriger Extrakt aus weiblichen und männlichen Sexualdrüsen.

Anwendungsgebiet: hormonal wirksame Injektionslösung gegen Fruchtbarkeitsstörungen weiblicher und gegen Potenzstörungen männlicher Haustiere.

5 Ampullen zu 20 ccm

Isocain 2prozentig

2% Isocainhydrochlorid, 0,0025% Adrenalin.

Anwendungsgebiet: sterile Injektionslösung zur Extradural und Infiltrations-Anästhesie bei allen Haustieren.

5 Ampullen zu 10 ccm

Isocain 5prozentig

5% Isocainhydrochlorid, 0,0025% Adrenalin.

Anwendungsgebiet: sterile Injektionslösung zur Lahmheitsdiagnose und Samenstranganästhesie.

5 Ampullen zu 10 ccm

Kalomel-Tabletten

Laxans, Darmdesinfiziens, Diuretikum für Pferde und Schweine sowie Hunde.

Packung à 50 Tabletten zu 2 g

Mercurobrom-Scharfsalbe 10 und 15%

mit 10% bzw. 15% Hydrargyrum bibromatum (HgBr₂)

Anwendungsgebiet: Zur Scharfsalbentherapie bei Pferden.

10% Kruke mit 50 g
15% Kruke mit 50 g

Calciumhydroxyd

feines, trockenes Pulver aus Calciumoxyd und Soda, weniger stark ätzend und hygroskopischer als Natriumhydroxyd, aus dem sich bei Aufguss in Wasser nach der Formel $Ca(OH)_2 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 + 2NaOH$ Natronlauge und Calciumcarbonat bilden. 4 Gewichtsteile Natronlauge entsprechen 1 Teil Calciumhydroxyd.

Papiersack mit 25 kg

Chromsäure-Tinktur

alkalische Lösung von Trichloressigsäure, Milchsäure, Chromsäure und Chromsalzen.

Flasche mit 50 g

Anwendungsgebiet: Ätztinktur gegen Hufkrebs, Maulwunde, Papillomatose, Panaritium.

Cyanocyanase

zur Wundbehandlung infizierter Stich- und anderer Wunden, Zungen-Ausspritzung oder Tamponade.

Flasche zu 50 ccm

Stilben

Tablette zu 0,3 g mit 0,2 mg 3,4-Di(p-Oxyphenyl)-2,4-Diazetat einer dem Stilboestrol nahe verwandten, aber stoffwechselbeständigen und daher vollwertigen Stilbenverbindung.

Glasröhre mit 30 Tabletten zu je 0,2 mg Wirkstoff

Anwendungsgebiet: peroral voll wirksames Oestrogen. 1 Tablette 0,2 mg Wirkstoff = etwa 2000 I.E., Tagesdosis 6 mg = 60 000 I.E. gegen ovarielle Sterilität, schwache oder fehlende Brunst, zur Schleimhautlockerung bei trockenen Uteruskatarrhen, gegen endokrin bedingte juckende Dermatosen und auf Hypofunktion beruhenden Haarausfall bei Hündinnen sowie Hemmung der Laktation der Sauen und Masthündinnen.

Otaigan

Absolut wasserfreie Glycerinlösung mit einem Zusatz von 5% Pyrazolon phenyldimethyl. und andere Anaesthetica.

Anwendungsgebiet: Zur konservativen Behandlung der Otitis und media und allen Ohrenscherzen bei Hunden und Kleintieren.

Panalept

sterile, haltbare, lokal gut verträgliche wäßrige Lösung von 0,1 g Benzdrinhydrochlorid, 0,002 g Strychnin-nitrat und 0,0005 g r-Adrenalin.

Anwendungsgebiet: Analeptikum und Exzitans für Herz, Kreislauf, Atem und Nerventätigkeit, Weckmittel bei Narkosen und Bewußtlosigkeit.

Paraseloyt pro injectione

klare, farblose, nicht konservierte, in sich sterile Chlorkalzium-Chlormagnesium-Lösung fraktioniert zu injizieren oder verdünnt oder mit beliebigen Mengen aqua dest. verdünnt zu infundieren.

Anwendungsgebiet: Chlorkalzium-Chlormagnesium-Injektionslösung 40:15:100 gegen Gebärmutterkoma und parese, Festliegen von Geburten, Transportkoma und parese. Weide- und Stalltetanie, Osteomalacir, Lumbago sowie Lebensschwäche der Fohlen und Kälber.

Peretan-Uterustabletten

Peretan ist ein durch ein besonderes Verfahren aufgeschlossenes Pulver aus Cortex Quercus mit gallus und gerbsaurem Kupfer. Peretan Uterustabletten bestehen aus Peretan. 30 Stück wiegen etwa 50 g.

Anwendungsgebiet: Uterus-Trockenantiseptikum gegen postpuerperale Uteruskrankheiten und Rententio

Packung zu 6 g

5 Ampullen zu 20 ccm

5 Ampullen zu 20 ccm

30 Tabletten

alkoholische, haltbare, tiefbraune, etwas gelbliche Lösung von Tinktura Gentianae und Wertdosen von Bariumchlorid.

Anwendungsgebiet: Acid-Amarum gegen Verdauungsstörungen bei Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Kaninchen.

klar, klarer, eiweißarmer, schwach gelblich gefärbter, besonderem Verfahren hergestellter haltbarer Extrakt aus Haut und Foeten mit Gehalt an Hormonen und Hautfunktionsstoffen, die bei Krankheiten substituierend, regulierend und heilend wirken.

Anwendungsgebiet: Gegen parasitäre Hautkrankheiten Ekzeme und Papillomatose.

helle, leicht bewegliche, z. Z. einen kreosolartigen Geruch aufweisende Lösung von chlorphenolhomologen in glycerin-alkoholischer Lösung nicht schmierend und fleckend.

Anwendungsgebiet: Antiseptische und antiparasitäre Hauteinreibung.

Wurmwerm

Wurmwerm ist eine wässrige Lösung von etwa 2,1% arsenicos, etwa 2,1% Kal. bicarbonic. Extr. et-Semin-Curcurbit. und Anilinfarbstoff.

Anwendungsgebiet: Spulwurm und Sklerostomen-Resolvens und Plastikum. Findet vorwiegend Anwendung als Wurmmittel für Pferde.

Flasche mit 100 g

5 Ampullen zu 5 ccm

Flasche zu 100 g

Flasche zu 100 g

Stibarsen-Tabletten

Tabletten mit etwa 2 g Gewicht; Hauptbestandteile: Ammonium chlorat, Sulfur und 0,14 g Acid. arsenic. je 1 Tablette.

Anwendungsgebiet: Expectorans und Resolvens gegen Druse, ansteckenden Katarrh der Luftwege, akute und subakute Bronchitiden und chronische Bronchitis ohne und mit Dämpfungigkeit.

Sulfopictan

hellbraune Emulsion mit 17% Holzteer und 8% feinst verteiltem Schwefel.

Anwendungsgebiet: Schwefel-Teer-Emulsion gegen chronische Ekzeme, Trichophytie und Räude.

Tetraletten

Gelatinekapseln mit einer Füllung von 1 cem (1,6 g) reinem Tetrachlorkohlenstoff.

Anwendungsgebiet: Gegen Magen- und Darmwürmer des Geflügels.

Tetrapix

braun gefärbte Lösung von 10% chloriertem Holzteer in chemisch reinem, an Pferden aus Verträglichkeit geprüften Tetrachlorkohlenstoff.

Anwendungsgebiet: Gut verträgliches Tetrapräparat gegen Gastruslarven, Strongyloiden und Ascaridenbefall der Pferde.

Thoremangan

sterile, klare, hellbraune, haltbare wässrige Lösung von 0,30% freiem Jod, 1,26% Jod, 0,16% Thorium und 0,09% Mangansalzen.

Anwendungsgebiet: Zur Behandlung frischer Druse und Pferdegrippe (ansteckender Katarrh der Luftwege), zur Umstimmungstherapie und zur Sterilitätsbekämpfung der Stuten.

Packung mit 30 Tabletten zu 2 g

Flasche mit 100 g

Packung mit 50 Stück

Flasche mit 500 cem

5 Ampullen zu 20 cem

Valneurin

trübes Bakterienautolysat im Sinne der unspezifischen Proteinkörpertherapie zur intramuskulären Behandlung bei Zuckungen und Lähmungen nach nervöser Staupe und bei sonstigen zentral bedingten Erkrankungen.

6 Ampullen zu 1 cem Serie 1, 2, und 3

Valgol

konzentrierte Lösung chlorierter Phenolhomologe in glycerin-alkoholischer Lösung, in Wasser in dem Verhältnis löslich, sich selbst braun gefärbt, stark septisch und desinfizierend.

5 Ampullen zu 20 cem

Anwendungsgebiet: Spezialantiseptikum für Spülen im Rahmen der Sterilitätsbekämpfung gegen Metritiden bei Stuten und Rindern.

Valvanol-Stifte — elastische —

elastische Glycerin-Gelatine-Stifte (20 g Frischgewicht) mit einem Gehalt von 30% Valvanol.

Packung mit 5 Stiften

Anwendungsgebiet: Uterus- und Scheiden-Antiseptikum, auch bewährt als Magen-Darm-Antiseptikum als Einlage in Fisteln und Höhlenwunden.

Valvanol-Tinktur

Valvanol-Tinktur ist eine schwach braun gefärbte, dünnflüssige, schnelltrocknende alkoholische Lösung chlorierter Phenolhomologe (Chlorkresol, Chlorphenol usw.).

Flasche mit 100 g

Anwendungsgebiet: Austauschmittel für Jodtinktur (Operationsfeld- und Injektionsstellendesinfektion).

Valtrasan-Tabletten

weiße, in Wasser aufschwemmbar Tabletten aus animalalbuminat, Cortex Quercus und gallus und gerblichem Kupfer.

Karton mit 30 Tabletten zu 2,0

Anwendungsgebiet: Magen- und Darmantiseptikum zur Vorbeuge und Behandlung von Durchfällen, insbesondere von Jungtierdurchfällen.

Viprasid

sterile, konservierte *Vipera ammodytes* (Sandvipern) und *Vipera berus* (Kreuzottern)-Toxin-Injektionslösung.

Anwendungsgebiet: Schlangengiftinjektionslösung zur Behandlung rheumatischer Krankheitszustände und hämorrhagischer Diathesen. Ferner bei Schulterrheumatismus und allgemeiner Steifheit der Pferde, des akuten Muskelrheumatismus der Hunde und hämorrhagischer Diathesen.

Elastische Wephakonstäbchen

Anwendungsgebiet: Äußerlich zum Einlegen in eitrige Fistelkanäle, zur Nachgeburtsbehandlung und bei Præputial-Katarrh, bei Pyovagina.

Bestandteile: p-isopropyl in. kresol 0,02, 0-8-oxychinolin in lösl. Form 0,04, massa styl. elast. 4 g (Gelatina, Kieselsäuregel, Glycerin).

Woll-Zitzenstifte in Valvanolsalbe

Salbentampons zur Behandlung von Strichkanal-erkrankungen und zur Nachbehandlung von Strichkanaloperationen.

5 Ampullen zu 1 ccm
Ampullenflasche mit
Durchstechstopfen
zu 5 ccm

Packung zu 48 Stück

Dose mit 20 Stiften

**Schädlingsbekämpfungs-
und Pflanzenschutzmittel**

Staub-Streupulver

Zusammensetzung: Phenyl-Urethan in Verbindung mit Trägerstoffen. Packung à 200 g, à 1000 g, à 5000 g

Anwendungsgebiet: Zur Verhütung des Auskeimens von Kartoffeln während der Lagerung in Lagerhäusern, in Gärten und Mieten.

Staubmittel

Zusammensetzung: Hexachlorcyclohexan (H₂, H₆C₆CL₆) sowie Trägerstoffe. 100 g Beutel

Anwendungsgebiet: Neuartiges Mittel zur Vertilgung von Ameisen in Obst- und Gemüsegärten sowie zur Ausrottung der Nester.

Staubmittel

Zusammensetzung: 8% Dichlordiphenyltrichloräthylmethan C₁₄H₉Cl₅, Hexachlorcyclohexan (HCH, C₆H₆Cl₆) 0,35% Gamma, sowie mineralische Trägerstoffe. Packung 100 g, 1000 g, 5 kg, 25 kg

Anwendungsgebiet: Mittel zur Kornkäferbekämpfung in lagerndem Getreide.

Staubmittel

Zusammensetzung: 5% Dichlordiphenyltrichloräthylmethan (DDT, C₁₄H₉Cl₅), Hexachlorcyclohexan (HCH, C₆H₆Cl₆) 0,35% Gamma sowie mineralische Trägerstoffe. Packung 25 kg

Anwendungsgebiet: Spezial-Staubmittel für die Scherentwesung.